



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600036354R

4.78. E. 23



E. BIBL. RADCL.

6-7

7. 3. 3.

191

✓ 622

E.

1











---

CURTH SPRENGEL

H I S T O R I A  
R E I H E R B A R I A E

---

T O M U S I.

---

A M S T E L D A M I

SUMTIBUS TABERNAE LIBRARIAE ET ARTIUM.

1807.

1900  
FEDERATIVE

**V I R O**

**CUM MUNERIS SPLENDORE TUM ANIMI VIRTUTIBUS**

**E X I M I O,**

**CAROLO FRIDER. BEYMIO,**

**REGIS OPTIMI AMICO,**

**BONARUM ARTIUM PATRONO,**


**VENERATIONIS ET GRATITUDINIS**

**MONUMENTUM HOCCE**

**PIA MENTE**

**POKIT**

**A U C T O R.**



---

*Rei herbariae fata conscribere adgredior, impeditum opus et facundiae minime capax: praesertim cum me natura in mediocribus esse voluit hominibus, quibus facultates largita est colligendi, observandi; inveniendi vero fere negavit. Intempestivae tamen modestiae notam subirem, si nequaquam me idoneum iudicaret, qui haec studia tractem: ad quae natura ipsa et voluntate ferri me ab ineunte adolescentia sensi, in quibus etiam vitae tabernacula ponere decrevi, ut, praesentis aevi pertaesus, in antiquo mundo vivere possem. Ex quo enim iuvenis esse coepi, aestates fere omnes in investiganda plantarum natura, hyemum otia in tractandis me-*



*ditate cogitateque veterum scriptis consumpsi. Quo interius hanc doctrinae partem historicam cognovi, quo magis auctae sunt eorum, quae collegeram, explicaveram, notaveram, divitiae, eo magis sensi, opus mihi esse otio diuturno et vacuo, ut digererem collecta, excerpta iudicarem, tractata retractarem, eoque modo princeps meum ac palmarium opus mihi proponerem, quo nomini meo commendationem et apud externos quaererem, quodque meae aetati ita probarem, ut ne serae quidem posteritatis iudicium extimescerem. Otium id ab omni interpellatione vacuum, quod liberam animi cogitationem et diligentiam cogitandi efficeret, concessit tandem belli fors et gratia victoris. Itaque Chaerephontis Socratici illius, σφοδρῶς ἐφ' ὃ, τι δομήσειε, similem me videri studui, omnesque intendi nervos, ut dignum opus ederem et probabiliter fungerer hac scriptione.*

*Qualem autem tractandi scribendique rationem sequutus fuerim, brevibus indicare*

*libet. Facile intellexi, prouti scriptores, qui post Ciceronem aut Hippocratem fuerunt, nemo intelligere potest; nisi qui veteres illos in numero habeat, ita omnem plantarum, a scriptoribus seriorum saeculorum memoratarum, cognitionem a Theophrasto et Dioscoride proficisci debere. Itaque acrtori indies Theophrasti studio incitabar, ut eum per duas fere hyemes de manibus non deponerem. Conferendae etiam erant Theophrasti et Dioscoridis plantae cum serioribus omnibus, ut appareret, quis alterum sequutus sit, quid ab eo habeat ac retinuerit, five omiserit, five addiderit, quomodo alter ex altero supplendus, interpretandus, corrigendus sit. Id adfiduum studium eo valuit, ut tandem clariora multa maioribus meis viderem, melius veterum plantas explicarem, vestigia prima plurimarum detegerem, loca obscura multa dilucidarem idque praestarem, quod ab auctore probabiliter in his studiis versato posci posset. Summum etiam in synonymis dili-*

*gentissime tractandis studium collocavi, quod ut prospere cefferit atque in utilitatem rei herbariae, magnopere cupio.*


*Luxum literarium, quem iuvenis amavi, iam sperno: loreolam enim nolo in mustaceo quaerere: memoravi sola scriptorum loca, quae fere classica sunt. Namque alioquin voluminum plurium seriem edere debuissem, lectoribusque farraginem molestam obtulissem. Id maxime in historia plantarum biblica vitare studui, utpote quae tot tamque variis modis tractata fuit, ut bibliothecam fere integram libri de ea conscripti constituent.*

*Plantae a scriptoribus classicis, Herodoto, Diodoro, Strabone, Theocrito, memoratae passim memorantur. Neque enim hi scriptores propria sibi capita postulare poterant, nisi plantarum adeo insignem copiam tractassent, ac e. g. Virgilius.*

*Sibthorpii floram graecam, tamdiu expectatam, tandem accepi, in ususque huius*









CURTH SPRENGEL

H I S T O R I A  
R E I H E R B A R I A E

---

T O M U S I.

---

AMSTELDAMI  
SUMTIBUS TABERNÆ LIBRARIÆ ET ARTIUM.  
1807.



plis 2, 69.). . . *Limofella aquatica* (Plantago  
aquatica minima 2, 110.). . . *Vicia Cracca*  
(sylv. II. 2, 235.).

Apud COLUMNAM: *Iungermannia epi-  
phylla et Targionia hypophylla* (ecphr. I.  
332. 333.).

Apud Io. BAUHIUM: *Scirpus lacustris*  
(Iuncus maximus holoschoenus hist. 2, 522.),  
*maritimus* (Gramen cyperoides 2, 495.), syl-  
vaticus (Cyperus gramineus 2, 504.). . . *Ho-  
losteum umbellatum* (Caryophyllus arvensis  
3, 364.). . . *Galium uliginosum* (Rubia quae-  
dam minor 3, 716.). . . *Plantago serpentina*  
Vill. (Coronopus Massiliotum 3, 510.). . .  
*Aiuga genevensis* (Consolida media 3, 432.),  
*alpina* (Consolida alpina ib.).

---

## CONSPECTUS.

### LIBER I. Prima rei herbariae rudimenta.

CAP. 1. Flora biblica . . . . .	p. 6— 19
2. — Homerica . . . . .	19— 29
3. Monumenta artis antiquae et mythi de plantis . . . . .	29— 75
4. Flora Hippocratica . . . . .	35— 49
5. Priscorum philosophorum res herbaria . . . . .	49— 55
6. Aristoteles . . . . .	55— 62
7. Rhizotomi . . . . .	62— 66

### LIBER II. Rei herbariae incrementa.


CAP. 1. Theophrastus Eresius . . . . .	66—119
2. Schola Alexandrina . . . . .	119—134
3. Res herbaria sub Romanorum imperio . . . . .	134—210

### LIBER III. Rei herbariae decrementum.

CAP. 1. Romana ac Graeca barbaries . . . . .	211—218
2. Caroli Magni capitularia . . . . .	219—222
3. Monastica res herbaria . . . . .	222—228
4. Arabum res herbaria . . . . .	229—273
5. Latinobarbara aetas . . . . .	274—299

### LIB. IV. Rei herbariae post renatas literas instaurationio.

CAP. 1. Veterum fontium examen . . . . .	300—310
2. Patriarum herbarum examen . . . . .	310—359
3. Hortorum cultura . . . . .	359—364
4. Peregrinationes et itinera, quae rei herbariae amplificandae infervierunt . . . . .	365—387
5. Instaurationio, collectio et dispositio in- ventorum . . . . .	388—466



**REI HERBARIAE**  
**H I S T O R I A.**

**TOM. I.**

**1**

WILSON

WILSON

---

## LIBER I.

### PRIMA

### REI HERBARIAE RUDIMENTA.

**I**n duas naturaliter disciplinas rei herbariae scientia diducitur: quarum altera complectitur formarum variarum differentias, specierum generumque distributionem systematisque cognitionem, altera vero versatur in plantarum fabrica exponenda partiumque usu investigando. Illa, historiae naturalis pars; haec potissimum ad physiologiam refertur.

Quodsi in utriusque disciplinae historiam inquirimus, aetate prior physiologia plantarum necessario esse debet. Pristinum enim hominum genus vel patriae terrae hactenus adhaesit, ut remotarum regionum natura ac corpora naturalia eos plane laterent; vel, dum pervagarentur etiam alias terras, vitae tamen sustentandae ac quotidianorum solummodo emolumentorum curam habuerunt. Gentes eae *αὐτόχθονες* fructus sine dubio horaeos sylvarum camporumque pascuorum gramina cognoverunt, quum victum praeberent quotidianum. Ea vero cognitio, e solo adspectu proficiscens, notas haudquaquam characterificas complectebatur, neque unquam disciplina tradi poterat.

\* \*

Communis ea intelligentia ad solum usum quotidianum intenta ad scientiae dignitatem evehi nequaquam poterat, nisi liberalior naturae adspectus meditationi ansam praeberet. Quod nostris demum temporibus factum est, quum rei herbariae disciplina, a vili illorū quotidiani usus respectu libera, maiori studio agitari coepit et nobiliori.

Neque reticenda est alia caussa impediti apud praefatas gentes huius studii, mirabilium nimirum amor, quo irretitos videmus homines literarum rudes atque ab animi cultu alienos. Capitur omnis infantia generis humani adeo miraculorum studio, ut nusquam caussas naturales, sed divinam ubique efficaciam, nexum nusquam naturae operam, sed mira ubique quaerat ac incredibilia. Mutationes specierum, ortus plantarum ex animalibus, animalis ipsa vegetabilium indoles infantili humani generis aetate creduntur et defenduntur.

Historicam plantarum cognitionem aetate antecellere physiologia necessario debet. Protinus enim ut in caussas rerum naturalium inquire coepisset, plantarum etiam, hominibus quotidie obviarum, ortus hominum mentes excitavit. Ortum autem vegetabilium earumque naturam infantilis illa aetas, comparatis semper animalibus, ex iisdem fere fontibus deduxit. Inertia enim humano generi eo carior, quo rudius est: inexplicabilia fugit, faciliorem ubique expositionem in viribus divinis

et animatis petit, quæ mythologia iam suppeditat; abhorret autem ab operosa illa, et difficillima singularum rerum inquisitione, e qua verum proficiscitur ratiocinium. Inde exponendus est arctissimus ille nexus mythicæ theogoniæ et physiologiæ, quam priscum philosophorum genus protulit.

Ante autem, quam hæc ulterius peruestigemus, necessarium arbitramur in antiquissimis literarum et artium monumentis plantarum vestigia persequi, ut eo melius pateat, quantus fuerit antiquarum cognitionum ambitus, ac quales inprimis plantæ ab antiquitate fuerint aestimatae. Omne quidem id disputationis genus difficultates plurimas habet, tum quod remotissima illa tempora sunt, tum quod regiones eae, quas prisca mortalium gens incolabat, haud satis etiamnum peruestigatae sunt, tum denique, quod plantæ ab auctoribus antiquissimis obiter duntaxat et quasi aliud agatur, nominari solent. Regiones orientales, quas generis humani vocaveris incunabula, a *Rauwolfio*, *Belonio*, *Buxbaumio*, *Tournefortio*, *Hasselquistio*, *Forskoleo*, *Billardero* et *Sibthorpio* peragratae, plantarum feracissimae, plurimum videntur saeculorum labores requirere, priusquam tota antiquitas sufficienter illustrata fuerit.

*Ol. Celsii* et *Claud. Salmafii* studia, dignissima quidem, non possunt tamen non desiderium excitare ulteriorum inquisitionum.

---



## CAP. I.

## FLORA BIBLICA.

Tum *Wettii* tum *Vateri* nuperrimis disputationibus antiquissima aetas variorum capitum biblicorum tantum abest ut penitus negetur, ut potius affirmari etiamnum debeat, Mosaicorum librorum nonnulla loca aetate omnino priora ceteris omnibus humani generis monumentis esse: licet adfusa sint plurima e seriore, praesertim regum Israeliticorum aetate.

Gens, cuius antiquissima literarum monumenta hic percontamur, e Perfide orientali, s. Arachosia (quae ab oriente Candaharam contingit, septentrionali sui parte Bactriae contermina) aut Caschmirae vallibus, ut *Herdero* placuit et *Hartmanno*, in Mesopotamiam, dein in Palaestinam migravit, unde in Aegyptum ducta, saeculis quinque elapsis demum Palaestinam iterum habitavit. Sub potentissimo eius gentis rege, Salomone, vicinae Tyri exemplo incitatum commerciorum et navigationum studium effloruit, ut naves Salomonis cum tyricis oras maris rubri et perfici finis ipsasque maris indici insulas appellerent. Ex eo inde tempore plantarum et aromatum, quae in India orientali proveniunt, cognitio ad eam gentem transivit. Quum tandem fato acciderit, ut regnum Israeliticum a Mediae, Babyloniae et Assy-

## FLORA BIBLICA.

7

riae regibus overteretur, captivaeque tribus in contumelioso exilio per ducentos fere annos degere deberent, divitiarum, quas India fert et Persia, cognitionem haurire facila potuerunt.

Sequentem libet indicem plantarum biblicarum exhibere, qui, systema Linnaeanum sequens, probabilibus ut plurimum conjecturis nititur.

*Olea europaea* (זית) ex antiquissimis est, quae in diluvio Noe iam memoratur (*Genes.* 8, 11.) Eius feracitas ac optimus proventus in terra promissionis maxime celebratur (*Deut.* 6, 11. 28, 40.). Id *Theophrasti* (*hist.* 1, 18.) testimonio confirmatur, qui oleam maxime syriacam praedicat.

*Crocus sativus* (כרכום) per totum Orientem sponte crescens, ob odorem (*Cant.* 4, 14.) suavem laudatur, sicut et Homeridae eum (*hymn. in Pan.* 25.) cum hyacintho simul nominant.

*Cyperus Papyrus* (בבלי) in limo Nili et Euphratis proveniens, saepius laudatur in pristinis iis libris. Bildadus apud Iobem (8, 11.) quaerit, possitne Papyrus crescere absque limo? Et obscuro illo loco (*Esaï.* 18, 2.) navigia e papyro fabricata citantur, quorum antiqui omnes, maxime *Theophrastus* (*hist.* 4, 9.) meminere.

Arundo vulgaris, modo זית modo בבלי dicta, haud facile determinatur. Complectitur autem gramina et cyperoides, quae in Nilo, mari rubro et Syriae fluminibus crescunt: nimirum *Cyperum*

*niloticum*, longum et fastigiatum; *Sotijum orbiculatum* et maritimum; *Arundinem Bonacem*; *Saccharum cylindricum Vahl*; *biflorum Forsk*; *Andropogonem arundinaceum Schrader*; *annulatum Forsk.*

*Andropogon Nardus* (772) gramen radice fragrantissima, cuius solummodo *Cant.* 1, 14. 4, 13. mentio fit. *Ionesius* quidem (*Transact. of the Soc. of Bengal*, 2. p. 405.) probare studet, *Valerianae Spicae Vahl*. radicem Nardum veterum exhibere. Perperam autem id fieri, patet e *Dioscoridis* (1, 6.) *Avicennae* (lib. 2, 225.) maxime vero ex *Abu'l Fadli* (*Cels. hierob.* 2, 3.) descriptione, qui gramen esse Nardum, discrete aiunt. Copiosissime autem provenit ea planta in Gedrosiae provincia, hodie Mekran dicta, quae Indico oceano contermina, a septentrione Turan contingit: ubi Alexandri exercitus tanta abundantia eam deprehendi, ut pedibus calcata aërem fragrantia impleret (*Arrian. exped. Alex.* 6, 22.). Naves punicae, *Arriano* eodem teste, inde Nardum advehebant, quo factum est, ut et Salomonis tempore gens Israelitica eam obtineret.

Frumentorum species, in s. scriptis obvia, sunt *Hordeum vulgare* (שעור), antiquissimum frumentum (*Plin.* 18, 7.), quod sponte sua crescere ad flumen Araxen (Kur) in Phaëtaranja (Georgiae parte orientali) testatur *Moses Cho-*

*renensls* (geogr. p. 360.) Hordeum nudum sponte nasci in Balascham, provincia Indiae maxime boreali *Marcus Paulus saec. XIII.* vidit. (*Ramusio viaggi 2. f. 10. a.*)

*Triticum aestivum f. hybernum*, (תבן) quod laetissime et abundantissime in terra promissionis (*Deuter. 8, 8.*) proveniebat. Id sine dubio ex India pristini Ebraei. In Musicani enim regione sponte sua crescere testatur *Strabo* (15. p. 1917.) *Andreas Michaux* Triticum Speltam spontaneum invenit anno 1782 in Persiae provincia Hamadan (*Lamarck. encyclopéd. méth. 2, 560.*)

*Triticum Spelta* (תבן), quod ferotinum frumentum (*Exod. 9, 32.*) vocatur et *Sorghum vulgare Pers.* (سورگ), quod peculiarem *Forskoleus* speciem credidit, *Holcus Dochna* dictam. Et nostrorum temporum Arabes سرج Sorghum appellant (*Cels. 1, 455.*)

*Ficus Carica* (תנן) ex vulgaribus arboribus fructiferis earum terrarum, quas gens Israelitica incoluit.

*Ficus Sycomorus* (סמון) in Aegypti et Palaestinae convallibus et pascuis frequentissima. Cedrorum (אדון) tantam copiam procreasse Salomo dicitur (2 Reg. 10, 27.) quanta Sycomororum sit in convallibus. Tanquam materiem viliprem ligno cedrino *Esaias* (9, 10.) Sycomoros memorat: unde, quanto in errore versatur *Sick-*

*Ierus* (*Gesch. der Obscultur*, 117.) *Moros* habens eos *Sycomoros*, patet. De *Sycomoro* vid. *Warnöckroffii collectanea in-Repertor. für bibl. Lit.* 11, 7, 12, 3.

*Solanum infantum* (סולן) citatur *Mich.* 7, 4. et *Proverb.* 15, 19., quod spinis horridum sit. Vocatur autem pari nomine arabico (حنظل) frutex, in Phoenicia abundans, qui *Melongenae* satis similis sit (*Abu'l Fadli* apud *Cels.* 2. p. 41. 42.).

*Zizyphus vulgaris* (זיזיפוס) per totam Syriam abundans, velut vulgaris vepres *Pinui Combrae* opponitur (*Es.* 55, 13.).

*Zizyphus Paliurus* (פליורוס) in arvis sterilibus crescens, (*Prov.* 24, 31.) unde et *Theophrastus* (*hist.* 3, 17.) cum *Rubo* componit, et *Virgilius* (*ecl.* 5, 38.) dicit:

Pro molli viola, pro purpurea narcisso  
Carduus et spinis surgit paliurus acutis.

*Vitis vinifera* (ויט) sponte in Armenia et Georgia crescens, ubi *Chardinus*, *Tournefortius* et *Göldenstädtius* colles prope-modum omnes ea obritos invenerunt. (*Cf. Annales horticulturnae, quas sub titulo Gartenzeitung edidi, vol. 3. p. 191.*) Ibi et coluit Noa primus: provenit etiam per Syriam et Aegyptum inferiorem.

*Nerium Oleandrum* esse arborem illam, de

qua *David* (ps. 1, 3.) canit, ad rivos plantam semper virere, arbitratur *Hasselquistius* (it. *Palaeft.* 226.) qui frequentissimam eam invenit.

*Bubon gummiiferum* exhibet Galbanum, (גלבן) quod (*Exod.* 30, 34.) inter suffimenta citatur. Ex Abyssinia, ubi sponte provenit planta, Gummirefina haec Nilo provehitur.

*Cuminum Cuminum* (כמון) in Palaestina cultum (*Es.* 28, 25.).

*Coriandrum sativum* (קוריאנד) cuius semina rotunda cum Manna comparantur (*Exod.* 16, 31.). Optimum ex Aegypto venire *Plinius* (20, 20.) testatur: ubi et hodiernum colitur. (*Forsk. flor. aegypt.* p. LXIV.)

*Linum usitatissimum* (לשון) ex antiquissimis inde temporibus in Aegypto colebatur (*Exod.* 9, 31.).

*Lilium candidum* (לשון) sunt amoeni convallium flores (*Cant.* 2, 1.). *Plinius* (21, 5.) Palaestinae vallem, Phaselida nominat, tanquam liliorum feracissimam. Artifex tyrius, quem Salomo iussit templum exstruere, columnarum templi apicibus formam liliorum dedit.

*Narcissus orientalis* f. *calathinus* f. *Ionquilla* (קבצלה) intelliguntur (*Cant.* 2, 1.) iuxta sententiam interpretum antiquorum Chaldaici et Arabici. Abundavit autem iis floribus Palaestina.

*Acorus Calamus*, var. indica est קנה הסוכך

(*Ierem.* 6, 20.), quam e remotissimis regionibus apportabant. In Guzurate et Goa provenire et coli, auctor est *Garcias* (*arom.* c. 32., apud *Clus. exot.* p. 200.).

*Allium ascalonicum* (שום) }  
 — *Cepa* (בצל) } *Num.* 11, 12.  
 — *Porrum* (קציר)

*Diospyros Ebenum* (דבנים). Inter mercimonia, tyriis navigiis apportata ex insulis (*Ezech.* 27, 15.) lignum ebeni citatur. Crescit autem ea arbor in Ceylonae sylvis: quam insulam tyriae naves attigerunt.

*Amyris gileadensis* (בכח *2 Sam.* 5, 23.) ad explicationem saltem, quam *Abu'l Fadli* (*Cels.* 1, p. 339.) exhibet. Balsamum ipsum, ex hoc frutice stillans בשם dicitur (*Exod.* 30, 23.).

*Amyris Kafal* (*Forsk.* p. 80.) est arbor turifera, quae לבנה largitur. Crescit in Arabia. Exhibuit iconem mancarn *I. Bauh. hist.* 1, 303. Exemplar arboris turiferae, quod *Adansonius* apportavit, examinatum fuit a *Lamarkio* (*encycl.* 2, 626.).

*Lawsonia inermis* (כפר). Flores racemosi fragrantés *Cant.* 1, 14. laudantur. Est *ωπρος Diosc.* 1, 125. Cf. *Belon. obs.* 2, 74.

*Laurus Cassia* (קדה et קציעות *Exod.* 30, 24. *Pj.* 45, 9.) ob suavitatem odoris celebratur. Ar-

bor in Ceylona crescens corticem largitur, quam tyriae naves advehebant.

*Laurus Cinnamomum* (לְבָנָן *Exod.* 30, 23.). De Cassia et Cinnamomo antiquissima relatio apud *Herodot.* 3, 110. 111. Ibi avium ope semina propagari refertur, quod egregie confirmat nuperimus testis *Thunbergius* (*resa* 4, 185.).

*Fagonia arabica* (דָּגָל *Genes.* 3, 18.). Est tribulus ille, quibus ager, cui Iehova maledicebat, abundare debebat. *Forsk.* teste (*flor. ar.* p. 88.) spinas fert longissimas verticillatas.

*Amygdalus communis* (אֶמְגָדָל) per totum Orientem vulgaris, saepius citatur in libris veteris testamenti. Quin et virgae, quas Iacobus ex arbore אֶמְגָד reseculit, ad antiquissimorum interpretum sententiam, ad amygdalum referuntur (*Genes.* 30, 37.).

*Pyrus Cydonia* (תְּאֵנָה) et *Cant.* 2, 3. 5. 7, 8. et aliis locis ob fragrantiam laudantur. In Palaestina saepe frequens arbor.

*Punica Granatum* (תְּאֵנָה) in Palaestina (*Deut.* 8, 8.) et Aegypto (*Num.* 20, 5.) vulgaris, fructus fert colore pulcherrimis, quibuscum genae amassae componuntur (*Cant.* 4, 5.) et e quibus vinum ipsam conficitur (*Cant.* 8, 2.). Labitur opinione *Sicklerus* (*l. c.* p. 119.) dum malum punicum pro perfecto malo habet. Iucundissimos certe fructus punicae esse, patet ex testimoniis, quae



verb. 24; 31. *Cedrus*; auctoritas *fl. Melech* fretus (*hierob. 2, 207.*) Urtilam *chabot*. Sed Rabbini *Petach*, ubi de montibus *Ararat* loquitur, hoc nomine manifesto *Hedysarum* *Abagh* describit (*Itiner. ed. Wagenfeld p. 190, 192.*) *Artemisia judaica* L. *Abropansium* (*722*) (*Jerem. 9, 15.*)

*Pinus Cedrus* sine dubio est, cedrus Dei, altissima arbor, quam Ebraei cognoscunt, materies optima. Regerit quidem *Celsus*, *Salomonis* iussa (*2 Paral. 2, 18.*) 80,000 hominum in montes abiisse ut ligna haec succiderent, nostris vero temporibus paucissimas cedros in Libano fuisse perisse. At infirmatur ea obiectio, si observamus, *Puteri* et *Wetii* inquisitionibus auctoritatem librorum Paralipomenorum satis labefactam esse, neque numeros in eisdem obvios ad accuratam intelligendos esse. Dein etiam fieri facile potuit, ut apud hos 3000 annos Sylvae cedrorum, quae obtingerent, dum hodie paucae supersunt. *Pinus Cembra* (*722*) ab *Esaiâ*, quam cedro ob venustatem et altitudinem semper nominatur, Etiamnum frequens in Libano est. *Pinus Picea* dicitur (*722*) ob terebinthinae copiam, quae inde elicitur.

*Fagus Castanea* forte (*722*) et *Buxus sempervirens* (*722*) est, quas *Esaiâ* (*40, 19.*) inter elegantes numerat arbores.

*Iuglans regia* semel (*Cant.* 6, 10.) nomine  
אֲנֹחַ citatur.

*Quercus Ilex* (אֵילָן עֹרֹה *Ef.* 44, 14.).

*Quercus Esculus* (אֵילָן עֶשְׂלֹן *Ezech.* 44, 6.) in Ba-  
sanitica regione frequens, ad navigiorum materiem  
adhibita.

*Cupressus sempervirens* dicitur אֵילָן נֹחַ fuisse, quo  
Noa ad arcam construendam usus fuit. Creditur  
ob levitatem commodissimam materiem fuisse.

*Platanus orientalis* intelligitur ab antiquissimis  
interpretibus sub אֵילָן עֶרְמֹן, quae *Ezech.* 31, 8. ob  
frondes venustas laudatur.

*Ricinus communis* sine dubio est אֵילָן קִיקִיֹן, sub  
cuius umbra cubavit Ionas.

*Cucumis Dudaim* ob fragrantiam et bellam for-  
mam esse אֵילָן דִּדַּיִם Leae (*Genes.* 30.) videtur. Rab-  
bini quidem cum scriptoribus medii aevi plerisque  
*Atropam Mandragoram* esse arbitrantur. Quo-  
rum sententias exposuit *Hieron. Tragus* p. 891.  
892. Neque tamen de hac radice dici potest, vel  
fragrantem esse vel esui gratam.

*Cucumeres Melones* et *Chate* (אֲבִטְחוּם et  
קִשְׁיִים) anxie desiderarunt Israelitae in deserto  
(*Num.* 11; 5.). Utraque species, *Forskoleo*  
et *Denonio* testibus etiamnum frequenter in Ae-  
gypto colitur.

*Cucumis prophetarum* אֵילָן פְּקֻעִיהָ (2 *Reg.* 4, 39.)

esse videntur: namque Colocynthides in Palaestina haudquaquam proveniunt.

*Pistacia vera*, cuius fructus בִּטְנִים nomine (*Genes.* 43.) tanquam Palaestinae peculiare lachus iubet in Aegyptum aveli.

*Pistacia Terebinthus* nominibus אֵל, אֵלָה et אֵלֹן frequenter occurrit.

*Pistacia Lentiscus* mastichen largitur, quae אֶרֶץ dicta, cum pistaciis et balsamo nominatur.

*Excoecaria Agallocha* lignum aloës est, quod אֶהֱלִים (*Num.* 24, 6.) dictum ob odoris suavitatem laudatur.

*Salix babylonica* f. *egyptiaca* (עֶרְבִים).

*Borussus flabelliformis* f. *Lontarus domestica* Gärtn. largitur, teste Herberto de Lager apud *Kämpfer amoen. exot.* 668. *bdellium* בִּדְלִיָּה (*Genes.* 2, 13. *Num.* 11, 7.), quod in Paradiso terrestri fuit. Crescere autem hanc palmam in Arabia felici et Persiae litoribus australibus testatur praeter Kämpferum *Forskoleus flor. arab.* p. CXXVI.

*Iuniperus Oxycedrus* (יָרֵחַ *Ioh.* 36, 4. 1 *Reg.* 19, 5.). Sed *Forskoleus* (*flor. arab.* 214.) huc trahit Genistae speciem, quam *Raciam* dicit, *Spartium* forte *angulatum*. Neque tamen altitudo ea est, ut sub umbra sedere quis possit.

*Populus alba* (לִבְנָה)

*Acacia vera* f. *arabica* Willd. (אֶשְׁתָּה) אֶשְׁתָּה

materiem praestantissimam et olim et nunc etiam celebrata, nostris temporibus simili nomine **سطل** Arabibus dicitur.

*Phoenix dactylifera* (👉👉).

En floram biblicam, quatenus coniectura probabili plantarum nomina consequi possumus. Dittior omnino est Homericâ, haec tamen maiore certitudine definiri potest.



CAP. II.

FLORA HOMERICA.

*Olea europaea*. Binae varietates occurrunt: oleaster (Φυλίνη) et olea culta (ἐλαία *Od.* 5, 477.). In hortis Laërtis et Alcinoi haec laudatur. Euphorbum, Panthei filium formosum componit poeta cum olea, in agris humidis crescente et floribus albis onusta (*Il.* 17, 53.). Ad finem Phorcyos Ithacensem olea erat umbrosa sacra (*Od.* 13, 102. 122.). Ulyssis thorus coniugalis e trunco oleae umbrosae constructus erat (*Od.* 23, 190.). Varia instrumenta ex oleae ligno fabrefacta erant: clava Cyclopiis (*Od.* 9, 320.), trabes, qua Ulysses monstro oculum extorsit (*Od.* 9, 378.), securium denique manubria (*Od.* 5, 236. *Il.* 13, 612.).

*Fraxinus excelsior* (μελίσα) et nemoribus montosis provenit (*Il.* 16, 767. 13, 178.). E ligno laceae et iacula sculpebantur (*Il.* 2, 543. 5, 666.),

quae ideo saepius τὰ μελινὰ aut μελίσαι appellantur : unde et bellicosi viri et fortes vocantur εὔμμελίσαι (Il. 4, 47.).

*Crocus sativus*. cum hyacintho et lotò inter fragantes flores numeratur, quibus Iupiter tellurem ornaverit (Il. 14, 347.). *Gladiolus communis* est is hyacinthus.

*Scirporum* species variae sub σχοίνω intelliguntur, qui fluviorum ripas vestit (Od. 5, 463.).

*Cyperus* forte *mucronatus* aut *longus*, in Italia et Graecia frequentes sunt κύπερον Homericum, quod perperam a *Vossio* ad Galangam refertur.

: *Cyperus Papyrus* funes largiebatur, qui τῶν θυβλίνων nomine, ad portas. ocludendas adhibebantur (Od. 21, 391.). Cf. *Theophr.* hist. 4, 9.

: *Arundo Donax*, δόνακος nomine obvenit. E culmis eius graminis heroës Homericì sagittas parant (Il. 11, 584.) quemadmodum nostrae aetatis Itali fistulas inde aliaque conficiunt utensilia.

Fueritne *Arundo* an *Eriophori* quaedam species, qua Achillis tentorium tectum erat, ambigo. E paludibus autem λαχνήντα illum ὄροφον collegerunt (Il. 24, 450.).

Frumenti species ab Homeridis memoratae sunt praepriis *Triticum hybernum* s. *aestivum* (πυρές), quod cum *Hordeo vulgari* (κριθῇ) ut plurimum coniungitur (Od. 4, 604. 9, 110.).

Penelopes anseres tritico faginantur (*Od.* 19, 536.). Iplos Hector equos tritico pascit, vino simul propinato (*Il.* 8, 188.). *Galenus* arbitrans, non sine noxa equos tritico vesci, μικροὺς πυροὺς i. e. τίφην f. *Secale* intelligit. (*facult. alim.* 1, 313.). Variae regiones, ut Buprasion (*Il.* 11, 755.), Argos (*Il.* 15, 372.), Dulichion (*Od.* 14, 335.) et Syriae infula (*Od.* 15, 405.) ob tritici praestantiam celebrantur. Hordeum insuper, κριθή in κριθῶ contracto, hac voce appellatur, additis epithetis λυκοῦ et εὐεφροῦς (*Od.* 4, 41. 604. *Il.* 5, 196.).

*Triticum Spelta* aut *Zea* Hoff. vocantur ἑλβερά et ζεία. Utraque pro pabulo equis datur (*Il.* 5, 196. 8, 560. *Od.* 4, 41.). Hinc *Herodotus* de Aegyptiis refert, animalium more vesci ἑλβερά, quam alii ζείαν appellent (2, 34.) *Galenus* (*expos. voc. Hipp.* p. 478.) utrumque idem habet, ut et *Dioscorides* (2, 113.), *Plinius* fere solus (18, 8.) discrimen agnoscit inter utramque speciem, quod, si *Hostium* (*gram. austr.* 3. t. 29, 30.) sequimur, defendi potest. *Triticum* enim *Spelta* habet internodia spiculas aequantia margine glabra; *Tr. Zea* vero internodia spiculis longiora margine pilosa.

*Ficus Carica* (ἑρμεός) saepius occurrit. Lycaon, Priami filius, ipse in patris horto putasse ficus dicitur.

*Cornus mascula* (κράνη) Fructus Circe Ulys-

sis comitibus, velut fuillum pabulum, exhibuit (Od. 10, 242.). Sylvarum dicitur arbor, τανύ-Φλοιος (cortice protenso) Il. 16, 767.

*Viola odorata* et *Apium graveolens* (σελίνον) prata Calypsus nymphæ adeo ornabant, ut Hermes ipse mirabundus pedem figeret (Od. 5, 72.). *Apium* vocatur paludosum (ελεόθρεπτον Il. 2, 776.). Diis infernis sacrum, in isthmicis ludis ad conficienda victorum ferta adhibebatur (*Pindar. isthm.* 2, 23. 8, 137.).

*Tamarix gallica* (μυρική) frutex humilior, trunco tamen satis valido, appellatur (Il. 6, 39. 21, 18.).

*Zizyphus Lotus* (λωτός), cuius ἀνθινον εἶδος (fructum florentem) Ulyssis comites hactenus ceperunt, ut ipsorum patriæ obliviscerentur (Od. 9, 83.), eadem arbor est, cuius fructus in Barbaria *Fontanescius* nostris temporibus gustavit (Cf. *antiqu. bot.* p. 51.).

*Vitis* cultura Homeridarum tempore latissime vigeat per Asiam minorem et aegaei maris insulas. In hortis Alcinoi insulae Scheriae uvae solis calore torrefactae largiebantur dulce vinum (Od. 7, 121. Cf. *Seumti ambulationem ad Syracusas*, 2, p. 236.). Pramnium vinum dulce etiam fuisse videtur, nomen merito derivatur a monte Carico, Pramne (*Villoison schol. ad Il.* 11, 638. Cf. *historiam meam medic.* 1, p. 162.). In Laërtis

hortis vineae adeo feraces erant, ut Ulyssi, infanti, a patre quinquaginta vites promitti potuerint (*Od.* 24, 342.). Achillis clypeus vindemiae iconem referebat (*Il.* 18, 561.).

*Ulmus campestris* (πελῆσα) in Iliade bis occurrit (6, 419. 21, 242.). Nymphae monticolae eas arbores sepulcro Eetionis circumponunt.

*Moly*, quod Hermes Ulyssi, velut antidotum ebrietatis commendat (*Od.* 10, 305.) in maximam iamdudum contentionem venit, varieque expositum fuit. Nigram ipsi posita tribuit radicem, lacteum florem, effossu difficile habet. *Theophrastus* (*hist.* 9, 15.) paullo curatius hanc plantam definiens, radicem contendit esse rotundam, ceparum more, folia scillae similia, neque effodi adeo aegre, ac Homerus perhibeat. Optimum provenire apud Pheneum Arcadiae et Cyllenen: praestans esse antidotum. Unde efficitur, Allii speciem esse. Simili plane ratione *Moly* suum describit *Dioscorides* (3, 54.) flore albedo, foliis angustis et radice exigua. Quibus *Plinius* (25, 4.) addit, Graecos auctores florem flavum pingere, quum Homerus album pronunciet. Incertum tamen est, quosnam auctores Graecos *Plinius* subintelligat. Hunc vero sequens *Car. Clusius*, ineunte saeculo XVII., Allii speciem quamdam *Moly* declaravit, quod folia radicalia lanceolata et flavum florem habebat (*App. alt. ad stirp. rar. in*



*Exot.*) Clusii auctoritate natus Io. Bauhinus (*hist. plant.* 2, p. 562.) Allium id, e pyrenaeis montibus acceptum, verum Moly veterum pronuntiavit: cuius vestigiis adhaesit Linnaeus, dum Allium id nomine triviali Moly insigniret.

Nihilominus verum Homericum Moly ab ipso Clusio (*scirp. hist.* 2, 37. p. 191.) optime indicatur, quem sequitur Io. Raius (*hist.* 2, p. 1122.). Plantam hanc Clusianam cum plurimis aliis neglexit Linnaeus, sed eadem est omnino cum ipsius Allio nigro et *A. monspessulano* Gouani (*illustr. t.* 16.). Omnes enim a veteribus, excepto uno Plinio, indicatae notae ad hanc speciem iure referuntur: radix nigra, folia latiuscula radicalia, flos lacteus: quid, quod ipsae radices, dum exaruit planta, aegerrime effodiuntur. Crescit autem per totam Europam australem et in ipsis balearicis insulis, quarum una sine dubio Aeaea, Circes domicilium, fuit.

*Asphodelus* in Odyssaea, ut planta infernorum occurrit. Haud procul a rupe leucadica (Gibraltar hodie) ad Oceani undas et portas Solis, regio insomniorum incipit, ubi homines beate vivunt ad instar Deorum, ubi et prata florent asphodelorum (*Od.* 11, 539. 24, 13, 14.). Per australem autem Hispaniam, Clusio (*hist.* 2, 39. p. 196.) et Löfflingio (*span. Länder*, p. 25.) testibus, vasti campi *Asphodelo ramoso* confiti, observantur.

Tabera radice a prisca Graecorum gente comedebantur. (*Hesiod. op. et dies*, 40.) et *Porphyrus* meminit (*vit. Pythag.* p. 195.), Pythagoram etiam hoc cibo vesci solere. Sacer itaque alphodelus is apud Graecos veteres existimabatur, unde et ad tumulos plantari consuevit (*Porphyr. apud Eustath. ad Od.* 10, 573.).

*Lauri* nemuscula memorantur in Sicilia (*Od.* 9, 183.)

Arbores fructiferae in hortis Alcinoi et Laërtis sunt *Pyri*, quae ὄρχνας, *Mali*, quae μήλα et *Punicae*, quae ἐοιάς ferunt. *Pyra* eo nomine appellari, ob adstringentem indolem (διὰ τὸ ἄρχειν), *Eustathii* est sententia, nimis artificiosa, et non satis plausibus digna (*Eust.* ad *Od.* 7, 120.).

*Crataegi* probabiliter species, quae forte *Azaronolus* fuit, semel nomine ἀχέρδου (*Od.* 14, 10.) occurrit, quum arbuscula spinosa facile manus laedat (ἀχρεός, ἧς οὐχ ἄψαυταί ἐστι χεῖρ. *Eustath.* ad h. l.).

*Rubi* forte species βάτος est (*Od.* 24, 230.), sed potest etiam quivis frutex spinosus intelligi.

*Papaver somniferum* (μήκων) in hortis colebatur (*Il.* 8, 306.). In Aegypto a pristinis inde temporibus caulis largiebatur succum, opium nostrum, quod νηπενθές dictum, Helena a Polydamna accepit (*Od.* 4, 220.).

*Pisum sativum* (ἐρεβινθος) et *Vicia Faba* (κίνα-

μοι μελανέχρους) ferebantur Homeridarum aevo (Il. 13, 589.).

*Trifolii* species, quaenam sit, quam λωτοῦ nomine (Il. 2, 778. Od. 12, 285.) pabulum equorum fuit, in contentione est.

*Citrorum* ligna, θύου nomine in *Odyssæa* (5, 60.) invenire voluerunt nonnulli: ipse quoque *Vossius* ita interpretatur. Vox illa tus etiam significat, atque a *Dionysio Periegete* (v. 937.) eodem sensu usurpatur. *Theophrastus* quoque sub nomine θύας seu θυίας (hist. 5, 5.) arborem describit, quae est *Thuia articulata*. Citrum medicam alio longe loco (4, 4.) Mali medicae nomine describit. Iure etiam ambigendum est, cognoverint Graeci Citram medicam ante Alexandri ἀνάβασιν. Namque ipse *Athenaeus* (deipn. 3, 8.) licet fabulae malorum hesperiorum ab Hercule apportatorum meminerit, primum tamen citrorum vestigium eum locum habet *Theophrasti*. *Plinius* autem (13, 16.), in lectica somniabundus forte, quae in Graecis auctoribus male legerat, nepoti dictans, omnia confundit. Locum eum *Odyssæae* citros indicare perhibet, quod nonnisi ligna iunctim nominentur, cedri ac laricis. Laricem autem nequaquam reperimus eo loco: ipseque *Plinius* opinione labitur, dum de *Circe* narrat, quae *Calypsum* respiciunt. Id bene iam animadvertit *Anguillara* (p. 48.).

*Alnus oblongata Willd.* (κλήθη Od. 5, 64. 239.) axillis venarum in facie foliorum infera nudis a boreali *Alno glutinosa* differt: illa in australi Europa obvia.

*Quercus* Homericae ad duas potissimum species reducuntur: *Qu. Ilex*, cuius fructus ἄκνυλα, et *Qu. Esculus*, cuius βάλανοι nominantur. Primus fere *Vuler. Cordus* (annot. in *Di o sc.* 1, 144.) monuit, Φηγὸν Graecorum quercum potius esse orientalem, quam fagum nostram sylvaticam. Esculus enim, non fagus, Iovi sacra fuit (*Il.* 5, 693.). Δρυς vero ut plurimum ilicem signat: maxime ubi nigra materie medulla (τὸ μέλαν δρυὸς) memoratur (*Od.* 14, 12.).

*Platanus orientalis* semel voce πλατανιστοῦ (*Il.* 2, 307.) laudatur. Qui acera intelligunt, ad verba: ἔθεν ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ, et ad laticis aquosi ex acerum alburno stillantis indolem consilium transtulisse videntur. Neque tamen iure, quum ἔθεν non ad arborem, sed ad solum umbrosum referendum sit: sic enim *Cicero* vertit:

„Sub platano umbrifera, fons unde emanat aquai.“

Aceris nomen insuper longè aliud apud Graecos, σφένδαμνος nimirum.

*Caricis* species quaedam θρίον est, quae cum σχοίνῳ ad fluminum ripas provenit (*Il.* 21, 351.).

*Pinus Picea* aut alia forte species, quod uberius in flora *Theophrasti* diiudicabitur, est πέν-

27. Materies (Il. 23, 328.) laudatur, quod pluvia nunquam putrescat.

*Pinus Larix* (πίτυς). Excelsa (βλωθρή) dicitur (Il. 13, 390. 16, 483.), quam in montium cacuminibus succidant ad trābes navigiorum.

*Pinus Abies* (ἐλάτη). Excelsa est (Il. 5, 560.). Idam habitat (Il. 14, 287.): materiem largitur levem, ad trabes et repagula commodam (Il. 24, 450.). Ex ea etiam rami politi et ipsi mali navium construebantur (Il. 7, 5. Od. 2, 424.). *Theophrastus* (hist. 3, 10.) masculam et femininam distinguit. Cf. etiam hist. 1, 13. Prior potest etiam ad *Pinum Pinastrum* referri, cuius folia cum cristis galearum comparat boeoticarum.

*Cupressus sempervirens* semel. (κυπάρισσος ἐνὶ ὁδῷ Od. 5, 64.) memoratur. Lignum est suaevolens.

*Salices* (ιτέαι) vocantur ὠλεσίκαρποι (Od. 10, 510, quod femina comata facillime delabuntur, masculae etiam arbores amenta tota citissime amittant (Cf. *Theophr.* hist. 3. 2.).

*Populus alba*, ad scholiastrarum sententiam est Ἀχρεώης, quod Hercules, ad infernos descendens, ex Acheronte eam secum adduxerit (Il. 15, 389. 16, 482.).

*Populus nigra* est αἰγυίος. Aquam amat (Od. 17, 208.) et aetherea vocatur. (Od. 7, 106.) ubi perperam *Vossius* populum albam habet.

Certissime autem nostram speciem intelligi manifesto e *Dioscoride* (1, 113.) elucet, qui resinae fragrantis meminit, e gemmis arboris elicitaе, quae ob flavidum colorem cum electro commutaretur.

*Buxi sempervirentis* lignum ad iuga armentorum adhibebatur. (*Il.* 24, 268.).

*Phoenix ductylifera* semel tantum (*Od.* 6, 163.) in Delo insula memoratur.

*Phucagraftis maior* Caulin. aut *Zostera marina*, utraque maris mediterranei incola, Φύκον nomine insignitur. (*Il.* 9, 5.). Litus vocatur Φυκόν (*Il.* 23, 695.); Seriore aevo Fucorum species intelligebantur, qui partim a *Dioscoride* (4, 100.) et *Theophrasto* (4, 7.) notantur.

### CAP. III.

#### MONUMENTA ARTIS ANTIQUAE.

Pauculae sunt plantae in artis antiquae reliquiis delineatae; eae autem nonnunquam tam negligenter sculptae aut exaratae aut pictae, ut coniectura tantum consequi, haud certo scire possimus, ad quamnam pertineant speciem.

#### I. AEGYPTIORUM.

Aegyptiorum monumenta lotum mythicam frequentissime habnet. Est ea *Nelumbium speciosum*.

*Willd. f. Cyamus Smith.*, sacra Aegyptiis planta, quod elegantissima foliorum rotundorum forma, pulcherrimus flos et mysticus ortus quotidianus e Nili undis ad divinam naturam spectare videretur. Illis ipsa loti folio coronata conspicitur (*Po-cocks Reise*, 1. tab. 60. 61.). E loto Osiris ortus, in foliis loti tanquam in navigiis natare dil-veteres dicebantur. Harpocrates loto infidebat: in ipsis numismatibus Ptolemaeorum ea planta occurrit (Cf. *antiqu. meas bot. p. 56.*). Fructus edebantur (*κύαμος αἰγύπτιος*), sed, sacerdotibus et Pythagoricis, eorum aemulis, interdictum putabatur, ne fabis his vescerentur (*Cic. divin. 1, 30. Cf. Smith's exot. bot. n. 7. tab. 31. 32.*).

*Persea* arboris etiam et *Papyri* partes exhibent monumenta Aegyptia. Illa Ifidi sacra (*Plu-tarch. Is. et Osir. p. 378.*) huius iconibus statuisque et ipsarum mumiarum integumentis appingitur. Arbor ea cum primis Aegypti incolis ex Aethiopia advenerat (*Diodor. Sicul. 1, 34. Schol. Nicandr. ther. 764. p. 51.*), ob cordatam foliorum formam et gratum fructuum saporem praefertim grata. Est autem *Cordia Myxa*, quod *Schreberus* eruditissime probavit (*Usteri's Magaz. 5, 14.*). Fructus *μυξάκια* sunt (*Dio-dor. l. c. Hesych. μυοξία*), in quibus interpretes tantopere defudarunt.

*Scilla maritima*, *καρμύου* nomine, Aegyp-

## MONUMENTA ARTIS ANTIQUAE. 31

tiis carissimum et antiquissimum remedium contra Typhonis pestem, aërem paludosum, Pelusii grassantem, et hydropes inde ortos exhibuit. Hinc Pelusii templum *νεομύσιον* fuit (*Lucian. Iupit. trag. p. 152. Sext. Empir. 3, 224.*). Typhonis oculus ipse bulbus allegorice ab Aegyptiis nominabatur. Eo hieratico sermone conscriptos plures de historia naturali libros semet vidisse testatur *Heliodorus* (*aethiop. 4, 142.*), *Plutarchus* etiam et *Iamblichus* (*myster. Aegypt. 7, 150.*) haud paucas eiusmodi appellationes evulgarunt.

Sycomorus in antiquo opere caelato, quod *Nordenius* (*voy. en Egypt. 1. t. 58.*) exhibet, unica fere est.

### II. GRAECORUM.

Incredibilis ac paene divina illa Graecorum vis in arte sculpendi, caelandi et pingendi solas fere deorum imagines aut historiae patriae capita aut etiam animalium icones complectebatur, plantas autem fere neglexit. Neque tamen defunt, utut pauca, plantarum vestigia.

De antiquissimo Achillei clypei artificio, in Iliade descripto iam sermo fuit. Similia fere scutum Herculis Hesiodum continet. *Αἰεταξ* quoque Cypseli, in templo Iunonis Olympiae servatus, caelata opera plurima habebat, inter quae Atlas



conspiciebatur; Hesperidum mala portans: Bacchus etiam in antro cubans, quod circumsteterunt vites et mali et punicae (*Pausan.* 5, 18. 19.).

Sacrae Diis arbores et herbae cum eorum simularis plerumque simul fingeantur. Apollini laurus sacra; Bacchus pampinis, Ceres spicis frumenti, Pan pinnum ramis coronati. Iovi esculus (*Virgil. georg.* 2, 15.): Diti cupressus (*Plin.* 16, 33.): Veneri myrtus: Cybeli pinea arbor: Osiri hedera (*Diod. Sic.* 1, 17.): Apollini tamarix (*Nicandr. theriac.* v. 613. *schol.*): Hermeti populus nigra sacrae.

„Populus Alcidae gratissima, vitis Iaccho,

„Formosae myrtus Veneri, sua laurea Phoebo.“

(*Virg. ecl.* 7, 61.).

Ipsum plantarum ortum poëtae et Graeci et Romani Diis tribuerunt. Earum celeberrima exempla haec sunt:

Hyacinthi Spartani formosissimi mors Apollini amoris furore agitato adscribitur. Ortus ex eo flos VV seu AIAI inscriptas literas habuit, quod tum in Delphinium Aiakis, tum in Gladiolum communem quadrat (*Ovid. metam.* 10, 212. f.).

„Flos oritur, formamque capit, quam lilia; si non

„purpureus color hic, argenteus esset in illis.

„Non satis hoc Phoebo est, is enim fuit auctor honoris.“

„Ipse suos gemitus foliis inscribit, et ai ai

„flos habet inscriptam, funestaque litera ducta est.“

Similiter fabulam narrant *Apollodorus* (3, 10, 3.) et *Lucianus* (*dial. deor.* 14.). Ex Aia-

sis autem Telamonii cruore natum esse florem, cum *Nicandro* (*Athen.* 15, p. 683.) alii fabulantur.

Narcissus, sui ipsius amore flagrans, in florem cognominem mutatus est (*Pausan.* 9, 31. *Ovid. met.* 3, 510.). Esse vero Narcissum poeticum, patet ex *Ovidii* versibus:

„Crocum pro corpore florem

„inveniunt, foliis medium cingentibus albis.“

Lauri ortus e *Daphnes* mutatione ab *Apollo*+*nio* (*argon.* 1, 12.) et ab aliis (*Eustath. ad Homer. Il.* 1, 14. *Geopon.* 11, 2.) et in ipsis gemmis (*Maffei* 2, t. 44.) celebratur.

*Heliadum*, Solis filiarum, mutatio in populos nigras, quae electrum exsudent, satis nota est (*Virgil. aen.* 10, 190. *Diodor. Sic.* 5, 23. *Ovid. metam.* 2, 340.). Alii volunt, alnos inde ortas fuisse (*Strabo* 5, 329.).

*Hamadryadum* fabula, a *Pindaro* primo excogitata (*Schol. Apollon. argon.* 4, 479.), cuique arbori suam tribuebat nympham, cuius vita *Isódey-dos* sit. Inde cognomen id in Orphico hymno (1, 13.) iunio-rem prodit originem. *Virgilius* tamen (*ecl.* 10, 62.) eas cognoscit.

*Dryadum* nomen et *Epimelidum* ab *Arcadibus* primis *Naiadibus* tributum fuit (*Pausan.* 8, 4.).

*Mintham* pellicem in *Mentham* mutatam esse  
Tom. I. 3

a Plutone, cecinit *Oppianus* (*halieut.* 3, 386.)  
Cf. et *Strab.* 8, 530.

Cupressus e Cyparisso, Apollinis amasio, nimis  
lugente (*Ovid. met.* 10, 136.). Plures Cupressi  
aliis Eteoclis filiae dicuntur (*Geopon.* 11, 4.).

Pinus puella fuit a Borea et Pane pariter ad-  
amata, ab illo vero trucidata (*Long. pastor.* 2,  
p. 37. *Geop.* 11, 10.).

Violam primam ortam fuisse, cum Iona, Xuthi  
filium, Nymphae essent coronaturae, *Nicander*  
fabulatur (*Athen.* 15. p. 683.).

Rosa vel e Veneris faucibus vel ex Adonis cruo-  
re (*Bion.* 1, 66. *Geop.* 11, 17.).

Anemonen e lacrimis Veneris (*Bion.* 1, 66.).

Ἀἴμα ῥόδου τίτται, τὰ δὲ δάκρυα τῆς Ἀφροδίτης.

Adonin ipsam aestivalem e cruore Adonis,  
quem Venus deperibat, *Ovidius* canit (*metam.*  
10, 725.).

Myrrha, Cinyrae filia, in patrem amore fu-  
rens, mutata fuit in cognominem arbusculam (*Id.*  
10, 490.).

Clytie nympa in florem versa, quem Hesperin habeo matronalem (*Id.* 4, 267.).

Leucothoë virgo, ab Apolline adamata, in ar-  
borem turiferam mutata (*Id.* 4, 250.).

Myrtus e Myrsine puella occisa (*Geop.* 11, 6.).

Tandem *Phœrenicum*, poetam Heracleoten

epicum celeberrimum fuisse his metamorphoseon fabulis ferunt. Oxylum, Hamadryadis sororis concubitu genuisse cecinit Ficum, Cornum, Fagum, Populum, Ulmum, Vitim, et omnes has arbores Hamadryadas vocari: unde *Hipponactem* dixisse aiunt, ficum esse vitis sororem (*Athen.* 3, 5.).

In operibus ipsis antiquorum variae plantae ob formarum elegantiam aut ob usum praestantem figurantur. *Acanthum mollem*, quem *Vitruvius* casu sculptoribus innotuisse refert, et poculis et columnis et aliis instrumentis caelatum addebant (*Virgil. ecl.* 3, 45.). *Ferula tingitana*, cuius succum pretiosum, Silphii nomine, maximi aestimabant, Cyrenes incolae in numis ipsorum cum Batti antistitis imagine figurare consueverunt (*Schol. Aristoph. plut.* 218.).

---

CAP. IV.

FLORA HIPPOCRATICA.

Post Herodotum primus fere profanus auctor, qui superest, Hippocrates Coss putatur. Librorum tanten ipfius nomine circum latorum collectio variis omnino auctoribus remotiorum temporum adfcribenda est. Etenim ex Aſclepiadum familia, qui templo Coo praefecti erant, ſeptem fere Hippocratia nomini appellantur; eorum primus, Gne-

fidici filius, Miltiadi tempore aequalis, ultimi autem, Thymbraei et Praxianaotis filii, Ptolemaei Philadelphi tempore vixerunt. Per totum id ducentorum quinquaginta annorum spatium compositi sunt libri illi, qui unius Hippocratis, Heraclidis filii nomen gerunt (Cf. *hist. meam med.* 1; p. 366 f.).

Univerſa plantarum cognitio his medicis auctoribus ſolummodo valet ad medicamenta inde petenda. Nusquam deſcriptio occurrit, qualem noſtra tempora tam volunt. Nomina nonnunquam omittuntur ipſa, e. g.: „Planta, cuius folium Aro ſimile eſt, ſed album et lanuginofum, atque hederæ folium magnitudine aequat“ (*ulo. p.* 878.).

Alibi (*morb. mul.* 1. 626.) „dulcis *ἀλκωνίτις*“ citatur. *Galenus* (*expof. voc. Hipp.* 534.) aliter eam vocem explicare nequit, quam per *oleris* cuiusdam ſylveſtris ſpeciem. Hanc plantam *Melch. Guilandinus* arbitratur (*ad Conr. Gefner. inter Matthiöl. epift.* 2, 85.), *Cyperum eſculentum* eſſe. Ipſi etiam *Conr. Gefnerus* adſtipulans, *Moly* omnino *Dioſcoridis* adiungit (*ib. p.* 92.). Sed refutat uberrime et ſufficienter *Matthiölus* (*ib. p.* 96.). Sic bis (*morb. mul.* 2, 644. *epid.* 5, 1151.) „radix“ *κατ' ἐξοχὴν* laudatur. *Galenus* (*l. c.* 554.) arbitratur, plantam intelligi ſine caule, flore ac fractur, cuius terna folia duos digitos lata humi procumbant. E qua quidem explicatione nemo poterit plantarum ſpeciem deter-

minare: itaque summa florae Hippocraticae difficultas inde patet.

Neque tamen eo minus experiamur, quid, *Erotiano*, *Galeno*, *Theophrasto* et *Dioscoride* adiuvantibus, in his obstaculis praestare possimus.

*Blitum capitatum* (βλίτον, affect. 526.) ole-  
ribus adnumeratur, quae alvum ducant: confirma-  
tur id *Dioscoridis* testimonio (2, 143.).

*Amomum Cardamomum* (καρδάμωμον, morb.  
mul. 1, 603.) ante Alexandri ἀνάβασιν Graecis  
ignotum fuisse videtur. Libri etiam, in quibus  
memoratur, Ptolemaeorum aevum sapiunt.

*Amomum Zingiber*, *Menestheo* et *Xenocrati*  
dicitur Ἰνδικὸν Φάρμακον (morb. mul. 2, 666.).  
Alii vero perhibuerunt, plantam esse Piperi simi-  
lem, cuius fructus μυρτιδανὸς audiat.

*Piper nigrum* (πέπερι, vict. acut. 401. morb.  
3, 494.).

*Olea europaea*. Κοτινὰς (morb. 3, 495.) vi-  
detur fructus oleastri esse (*Galēn. exposf. voc.*  
*Hipp.* 506.).

*Salvia officinalis*, *cretica* et *triloba*. Tres  
hae species ἐλελίσφακον videntur significare, quod  
saepius occurrit.

*Iris florentina* (ἶρις, morb. mul. 2, 673.).

*Cyperus longus* (κυπείρον, vict. acut. 409.).  
Eius radices odoratae officinales.

*Andropogon Nardus* (σχοῖνες εὖσμος, morb. mul. 2, 675.).

*Panicum italicum* (πέγχεον, morb. mul. 1, 619.).

*Hordeum vulgare*. Varietas eius, κριθή Ἀχιλλῆς (morb. 3, 496.), laudatur. Distinguit eam *Theophrastus* (hist. 8, 4.) spicis ipsi folio infidentibus et granis satis ponderosis.

*Rubia tinctorum*, ἱερὸν θρόνον, vict. acut. 407.).

*Convolvulus Scammonea* (σκαμμώνιον, morb. mul. 1, 597.).

*Hyoscyamus albus* (ὕος κύαμος).

*Atropa Mandragora* (μανδραγόρα, fistul. 890.).

*Anchusa officinalis* (ἀγκουσα, ulc. 879.).

*Anagallis arvensis* (ἀνάγαλλις ib.).

*Solanum nigrum* (στενύχρον, ulc. 875.).

*Cyclamen europaeum* (κυκλόμινος morb. mul. 1, 612.). Drafticum succum exhibebant.

*Verbascum Boerhaavii* (Φλόμος ib.).

*Viola odorata* (λευκὸν τὸ μέλαν, nat. mul. 570. Cf. antiqu. meas bot. p. 4, 5.).

*Zizyphus vulgaris* (ζάμνος, affect. 525. Cf. Dioscor. 1, 119.

*Bupleurum rotundifolium* dicitur quibusdam βούπρηστις (morb. mul. 1, 619.) esse. *Theophrastus* (hist. 7, 8.), *Plinius* (22, 22.)

et *Galenus* (l. c. 450.) olus sylvestre habent  
βούπρηστιν.

*Tordylium officinale* i. *Ligusticum pelopon-*  
*nense* complectitur σάσειλ (vict. acut. 387. fistul.  
884.). Illud dicitur *Dioscoridi* (3, 63.) cre-  
ticum, hoc (3, 62.) Sefeli peloponnesiacum.

*Peucedanum officinale* (πενκεδανόν).

*Conium maculatum* (κόνειον).

*Athamanta cretensis* (δαῦκος) cuius semina ro-  
borantia dicuntur et calefacientia.

*Athamanta Meum* nonnullis videtur μόδον ῥίζη  
esse (vict. acut. 408.). Sed *Caelius Aure-*  
*lianus* (acut. 3, 8.) interpretatur bryoniam.

*Cuminum Cyminum* (κύμινον αἰθιοπικόν, morb.  
mul. 1, 603.).

*Cachrys cretica* (κάχρυς, nat. mul. 578.).

*Cachrys ficula* (ἱππομάραθρον, nat. mul. 572.).

*Crithmum maritimum* (κρήθρον, morb. mul.  
1, 591.).

*Smyrniium Olus atrum* (ἱπποσάλλον, morb.  
mul. 1, 603.).

*Anethum Foeniculum* (μάραθρον, morb. mul.  
1, 597.).

*Ferula tingitana* (σίλφιον), cuius semen Φύλ-  
λον, vel λιβυκόν vel αἰθιοπικόν dicitur (morb. mul.  
2, 626. 651. 670. nat. mul. 578.). Optimum  
Silphium erat Cyrenaicum (Cf. *Annales meos hist.*  
*med.* 1.). Multo serius innotuit ὁπὸς Μηδικός, ο



*Ferula Aſa foetida*, cuius meminerunt *Strabo* (11. p. 797.) et *Eustath.* ad *Dionys. Perieget.* v. 1017.

*Bubon Galbanum* (χαλβάνη vict. acut. 402.).

*Thapsia Asclepium*. Acris et causticus succus, θάψος draſticum purgans constituit, saepius obvium.

*Apium Petroselinum* (σέλινον, praesertim ἡμερον.).

*Apium graveolens* (σέλινον ἔλειον, affect. 529. vel σίον.). Cf. *Anguillara* p. 122.

*Pimpinella Anisum* (ἀννησον, morb. 3, 490.).

*Pastinaca Opopanax* (πάνακες, vict. acut. 406.). Seniores addito Ἡρακλείῳ id distinxerunt ab Ἀσκληπίῳ (*Laſerpitio hirsuto*) et χιρωνίῳ (*Laſerpitio Chironio*). Sed *L. Chironium* *L.* valde dubium est. *Gouanus* enim (*illustr.* p. 20.) contendit, idem esse cum *Pastinaca Opopanace*. Addit etiam se ex hac planta nullum principium reſiuoſum elicere potuisse. Quod conceditur, quum clima monspeliacum a graeco longe differat (Cf. *Savigny in Encycl.* 4, 719. 720.).

*Atriplex hortensis* (ἀνδράφαξις l. ἀτράφαξις, morb. mul. 1, 597.).

*Beta vulgaris* (σεῦτλον, vict. acut. 404. Τεῦτλον morb. mul. 1, 609.). Utraque planta olerum ad instar edebatur.

*Sambucus Ebulus* (αἰτῆ, morb. 2, 468.).

Folia alvum laxare dicebantur.

*Rhus coriaria* (ῥοῦς ἰσχυρή, nat. mul. 572.).

*Tamarix gallica* (μυρική, haemorrh. 894.).

*Scilla maritima* (σκίλλα; vel etiam σχίνος, morb. mul. 2, 670. Cf. *Plutarch. Pericl.* 153. *Galen. l. c.* 576.).

*Asphodelus ramosus* (ἀσφόδελος ulc. 882.).

*Narcissus poeticus* (νάρκισσος). Bulbi officinales erant (*Diosc.* 4, 162.).

*Acorus Calamus* var. indica (κάλαμος μυρσφινος morb. mul. 2, 651). Quae in Guzurate spon-  
te crescit, post Alexandri demum expeditionem  
Graeciam adlata fuit.

*Daphne Cneorum* (κνήστρον) *Galenus* sic ex-  
plicante.

*Daphne Gnidium*. Semina (κέκοι Κνιδίοι)  
draftica.

*Erica arborea* f. *scoparia* (ἑρίκη, nat. mul.  
572.).

*Polygonum Persicaria* πολύκαρπον (morb.  
mul. 1, 615.) esse videtur, quum *Galenus* cog-  
nomen illi κραταίωγονον putat. Hoc autem *Dio-  
scorides* (3, 138.), *Plinius* (27, 8.) et  
*Galenus* (fac. simpl. 7, 94.) ita exponunt, ut  
manifesta sit Linnaeana species.

*Laurus Cinnamomum* et *Cassia*, κινναμόμον et

κασιός nomine semel occurrunt: (*morb. mul. 1, 609.*).

*Ruta graveolens* (πάγων).

*Saxifraga Cotyledon* (κοτυληδών).

*Gypsophila Struthium* (στρουθίον, *nat. mul. 571.*). In Andro. infula litus habitare.

*Sedum Anacampseros* (τηλέφιον, *nat. mul. 573.*).

Cf. *Dioscor. 2, 217. I. Bauh. hist. 2, 682.*

*Sedum album* f. *acre* (ἐπίπετρον, *ulc. 875.*).

*Euphorbia Characias* (τιθύμαλος).

*Euphorbia Apios* et *Peplis* videntur succum acrem praeuisse, qui πέπλου et πεπλίου nomine toties occurrit. Similem substantiam, *μηκώνιον* f. *μήκωνα λευκήν* largiebatur forte *Euphorbia Paralias* (Cf. *Föëf. oecon. Hipp. p. 249.*).

*Sempervivum tectorum* (κρινάνθεμον, τὸ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν Φυόμενον, *nat. mul. 570.*).

*Myrtus communis* (μυρσίνη, *morb. mul. 1, 599.*) cuius baccae adhibebantur.

*Punica Granatum*. Fructuum cortex adstringens σίδειον dicitur, grana vero κόκκωνες (*morb. mul. 1, 606.*).

*Crataegus Azarolus* forte est ἀμαμηλὶς (*morb. mul. 1, 607.* Fructus cum melle componitur. *Athenaeo* teste (14, 570.) est dulcis et ἀπυρηνός: arbor cum malis simul floret. *Galeno* hand facile adfentiri licet, dum (*facult. simpl. 6, 83.*) ἀμαμηλῖδα eandem habet ac ἐπιμηλῖδα et

*Arbutum Unedonem.* Haec enim autumnio floret,  
nec cum malis componi potest.

*Sorbus domestica*, cuius fructus οὔα appellantur (*vict. acut.* 405.).

*Rosa canina* (κυνόςβατος *ulc.* 875.).

*Potentilla argentea* est πεντάφυλλον illud, quod albidum et tomentosum Tormentillam altitudine superat (*ulc.* 880. Cf. *Grimmii interpretat. germanicam.*).

*Tormentilla erecta* (πεντάφυλλον μέλαν.).

*Capparis spinosa*. Foliis et radice cortice causticis utebantur externe (*hist.* 890. *Diosc.* 2, 167. *Galen. fac. simpl.* 7, 88.).

*Cistus creticus* (κισθός, *morb. mul.* 1, 614.).

*Delphinium Staphis agria* (σταφίς ἀγρία, *nat. mul.* 584.).

*Nigella fativa* (μελάνθιον, *steril.* 675. Cf. *Diosc.* 3, 93.).

*Paeonia officinalis* (γλυκυσιδή χηραμὶς et μέλαινα, *morb. mul.* 1, 611.).

*Anemone coronaria* (ἀνεμώνη, *morb. mul.* 1, 598.).

*Aconitum Cammarum* (κάμμαρον, *loc. in hom.* 411.). *Dioscorides* saltem Hippocratis κάμμαρον idem existimavit ac ἀκόνιτον (*Erotian. gloss.* 214.). Hecates Aetiae filiae inventum aconitum (*Diodor. Sic.* 4, 45.).

*Nelumbium speciosum* (κύαμος αἰγύπτιος.).

*Ranunculum creticum* et *grandiflorum* complectitur βατράχιον, quod (*nat. mul.* 570.) ob acrem indolem commendatur.

*Helleborus orientalis* est celeberrimus illē ελ-  
λσβορος μσλας, qui optime provenisse in insula An-  
ticyrā, haud procul ab Euboea, et in Olympo  
Asiae minoris dicitur. Ibidem et *Tournefortius*  
nostram speciem observavit, quae a viridi foliis sub-  
tus pilosis, caule ramoso et floribus subrubicundis  
differt (*Lamarck. encycl.* 3, 93. *Hayne offic.*  
*Gewächse*, t. 2.). *Melampodium* dicebatur, quod  
vatem illum antiquum Melampum Proeti filium  
huius radice ope medicinam fecisse ferebant  
(*Diosc.* 4, 151.). Quid, quod *Pausaniae*  
(10, 37.) testimonio, Amphictyones, Solonis tem-  
pore Cirrham obsidione tenentes, fontem fluminis  
Plisti ea radice venenarunt.

*Teucrium Scordium* (σκόρδιον.).

*Teucrium Pseudhyssopus* (ψσσωπος, *morb.* 3,  
490.)

*Teucrium Polium* (πόλιον.).

*Mentha Pulegium* (γλήχων, *morb. mul.* 1, 606.  
et χλωρή dicta, *affect.* 525.).

*Mentha sativa* (μίνθος, *affect.* 529.) et ἡδύοσ-  
μον (*nat. mul.* 570.).

*Origanum creticum* (όρίγανον, *morb. mul.* 1,  
609.).

*Origanum Dictamnus* (διπταμνος κρητικός. Cf. Diosc., 3, 37.).

*Marrubium Pseudo Dictamnus* (διπταμνος.).

*Marrubium creticum* f. *peregrinum* (πράσιον, ulc. 878.)

*Satureia capitata* (θύμος).

*Thymbra spicata* (θύμβρα).

*Ocimum Basilicum* (ώκιμον, affect. 529.).

*Sesamum orientale* (σήσαμον).

*Vitex Agnus* (άγνος).

*Lepidium latifolium* (καρδαμύς, morb. mul. 1, 495.) et *καρδαμύς* (ulc. 876.), quod, Galenō auctore, idem est ac *σκυρίδιον*.

*Isatis tinctoria*. Folia epithematibus inferiebant.

*Erysimum officinale* (έρυσιμον).

*Cheiranthus Cheiri* (λυνκούριον. Cf. antiqui meae bot. p. 10.)

*Sinapis nigra* (νάπυ).

*Malva rotundifolia* (μαλάχη) Olus vescenti, cum Mercuriali et Blito componitur (Cf. Hesiod. op. et dies, 40.).

*Genista aspalathoides* Lam. (μελιανα, έρίζα, morb. nasf. 2, 660.) Galenus (l. c. 520.) ἀσπάλανθον ἀρωματικὸν explicat: hic autem, nisi fuerit *Genista canariensis* (quod negat Valer. Cordus annot. 1, 6.) est saltem haec species a *Paired* in *Barbarea* iuventa.

673.). Nonne tamen melius cum *Caluo* legeris:  
 διὰ τοῦ ἀσπαλάθου· ξυνδῆς ἐξήσθαι.

*Pinus Pineae*: fructus: κριταλοί, vict. acut.

409. Cf. *Athen.* 2, 16. p. 57.

*Cucumis farioux* (κολοκύνθης). Cf. *Aristot.*  
*probl.* 20, 14.

*Cucumis prophetarum* (σικυή), quam *Galenus*  
 et *Βουβαλίον* dici ait.

*Cucumis Melo*. (σικύος πείπων, adfect. 529.  
 Cf. *Athen.* 2, 27.

*Cucurbita Citrullus* (ἑτερος πείπων ib.).

*Ricinus communis*: (καρίων: *morh.* mul. 2,  
 649.). Idem docet esse *Galenus* ac κβι. *He-*  
*rodotus* (2, 94.) τὰ σιλλινώθους vocat, quae  
*Aegypti* nominent κβι.

*Hippophaë rhamnoides* (ἵπποφάες).

*Populus graeca* (αἰγυγός: *τριχάκη* nat. mul.  
 571.). Commendantur gemmae resinosae fragran-  
 tes κόκκων nomine (Cf. *Stapel. ad Theophr.*  
 3, 14. p. 218.).

*Mercurialis annua* (λωζώστις): *Olus vesicum*.

*Pistacia Terebinthus* (τέρμινθος, *fistul.* 888.).

*Tamus complanis* (ἀμπέλως ἀγρία, ἥ ἐνίοι  
 καλοῦσι ψιλώθειον, *fistul.* 889. Cf. *Diosc.* 4,  
 163. *Method.* vict. acut. 403. *Caellius Aure-*  
*lianus* (acut. 3, 7.) *Bryoniam* interpretatur.

*Ruscus aculeatus* (μυρρῶν ἀγρία, *ulc.* 880.  
 Cf. *Diosc.* 4, 129.).

*Celtis australis* (λευτός. Cf. antiqu. meas bot. p. 49.)

*Veratrum album* (ἄλβιστρος λευκός.).

*Acacia vera* Willd. (ἄκανθος αἰγυπτίη, morb. mul. 1, 614.)

*Adiantum Capillus* (ἀδίατρον, fistul. 888.).

*Zostera marina*. (Ζόον θαλάσσιον, nat. mul. 670.).

## CAP. V.

## PRISCORUM PHILOSOPHORUM

## RES HERBARIA.

Quum Asiae minoris incolae, libertate, victus copia et commercio navigationis gaudentes, primum philosophari coepissent, Deorum natura et mundi ortus et generatio hominum, animalium et plantarum, eos praecipua admiratione adfecerunt. Coeperunt enim, ut cum *Aristotele* (*metaph.* 1, 2.) loquar, ab admiratione omnes, priscaeque philosophi Φιλέμωδοι fuerunt, quod μῦθοι eum animi affectum producant, deductis effectibus, quae sub sensus cadunt, et divinis, quae haud observantur, causis. Paullatim fere, si ad verum res exigatur, mythologia Homeridarum et Hesiodi ablit in cosmogoniam Ionicorum: de iisdem rebus et eodem fere modo ac poetae, philosophabantur sapientiae antistites.



Prius autem physicam plantarum doctrinam, quam historiam earum naturalem coluerunt. Variarum, quas monstrant corpora naturalia, formarum cognitione destituti, alieni a specierum et generum informatione et a constructione systematum, multo faciliorem et generis humani infantiae magis congruam incesse runt viam, qua ortum et generationem crediderunt poetice explicare. Quum instrumenta et encheireses eos laterent, quibus fabrica plantarum interna detegitur, substituerunt fere in comparandis animalibus, quae ipsis propiora videbantur, cum plantis, et in revelandis legibus, quas sequuntur divinae naturae et animalia et plantas regentes. Prior itaque physiologia plantarum potius philosophicae pars fuit, quam ratio ciniorum concentus, quae ex observationibus proficerentur.

Sapientiae omnis antistes THALES Milesius, in universo corporum ambitu, quae viribus internis moventur, nil nisi animas, daemones et divinas naturas invenit. (*Aristot. de anim.* 1, 2. 5.). Ut in Iliade (14, 200.) Oceanus Deorum pater Deorumque omnium, materque fertur Tethys, ita ex aqua Thales omnium rerum ortum deduxit. Arbitratur autem Aristoteles, nutrimentorum humidam naturam et feminum omnium ortum e guttula liquida ii opinioni ansam praebuisse (*metaph.* 1, 3.).

## PHILOSOPHORUM RES HERBARIA. 51

Primum omnium, quos memoria novit, ORPHEUM de herbis curiosius aliqua prodidisse, *Plinius* (25, 2.) testatur. Neque tamen thraico illi hierophanti, Oeagri filio, adscribere poteris, quae impostorum caterva, divo illius nomine abutens, multo serius confarcinavit. (*Cl. hist. meam medic.* 1, p. 116.).

PYTHAGORAS Samius, clarus sapientia, pri-  
mus volumen de herbarum effectibus composuisse, Apollini Aesculapioque et in totum Diis immortalibus inventionem et origine assignata, *Plinio* dicitur (*l. c.*) A Perfidis Aegyptique Magis eos effectus accepisse, adeoque ad hos attonita antiquitas fuisse fertur, ut adfirmaret etiam dicta incredibilia. Sic aquam congelari docuit Pythagoras plantis, quas *Coryceam* et *Calliciam* appellavit, dubio in his et ipso *Plinio* (24, 17.). Ex Aegypti sacerdotibus hausit Pythagoras cum *Epimenide* Cnossio Scillae maritimae usum, quem in sua ipsius vita protrahenda, aceto condito bulbo, praestantissimum invenisse dicitur: aceto enim scillitico ad centesimum et decimum septimum usque annum vitam prolongasse (*Pseudo - Galen. de euporist.* 463.) Brassicae quoque laudes non parcius ab ipso celebrabantur (*Plin.* 20, 9.). Laudatissimum ipsi et anisum, maxime adversus scorpiones vino bibitum (*Plin.* 20, 17.). Sinapi principatum habere ex his, quorum sublimis vis feratur, iudicavit, quoniam non

aliud magis in nares et cerebrum penetret (*Plin.* 20, 22.).

EMPEDOCLES Agrigentinus, e Pythagorae quidem schola profectus, peculiarem tamen elementorum quatuor doctrinam poematibus prodidit. E terra et igne potissimum plantas oriri, sursum per ignem, deorsum in terram crescere (*Arist. de anim.* 2, 4.). Id quod *Theophrastus* ita exponit (*causs.* 1, 13.): aethera diffundi per ramos, terram per radices. Ea autem elementaris theoria esotericis maxime tradebatur, qui, iam initiati, materialismum haud amplius respuebant.

Exoterici vero nil nisi priscam poëticam philosophiam, quae populo placeret, ab ipso hauserunt. Animatas esse plantas, quin animalia statuebat, quod nutent et ramos habeant directos, qui inflexi si remittantur, ilico repetant locum suum ac rectitudinem (*Plutarch. physic. phil. decret.* 5, 26.). Priores etiam ortu animalibus esse plantas, μηδαμῶς enim ὁλοκλήρους et ἀσυμΦυέσι τοῖς μορίοις διεzeugμένας esse, quum in animalibus partes iam coalitae, vitaque eiusmodi propria cuiusvis partis in animalibus desit (*ib.* 5, 19.). Hinc etiam recte dicere potuit: id quondam fruticem, avem et piscem fuisse (*Diogen. Laërt.* 8, 77. *Clem. Alexandr. Strom.* 6, 627: *Athen.* 8, 17. p. 365.), quod cum Pythagorae metempsychosi congruit. Eam autem doctrinam imbibisse, et inde patet, quod

## PHILOSOPHORUM RES HERBARIA. 53

laurum putaverit dignissimam arborem, in quam homo transiturus sit (*Aelian. hist. anim.* 12, 7. *Plutarchi sympo.* 3, 1, 2.). Esse vero sexum utrumque mixtum in plantis et unitum, secedere tandem, dum e plantis animalia fiant (*Arist. gener. anim.* 1, 23. ad quem locum explicandum cf. *Philopon. h. l.* et *Sturzii Empedocl. p.* 357.). Ceteroquin animam inesse plantis suam, quae intelligentia et γνῶσις, appetitu et sensatione polleat (*ib.* 1, 1.). Ipsa ratione frui, *Sextus Empiricus* (*adv. Mathem.* 8, 286.) adducto Empedoclis ipso versu, testatur. Hinc etiam ὁρῶντιν, ova parere more animalium, dixit, et folia cum capillis bestiarum et piscium squamis congruere (*Arist. meteor.* 4, 9. *gener. anim.* 1, 23. *Theophr. caus.* 1, 16.). Radicem vicem capitis et oris gerere, cum nutrimenta accipiat (*Themist. ad Arist. de anim.* 2, 4) quae Aristoteles fere repetit.

Similia fere tradidit ANAXAGORAS Clazomenius; Hippocrati Heraclidis filio tempore aequalis. Terram esse matrem, patrem plantarum vero solem. Animalia esse plantas, intelligentia et γνῶσις praedita. Ipsum quoque ducere spiritum, quem ex aëre foliis absorbeant iterumque exhalant (*Pseudarist. de plant.* 1, 1. 2.).

DEMOCRITUS quoque Abderites, peragratibus ab ineunte adolescentia Perside et Aegypto, Magos confectatus, mirabiles et magicas herbarum virtu-

tes oelebrasse dicitur (*Plin.* 24, 17.). Composuit etiam librum, in quo incognitas illas et mirabiles tradidit vires. Esse e. g. herbam, cuius contactu illatae ab ave quadam exiliret cuneus a pastoribus arbori adactus: quae, etiamsi fide carent, admiratione tamen implent, coguntque confiteri, multum esse, quod vero superfit (*Plin.* 25, 2.). Neque abest ab his Democriteis suspicio serioris, Alexandrinae forte, originis, quum *Φυσικά καὶ μυστικά*, quae ipsius nomen ferunt (*ed. Pizimontii Patav.* 1573. 8.), Saporem, Persarum regem, • quarto saeculo, nominent. Exstasse tamen praeterea et physiologiam plantarum Democriteam *Theophrasti* et *Diogenis* temporibus, inde patet, quod ille (*causs.* 2, 16.) opinionem Democriti adleget: plantas rectas aut frictas vita breviorē gaudere et maturius florere: Diogenes autem disertis verbis eos libros nominet (9, 47.).

Fuisse hos eosdem libros, quos *M. Varro* legerit (*de re rust.* 1, 1.) quosque excerptos habemus in Geoponicis, credibile est. Democriti *Georgica* citat *Columella* (11, 3.). Serioris tamen multo aetatis esse hos libros, patet e loco *Geopon.* 10, 73. ubi pruna armeniaca *Βερίνοκκα, τέμινθον τερεβινθον* vocat, ac si Latinus fuerit saeculorum primorum aerae nostrae.

E Democriti adseclis *Apollodorus* plantam sensitivam, Aegyptiam aut Arabicam, observavit, quae

tactum fugeret, collabentibus foliis (*Plin.* 24, 17.).  
*Averrhoa* fit *Carambola* five *Mimosa polyacantha*,  
 ambigitur.

---

## CAP. VI.

## ARISTOTELES.

Summus ille Graecorum philosophus, totam rerum naturam amplexus, a sepium et nautilorum aliorumque ostracodermatum structura et generatione, ad elephantum usque et dipodes et canes aureos immenso ingenio ac sagacitate incredibili omnia percontatus, ad conspectum totius naturae et adfinitatum obviarum ea applicavit. Tantum abest ut plantas neglexerit, ut potius duos integros libros de iisdem conscripisse ipse fateatur. Theoriam vegetabilium vocat hos libros (*hist. anim.* 5, 1.) et alio loco (*de brev. vit.* c. 6.) uberius ea semet explicaturum esse in libris de vegetabilibus pollicetur. Citant eos libros *Diogenes Laërtius* (5, 25.) *Athenaeus* (14, 18. p. 652.) et scholiastes *Nicandri* (v. 645, p. 42.).

Neque tamen genuini illi libri etiamnum exstant, neque cum gravitate, dignitate et eruditione Aristotelis vilis illa compilatio congruit, quam *de plantis* vulgo inter Aristotelicos libros reperimus, quod mox uberius probabitur.

Aristoteles ipse, antequam Platonis schola aperta esset, eorum temporum more, radices et herbas quaesivisse et officinam instituisse fertur, unde Epicuro *Φαρμακοπώλης* audit (*Athen.* 8, 13. p. 354.). Nec negari potest, et in genuinis ipsius scriptis experientiam rei herbariae apparere haud vulgarem, maxime vero ratiocinia speciosa de natura plantarum ac consensu cum animalibus aut differentia ab iisdem. Incredibili ingenii vi ac solida subactaque doctrina inquisivit tum in gradus et adfinitates organismorum, tum in functiones plantarum et phaenomena singularia, quae ex ipsius systemate philosophico exponere satagebat.

Intimo animo Aristoteles ingentem illam ideam conceperat de serie continua organismorum, quae sensum perfectiores abeunt in minus perfecta. „Natura,“ inquit, „continuo progreditur ab inanimatorum ad animalia, per viva quidem, quae tamen haud animalia sunt, ut satis exigua super sit differentia vicinorum satis sibi corporum. Inter marina animalia plura sunt, quorum membra soluta vitam protrahunt, sicut *ἐνὶ πτερῶν* dictum (*Sedum acre*) clavus appensum diu vitam protrahere potest. Talia marina corpora quorsum pertineant, ambigitur“ (*part. anim.* 4, 5.). Et alio loco (*hist.* 8, 2.) eadem repetit, addita *ὅτι καὶ ἀδελφῶν*, cum plantis comparatione. Esse eadem omnino plantas, respectu animalium, reliquorum graduum

nuncupanda. Sensum etiam alia marina corpora minime, alia perobscurè manifestare. Tertio loco (*generat. anim.* 3, 11.) plantas considerat velut ὀστρακοδέσματα terrestria, haec vero velut plantas marinas. Quanto ζωτικότερον sit aqua terrâ, tanto vivaciora etiam esse ostracodermata plantis. Cum insectis etiam plantas comparat, quod illorum membra seiuncta pariter ac plantarum partes possint vitam protrahere. Apparere id praecipuis in ἀποφυσίαις vegetabilium: eas enim partes omnes vivere, quae ἀρχὴν τῇ δυνάμει ἔχουσιν in se contineant (*de brev. vit.* c. 6.).

Insignem credit differentiam utriusque regni statui posse, quod plantae nullis excrementis (περὶτρώμασι) gaudeant; unde et radicem attrahere nonnisi praeparata iam nutrimenta: terra enim, et calore eius uti velut ventriculo (*part. anim.* 2, 3.). Exiguum περίτρωμα, quo plantae gaudent, suavem producere ipsi videtur odorem, quem in plantis pluribus, in animalibus vero perpaucis animadverteris. Calida enim et sicca est plantarum natura, sicut *Anaxagoras* iam monuerit, terram matrem, solem vero plantarum patrem esse. Unde exponenda ipsi videtur fragrantia frequentior herbarum, fructuum et succorum, quae sub ferventiori sole et in terra aridiore gignuntur (*problem.* 13, 4.).

Unicum agnoscit *Aristoteles* totius vegetationis



finem, fructuum generationem. Hinc etiam, quo imperfectiora animalia, eo magis plantis hoc respectu similia ipsi videntur (*hist. anim.* 8, 1.). Omnis nutritio, omneque plantarum incrementum ad fructificationem tendere ipsi videtur (*gener.* 1, 8.). Semen quoque plantarum hactenus differre a feminibus animalium, quod illa non ex omnibus partibus proveniant, sed quod per se subsistant et in aliud abeant individuum (*gener. anim.* 1, 18.).

Radice plantarum et oris et capitis vicem gerere, si aliena liceat componere organa, si iisdem gaudeant functionibus (*de anim.* 2, 4.). Sensum in attractione nutrimentorum et in nutritione ipsa negandum plane non esse, hinc etiam vivere plantas (*de anim.* 2, 2.).

Sexus differentiam in plantis nullam agnovit *Aristoteles*, ut gradus iterum ad minus perfecta animalia statuatur: namque et in his iam connubium sexus utriusque in eodem individuo observatur (*gener. anim.* 1, 23.). Mixtio haec utriusque sexus ab *Empedocle* iam adfuit, axiomatis loco ab *Aristotele* collocatur (*gener. anim.* 3, 10.).

Sed liceat ad singulas transire observationes. Eminent autem ea praecipue de feminibus vetustioribus, facilius germinantibus quam recentiora, quod haec contineant *περίττωμα* et debiliora sint. (*probl.* 20, 17.). Quae de olerum feminibus hic intelli-

git, nos praeprimis de cucumerum aliorumque pinguibus feminibus experti sumus. Radiculas (ἐαφαιδές) eo acriores esse, quo tenuiores sint (*probl.* 20, 11. Cf. *Athen.* 9, 2.). . Si quis σέλινον radice tenuis circumfoderit et καρχύδια circumposuerit, multo maiores et crassiores fieri radices. Ea καρχύδια vertunt Geoponici (12, 23.) in ἄχυρα, ut vel paleae sint vel hordeum tostum (*problem.* 20, 8.). . Quae florent, fructu nonnunquam carere videntur, ut σίκυος (*Cucumis Melo*) et κολοκύνθης (*Cucumis sativus*) et ῥόα (nonne ῥόος *Cotinus*?) seu forba ἀκαρχα, sed his tamen fructam esse: pericarpium esse florem in Cucumere Melone (*probl.* 20, 3.). Rosas umbilico aspero (*germine hispido*) instructae (nonne *R. muscosa aut moschata*) suavis olere quam quibus germem laeve sit (*probl.* 12, 8.). Inquiri etiam in rationem, cur ἵπποσέλινον (*Smyrnium Olus atrum*) bienne sit? (*probl.* 20, 7.)

Non desunt tamen exempla, ubi genio aevi sui et mirabilium amor indulget. Sic rutam pulcherrimam et plurimam enasci arbitratur, si ficui inferatur, quod fide omnino vacat (*probl.* 20, 18.).

#### PSEUDO-ARISTOTELES DE PLANTIS.

Haud necessarium arbitror, quod *Iul. Caes. Scaliger* immensam eruditionis suppellectilem, integreque voluminis laborem in eo collocaverit, ut

supposititios esse hos libros multoque iunioris aetatis, doceret. Namque cuius, qui vel primis tantummodo labris linguae graecae rudimenta gustaverit, vel paucissimos Stagiritae genuinos libros legerit, luce meridiana clarius apparere necesse est, *tum* summe indignam esse tanto philosopho ratiocinatorum (*si quae sunt*) et ipsius orationis rationem, *tum* nec Graece primitus scriptos esse hos libros, sed e, nescio quo medii aevi, scholastico libello versos tandem in Graecam linguam. Fuerit is interpretis ineptus aut impostor, *Maximus Planudes* (ut *Scaligero*) aut *Theodorus Metochita* (ut *mihi*) aut *Gennadius*, aut alius quispiam Graeculus saeculorum XIV et XV, perinde esse videtur.

Ineptum voco interpretem, aut, si mavis, auctorem, quod nullibi „lucidi ordinis“ amor, nullibi subacta doctrina, nusquam demum gravitas sermonis ac orationis dignitas apparet.

Nugis scholasticis de anima vegetabilium incipit, iisdem paullo intermissis dein pergit, iisdem denique finem orationi imponit. Nullum apparet argumentum cuiusvis capitis, nullus finis totius orationis, nulla cognitio plantarum. Ubi enim, ut paucula exempla absurditatis adferam, de plantis vel annuis vel perennibus negatur, abrupta protinus oratione, addit: „Neque possumus haec „omnia scire, nisi per syllogismos.“ Et paullo

post: „Non debemus perscrutari definitiones per singulas.“ Sermo barbarus: Φιτρὸν ponit pro καυλῷ. De antiquorum rei herbariae scriptorum libris loquens, barbаре satis adiungit: πῶς ἂν ἐπιμελῶς σκοπήσωμεν τὰς βλάβλους αὐτῶν, ἃς ἔγραψαν, καὶ δύνηθεῖν διερυνῆσαι τοῦτον τὸν μυελὸν ἐξείνῃ συνοπτικῇ. En ridiculam dictionem, quae Aristotelica esse debebat! Idiota de limpido vitis latice loquens cum pice eum comparat: in quibusdam plantis esse humorem ἀρχέγονον, sicut in Origano et planta, quae dicatur ὀπργαῖς. Quot verba, tot ineptiae! Ὀπργαῖς certe corrupta ex Arabibus mutuo accepta vox!

Genicula seu nodos graminum sua potius lingua quam graece nominat δεσμούςς, eosque (*quidne absurdius fingi potest!*) cum nervis animalium componit. Aristoteles, ut memoravimus, sexum utrumque haudquaquam distinctum esse in plantis contenderat: noster Pleudaristoteles omnino distinctum sexum tradit. Masculas plantas enim femper esse asperiores et duriores et horridiores, feminas debiliores et magis fructiferas. Vitam plantarum nullam esse, sensus enim causam vitae esse. (*En philosophum!*) Quae ἀψυχα sint, ψυχὴν οὐκ ἔχουσιν: ζῶν ἐστὶ τὸ μέσον, et quae sunt reliquae eiusmodi barbarae nugae.

Piget fere ac taedet adiungere, quae Oedipum poscunt, ut exponantur: βελάνιον τὸ δάλητιον.

μεταφυτεύμενον εἰς Αἴγυπτον ἢ Παλαιστίνην, γέ-  
νεσθαι βρώσιμον (Cf. *Matthiol. epist. lib. 5. p.*  
*211.*): ἀρτεμισίαν, quae inferatur in sylvestrem  
Artemisiam. (*Ecquis unquam haec audivit!*) ἀ-  
γρίαν μορίαν τὸ συγκόμορον: μορίαν in multas arbores  
inferi posse. Sed sufficit his subsistere, ut quam  
futilis et contemtu dignus sit is liber, quam parum  
cum Aristotelicis comparandus, pateat.

## CAP. VII.

## R H I Z O T O M I.

Peculiare hominum genus, quod a radicibus  
effodiendis nomen habet, a tota antiquitate Grae-  
ca fatis celebratum, neque indignum prorsus no-  
stra attentione, licet maxima eorum pars, litera-  
rum rudis, superstitioni dedita, radicibus et her-  
bis magicas tribueret virtutes, goëtica arte eas se-  
caret, praepararet ac venderet. Namque qui rhi-  
zotomi erant, *Φαρμακοπῶλαι* etiam nominaban-  
tur, *ἐπιτραγφδοῦντες*, ut *Theophrastus* (*hist. 9,*  
*9.*) ait, inventa sua ostentantes. Praeceperunt  
enim alias radices vento averso, alias corpore per-  
puncto effodere, alias noctu, interdium alias. Ag-  
gravare nonnullas caput aut oculos laedere, unde  
allia comedere et vinum forbere necesse sit, prius-  
quam adgrediantur radices. Precari autem in se-

cando, nec *ἀπορον* ipse Theophrastus indicat. Ineptum autem vult praeceptum rhizotomorum, quod ense acuto ter circumferibi radix debeat, aut quod circumfalcare ac plurima *περὶ ἀφροδισίων* fabulari. Inepta existimat praecepta, quod, qui helleborum secet, debeat aquilam cavere tam a dextra, quam a sinistra, ortum solis spectare et plurima precari.

Ea tamen superstitiosa barbaries rhizotomorum non impedivit quosdam, quin curatius in naturam inquirent vegetabilium bonasque publicarent de iis observationes. Exstiterunt iam *Theophrasti*, magis etiam *Athenaei* et scholiastarum temporibus opera *ῥιζοτομικά*, quae citare ii scriptores haud superfluum putarent.

ΘΗΡΑΣΥΑΜ Μαντινensem primum vocat *Theophrastus* (*hist.* 9, 18.) et *δαινότατον τὰ περὶ τὰς ῥίζας*, qui naturas plantarum et vires indagans, eandem plantam modo pharmacum esse, modo non esse, pro ratione hominis, qui ea utatur, praecepit. Ipse etiam *ἀπορον τὴν ἀπόλυσιν*, ope toxicum ex papavere et cicuta parati, invenit (*ib.* 9, 17.). Quod imitati Hispani e sola cicuta (*herba Apio petroselino simili*) id toxicum praepararunt (*Strabo* 3, p. 251.).

Thrasylae discipulum ALEXIUM, magis peritum in medicina indicat *Theophrastus* (9, 17.).

EUDEMUS *Φαρμακοπώλης* in se ipso tentavit

herbarum virtutes (*Theophr. hist.* 9, 18.). De oleribus scripsit (*Athen.* 9, 2. p. 569.) et brassicam distinxit in tres species, ἀλμυρίδα καὶ λαϊόφυλλον καὶ σελινούσιον, illam suavissimam, hanc crispam. Fuerit idem Rhodius, qui de physica scripserit, Aristotelis discipulus, nescio (*Simplik. in Arist. phys.* 1. f. 21.)

ARISTOPHILUS, et is Φαρμακοπόλος Plataicus, ad coctum remedia habuit (*ib.* 9, 19.).

Videntur ex his rhizotomis nonnulli physicae ipsi et oeconomiae operam dedisse, ut ex variis *Aristotelis* et *Theophrasti* locis patet. Sic CLEIDEMUS, qui de causa coruscationis et fulminis ratio cinatus est (*Aristot. meteor.* 2, 9.), morbos plantarum indagaturus, sicum scabie, oleam lichene, vitis τῷ ἔσθῃ affici prodidit (*Theophr. caus.* 5, 12.). Ex iisdem etiam partibus constare plantas ac animalia docuit (*Theophr. hist.* 3, 2.). Serenda esse frumenta occidentibus vergiliis (*Theophr. caus.* 5, 28.).

Physicus etiam MENESTOR fuisse videtur, cum de humore vegetabilium praeceperit, quem ὀπὸν vocasse dicitur (*Theophr. hist.* 1, 3.). Is de mori fructificatione nonnulla prodidit (*Theophr. caus.* 1, 21.). Aquatiles plantas naturae calidiores esse, quod gelu non enecentur (*ib.* 1, 26.). Nimis pinguem terram plantis nocere ob siccitatem facile contractam (*ib.* 2, 5.).

Phyſicus fuit **HIPPON**, quem *Aristoteles* (*de anim.* 1, 2.) citat. Omnes ſylveſtres plantas cicures reddi poſſe et vice verſa, obſervavit, unde ſpecie haud differre iure effecit (*Theophr. hiſt.* 1, 6.).

**DIOGENES** quoque, ſive fuerit Apolloniates, ſive alius, quem *Aristoteles* (*de gener. et corrupt.* 1, 6.) nominat, ex aqua putreſcente et mixtione cum terra plantas oriri docuit (*Theophr. hiſt.* 3, 2.).

**LEOPHANES** quis fuerit, latet. *Aristoteles* (*gener. anim.* 4, 1.) eum nominat, dum de ſubligando teſte alterutro ad procreandam ſobolem loquitur. *Theophrastus* (*cauſſ.* 2, 6.) citat eius ſententiam, quod humus atra optimum plantarum nutrimentum ſit.

**ANDROTION** oeconomus fuiſſe videtur. Namque quae de oleae et myrti amicitia (*Theophr. cauſſ.* 3, 15.) et de purgatione neceſſaria earum arborum (*hiſt.* 2, 8.) reliquit, eo fere redeunt. Eius de ficuum ſpeciebus locum citat *Athenaeus* (3, 3.) γεωργικὸν nominat librum (3, 7.).

Hi omnes Theophrasto priores. Quonam vero aevo vixerint ἱστορικῶν auctores ſequentes, haud facile erui poteſt.

**EUMACHUS** Corcyraeus (*Athen.* 15, 8. p. 681.).

**ANACREON** (*Schol. Nicandr. ther.* v. 590. p. 39.).

**MICTON** (*ib.* v. 617. p. 40.).



---

LIBER II.  
REI HERBARIAE INCREMENTA.

---

## CAP. I.

## THEOPHRASTUS ERESIUS.

Historicae cognitionis fundamenta egerant et medici et rhizotomi: philosophi de natura vegetabilium ratiocinantes viam muniverant, qua incedi poterat, si quis physiologiam plantarum ardentiori agitare studio cuperet: maxime vero Aristoteles scholam suam eo ardore inquirendi imbuerat, ut quivis ex eadem progrediens schola naturam perscrutari ac nova moliri gestiret. Quid quod tantus naturae amor in tota Peripateticorum schola vixit, ut ipsi risui *Luciani* obnoxia esset (*Vit. auct. p. 386.*).

Celeberrimus autem omnium verus rei herbariae parens, THEOPHRASTUS fuit Eresius, de quo uberius agere nostrum est.

## VITA THEOPHRASTI.

Eresius fuit, ex insula Lesbo, Melanthae fullo-  
nis filius. Nomen ipsius Tyrtamum fuisse, ab Ari-

stotele autem in Theophrasti mutatum, ferunt varii auctores, disertis vero maxime verbis *Strabo* (13, 918.) et *Diogenes* (5, 38.), ipso adnuente *Cicerone* (*orat.* 19.) qui divinitate loquendi nomen invenisse eum testatur.

Annus, quo natus fuit, sine dubio idem computatur, quo proelium ad Leuctram commissum est, nimirum Ol. CII. 3 = 370. ante Chr.

Praeceptores nominantur a *Diogene* (5, 36.) Leucippus, cives ipsius (ergo non Eleates) Plato et Aristoteles. Cum hoc vero tanta pietate et familiaritate coniunctus fuit, ut omnibus ille eum discipulis praetulerit, ipse quoque in testamento iusserit, dilecti praeceptoris imaginem in templo esse erigendam (*Diogen.* 5, 51.).

Quum Aristoteles in Chalcidem secessisset, noster illi in scholae regimine successit, quod Ol. CXIV. = 324. ante Chr. accidit (*Diogen.* 5, 36.). Tanta autem fuit ipsius auctoritas, tanta gloria in regenda Peripateticorum schola, ut bis mille ad eum confluerent discipuli: tanta etiam apud Athenienses existimatio, ut, quum ipsum Agnonides impietatis accusasset, parum abfuerit, quin accusator crimen in se ipsum retorquere cogeretur. Apud externos etiam in tam excelsam famae theatrum evectus est, ut Ptolemaeus Lagides eum Alexandriam invitaret (*Diogen.* 5, 37.).

Sophocle, Amphiclidæ filio legem fanciente,

ne quis philosophus scholae praeesset, nisi senatui populoque Atheniensi placeret, omnes fere philosophi et ipse Theophrastus in exilium abierunt, quod Ol. CXVIII. 3. = 306 ante Chr. accidit (*Athen.* 13, 9. p. 610.). Abolita autem ea lege et Sophocle punito reversi sunt exules et cum iis noster (*Diogen.* 5, 38.).

Summam senectutem attigisse et plusquam centum annos vixisse, facile ex ipsius verbis in praefatione ad *characteres* effeceris, ubi semet XCIX annos natum librum conscripisse, fatetur. At iampridem animadversum est, probabiliter pro *ἐνενήκοντα* legendum esse *ἑβδομήκοντα*. Namque *Diogenes* (5, 40.) anno LXXXV aetatis e vita discessisse manifesto testatur. Accidit id Ol. CXXIII. 3 = 285 ante Chr.

Aegre tamen, annorum licet pondere confectus, tulisse fertur, se vitam cum morte commutare debere, quum vivere coepisset. Ipfus enim dictum adlegatur: *ἡμεῖς, ὅπότε ἀρχόμεθα ζῆν, τότε ἀποθνήσκομεν* (*Diogen.* 5, 41.). Et *Ciceroni* (*tusc. quaeft.* 3, 28.) moriens accusasse naturam dicitur, quod cervis ac cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil interesset; hominibus, quorum id maxime interfuisset, tam exiguam vitam dederit: quorum si aetas potuisset esse longinquior, futurum fuisse, ut, omnibus perfectis artibus, omni doctri-

na hominum vita erudiretur: questum igitur fuisse, se tum, cum illa videre coepisset, exstingui.

Tantus autem, etiam post obitum, amor fuit civium erga eum, ut Athenienses πανδημε pedibus funus ipsius sequerentur (*Diogen.* 5, 42.). Vitae enim genere fuit suavi, moribus optimis, facundia propemodum divina, patriae amore tanto, ut bis eam a tyrannis liberaffe dicatur (*Plutarch. adv. Colot. p.* 1126.). Maxime beneficum eum et prudentissimum et laboris tolerantissimum vocat *Diogenes* (5, 36.). *Cicero* (*acad. quaest.* 1, 9.) ita moratum habet, ut praes se probitatem quamdam ac ingenuitatem tulerit. Neque tamen eo minus fregisse quodammodo auctoritatem veteris disciplinae: spoliaffe enim virtutem suo decore, imbecillamque reddidisse, quod negaverit in ea sola positum esse, beate vivere.

Quae utut sint, facundia tamen sermonis et incredibili fere vi dicendi omnes fere scholarum veterum antistites vicit: unde *την φην ιδίαν* nominare eum *Cicero* consuevit (*Plutarch. Cic.* 872.). De Demosthene etiam magnifice profecto et libere iudicavit, dignum esse urbe sua oratorem (*Plutarch. Demosth.* 850.). Ferunt insuper, dum orationes haberet aut lectiones, nullam omisisse corporis figuram, nullam vultus speciem aut manuum motum, quibus argumenta augere potuerit: semper etiani

corporis nitido et exacto cultu apparuisse (*Athen.* 1, 17. p. 21.).

Quum rei herbariae perquam studiosus esset, hortum privatum coluisse, post Aristotelis e vita discessum dicitur, Demosthene Phalereo, familiari ipsius in hoc sibi cooperante (*Diogen.* 5, 39.). Eum hortum aedesque omnes horto adiacentes amicis testamento legavit, iis, qui voluerint in eo una vacare literis atque simul philosophari; ea tamen lege, ut neque illum alienent, neque ut proprium quisquam possideat, sed veluti sacrum quoddam eodem iure ab omnibus possideatur. Nominavit autem, quos communiter uti eo horto praecepit, Stratonem et Callisthenem, Neleum et Hipparchum, Demaratum et Melantam, Demotimum et Pancreonem, Nicippum et Callinum (*Diogen.* 5, 53.).

#### SCRIPTA THEOPHRASTI.

Libri ipsius adeo numerosi et ex omni doctrinae genere tanta copia ornati, ut diversos eorum titulos 227 *Diogenes* numeret. Inter eos haud pauci satis ampli fuerunt, ut *πρώται προτάσεις*, quae octodecim; quaestiones quae viginti quatuor, posteriorum analyticorum et de animalibus, quorum utrumque septem libros comprehendit.

Nobis vero quum praeter novem (qui decem fuerant) libros de *historia* et sex libros de *caussis*

*plantarum* pauca etiamnum supersint, fatum scriptorum deperditorum enarrandum est.

Legasse ipsum omnes libros Neleo, Corischi filio, verba testamenti manifesto docent (*Diogen.* 5, 53.). Inter eos *Aristotelis* etiam fuisse scripta testatur *Strabo* (13, 906. 907.). Quum Neleus dein Scepsin Troadis migrasset, bibliothecam etiam Aristotelicam et Theophrasream eo avehi curavit: posteris suis reliquit, indoctis hominibus, qui, nulla adhibita cura, sub clavibus retinuerunt (*Strabo ib.*). Ab ipso autem Neleo Ptolemaeum Philadelphum libros plerosque mercatum Alexandriam transferri iussisse, *Athenaeus* auctor est (1, 1. p. 5.). Si *Straboni* fides habenda, plurimi tamen superfuerunt Nelei heredibus: namque, quum Attalicorum regum studium intellexissent, quibus Scepsis parebat, conquirentium libros ad instruendam Pergami bibliothecam, inepti Nelei heredes bibliothecam sub terra occultarunt, ubi blattis et humore vitiatos posteris tandem Apelliconi Teio ingenti pretio vendiderunt. Tenebatur is Apellicon librorum amore potius quam sapientiae studio: itaque erosarum particularum quaerens instaurationem, in nova transtulit libros exempla, lacunas non recte implens, ediditque libros ἀμαρτάδων πλήρεις. Quum statim post mortem Apellicontis, Sylla Athenas cepisset, is etiam huius bibliothecae potitus est: a quo Tyrannio Grammaticus, Φίλαριστος τῆς im-

petravit, ut sibi eius usus permetteretur: accesserunt etiam bibliopolae nonnulli, ineptis usi librariis, qui vitiose transcriptos libros et Romae et Alexandriae vendiderunt. Confirmat Apellicontis malam fidem *Athenaeus* (5, 14. p. 214.) et *Plutarchus* (*Sylla*, 468.) inter bibliopolas eos nominat Andronicum Rhodium, qui vulgasse ea exemplaria, quae Romae et Alexandriae circumferebantur, dicitur (Cf. *Porphyr. vit. Plotin.* c. 24.).

Quae cum ita se habeant, dolendum sane est, hominum incuria magis quam iniuria temporum eos libros haud integros ad posteritatem venisse: nec facile ex ipsis, quae supersunt, exemplis manuscriptis posse textum restituui.

Exstant autem codices manuscripti in bibliothecis Medicea, Veneta, Parisina, Oxonienſi et Leidensi. Eorum integer videtur Venetus, quem Bessarion scribi iusserat (*Villoison anecd. graec.* 2, 251.); manci autem maxime Parisini.

Editiones paucae sunt. Princeps, quam coram habeo, Aldina est, sine anno et loco impressa. Titulus: Τῶν ἐν τῇδε τῇ βιβλίῳ περιεχομένων ἐνόματα καὶ τὰξις Θεοφράστου etc. Sequuntur enim in eodem volumine *Aristotelis* et *Alexandri* Aphrodisiensis problemata et *Theophrasti* metaphysica. Aldus Manutius opus totum Alberto Pio Principi dicavit. Praeter novem libros de historia planta:

rum adest etiam fragmentum decimi de *viribus radicum*.

Secunda editio Ioannis est *Oporini*, quae Basil. 1541. fol. lucem vidit. Textum Aldinae cum interpretatione latina habet, nec plaufibus nostris digna videtur.

Tertiam Dan. *Heinfius* curavit Lugd. Bat. 1613. fol. Textum mendosissimum, licet codice duntaxat uno aut altero adhibito, emendare, Casauboni praeprimis auxilio, studuit: Gazae versionem adiunctam correxit, ac pleraque praestitit, quae ab homine erudito, sed ἀβοτανολογήτω expectari poterant.

Sequutus tandem est Io. *Bodaeus a Stapel*, rei herbariae peritus et doctissimus vir, qui in sola historia plantarum subsistens, eam 1644. fol. ita edidit, ut amplissimos adderet commentarios, textum et versionem variis locis emendaret. Sed interpretatio antiqua Theodori Gazae satis negligens et mendosa est, ut e. g. 3, 18. τῆς ῥοῦ (Rhois *Coriariae*) *fluidarum* reddat. Omissa sunt fere omnia (e. g. 4, 7.) quae interpres non intelligeret.

#### HISTORIA PLANTARUM THEOPHRASTI.

Difficillimum opus molior aleaeque plenum periculosae. Explicationem enim et determinationem periclitor plantarum omnium, quas rei herbariae parens nominat, ut, qualis fuerit cognitionum eius



temporis ambitus, pateat. Desudarunt in eo opere a pristinis inde temporibus doctissimi viri, quorum labores vicit fere *Bodaeus a Stapel*, cuius commentarii dictu difficile est, quantum auxilii mihi tulerint, quantum foeneraverint lucis. Neque tamen et id opus omne ita absolvit, ut nihil supersit negotii. Namque innumera loca obiter solummodo legit, textui mire corrupto nimis confusus est, plantarum ipsarum haud sufficientem cognovit copiam: haud raro etiam a *Plinio*, pessimo Theophrasti interprete, seductus male plantas definivit.

Ipse Theophrastus in describendis, quas memorat, plantis longe profecto alienus est a nostrorum temporum ratione. Neque enim certum quemdam ordinem servat, solum fere usum sequens aut patriam ac locum, quem occupant. Aquatiles enim seorsim, et parasitas, et olera et arbores sylvestres et frumenta tractat; saepius repetitis verbis, saepius regrediens ad id, de quo iam sermo fuerat.

Dein naturam ipsam parum cognovit, nunquam peregrinatus fuisse videtur. De ipsis graecis plantis vel vulgaribus aliorum fide narrat, ut ὡς φασι; οὕτως λέγουσι οἱ περὶ Ἀγριαδίων, οἱ περὶ Ὀλυμπον, toties occurrat. Ubi nihil certi scit, quod saepius fit, ingenue addit, περὶ τούτου δὲ σκεπτέον. Hinc errores haud pauci occurrunt: e. g. ubi de ἀράκῳ (*Lathyro tuberoso*) et ἀραχίδ-

η (*Lathyro amphotarpo*) (*hist.* 1, 11.) perhibet, nulla utrique esse folia.

Nomina ipsa ambigua sunt, nec certis legibus definita. Ipse enim (*hist.* 4, 11.) fatetur, προσ-εγορεύεσθαι ἄλλοις ὀνόμασι plantam. Ipse ἀφά-σιν modo *Leontodon Taraxacum* (*hist.* 7, 8.) modo *Lathyrum Aphacum*, ἀπαρήνν modo *Gajum Aparinen*, modo *Arctium Lappam* vocat. Τρεβέλου nomine tria diversa genera occurrunt. Ἀνδράχνη significat modo *Arbuti* speciem, modo *Portulacam*. Σπέρπιος modo *Spartium villosum*, modo *Arnicam scorpioidem* aut *Ranunculum Thoram*.

Huc accedit, quod nullam fere prodat generis aut speciei informationem, nisi unico fere loco (*hist.* 8, 4.) ubi hordei et tritici differentiam collocat in feminum seriebus circa spicam, quae in illo omnino, in hoc autem nequaquam observentur. Ceteroquin transmutationem specierum ipsorumque generum adeo certam habuit, ut multus sit in *Ocimi* et *Serpylli* (*causs.* 5, 8.), *Zee* et *Tritici* (*hist.* 2, 5.), *Menthae sylvestris* et *sativae* (*hist.* 2, 5. *causs.* 5, 8.) transmutatione explicanda.

His praemissis ingenue fateor, plantas quasdam a Theophrasto nonnisi obiter memoratas a me haudquaquam exponi posse, e. g. Ἰκμη, in lacu Orchomenio (*hist.* 4, 11.), Θησεῖον (*hist.* 7, 11.), quod *Timachidas* (*Athen.* 15, 10) cum

fnali floribus comparat et Ariadnes coronam inde textam fuisse refert.

Linnaeani autem systematis ordinem sequi licet.

*Hippuris vulgaris* (ἵππων *hist.* 4, 11.) in lacu Orchomenio.

*Ligustrum vulgare* (κήλαστρον *hist.* 1, 15. 3, 4.). In locis montosis crescere, sempervirens esse, tarde florere et virgas pro baculis infervire refert.

*Phillyrea angustifolia* (ἀφάρεκη *hist.* 1, 15. 3, 6.).

*Phillyrea latifolia* (λακκίθη *hist.* 3, 4. 6.). Cf. *Sibthorp. fl. graec. t. 2.*

*Fraxinus Ornus* et *rotundifolia* forte (*hist.* 3, 11.) describuntur *μηλιάς* nomine, cuius duas dari species ait traditque, quomodo inter se differant. Ornus sine dubio arbor est quercui similis, quae mel stillat (*Diodor. Sicul.* 17, 75. *Curt.* 6, 4. *Athen.* 11, 500. *Polyaen. strat.* 4, 3, 32.). Cf. *Sibthorp fl. graec. t. 3.*

*Salvia cretica* (σφάκελος *hist.* 6, 2.) foliis angustioribus et

*Salvia triloba* (ἐλελίσφακος *ib.*) bene distinguuntur. Cf. *Sibthorp fl. graec. t. 17.*

*Salvia Horminum* (ὄρμινον *hist.* 8, 7.) una cum Sesamo ferebatur; semina Cuminum similia a nullo gustari animali.

*Piper nigrum* (πίπερι *hist.* 9, 19.) citius fruc-

tus foli, et albidī, cortice externo cincti, et nigri, cortice deftituti, distinguuntur. Fabulosus *Philostrophatus* (vit. *Apoll.* 3, 4.) plura narrat de Piperis cum Vitice similitudine et de simiarum cultura, quod credulum vulgus delectare potest.

*Crocum* et odoratum et albidum et spinulosum distinguit, inter primos veris flores numerat: alio loco *Crocum autumnalem* (*hist.* 6, 7.).

*Gladiolus communis*, sine dubio ξίφιον illud est, quod (*hist.* 6, 7.) memoratur. Cf. *Sibthorp. fl. graec. t.* 37. Sitne etiam Φάσγανον (*hist.* 7, 11.) cuius tubera comedantur, ambigo. De eo enim usu nostratibus nil innotescit.

*Iris Sisyrrinchium* (σισυρίγγιον, *hist.* 1, 16. 7, 13.) per Graeciam frequens, id singulare habet, quod bulbus alter alteri superpositus sit. Cf. *Sibthorp. fl. graec. t.* 42. Is licet Ixiam Bulbocodium arbitretur σισυρίγγιον esse, bulborum indoles tamen multo magis huc trahenda est (Cf. *eandem fl. graec. t.* 36.).

*Iris florentina* (ίρις). Sed alia occurrit (*hist.* 7, 12.) flore minimo, quae forte *I. graminea* s. *iuncea*.

*Irisne tuberosa* fit άκόνιτον (*hist.* 9, 16.) άγρωστίδι simile et πωδες radice tuberosa, ambigitur (Cf. *Schulze toxicol. vet. p.* 17. *Sibthorp. fl. graec. t.* 41.).

*Schoenus nigricans* (μελαγκρανίς, *hist.* 4, 13.)

ob atrum feminum colorem, differt ab aliis crassitie et altitudine culmorum.

*Schoenus mucronatus* (σχοῖνος ὀξύς *ib.*). Cf. *Sibthorp. t.* 43.

*Cladium germanicum* Schrad. *Schoenus Mariscus* L. (ὀλόσχοιμος *ib.*) cuius spicas fasciculatas, ovo similes, satis bene describit, ad πλέγματα maxime idoneas.

*Cyperus comosus* Sibth. (κύμειρος ὁ ἕτερος *hist.* 4, 11. et σχοῖνος *hist.* 9, 19.) ob odoratas radices insignis (Cf. *Sibthorp. fl. graec. t.* 44.)

*Cyperus fastigiatus* (σάρι *hist.* 4, 9.) culmo trigono comaque Cyperum Papyrus aequare, stolones autem e radice digiti crassitie propellere dicitur.

*Cyperus Papyrus* (πάπυρος *ib.*) optime describitur.

*Cyperus esculentus* (μνάσιον *ib.*). Idem (c. 10.) sub nomine aegyptio μαλισταθήλλη occurrit. Id nomen bene derivatur a μάλα et ἀναθάλλω *Harduin. ad. Plin.* 21, 15. Tubera describuntur, qualia mespili fructus, folia gladioli similia; illa et cruda manducari et cum hordeo cocta bellariorum vicem gerere. Cf. *Column. phytobas. p.* 5. Trahine huc potest κάλαμος, cuius fructus ὀρέβοις λευκοῖς similes assantur? (*Diodor. Sicul.* 2, 57.). Certo autem hi sunt κάλαμοι, quorum radicibus vesci Rhizophagos tradit *Diodorus* (3, 23.).

*Panicum italicum* (κέγχρος *hist.* 8, 3.) φόνην χνοώδη comam hirsutam l. spicam gerere dicitur.

*Panicum miliaceum* (μίλινον *hist.* 8, 3.).

*Sorghum* forte *vulgare* est illud triticum giganteum, quod ultra Bactrianam provenire ac granatolivaceorum mole ferre dicitur (*hist.* 8, 4.). Idem forte est frumentum, cuius *Herodotus* (1, 193.) neminit, quod folia quatuor digitorum latitudinem habeant. Cf. *Bellon. obs.* 2, 100. Idem vidit in India *Philostratus* (*vit. Apollon.* 3, 5.).

*Andropogon Ischaemum* (ἰσχαίμων *hist.* 9, 15.) in Thracia crescens.

*Arundo Donax* (κάλαμος αὐλητικός *hist.* 4, 12.) ubi et δόναξ et ζευγίτις, ob copulationem tibiarum ex eo confectarum nominatur. Insigni copia crescere ad Cephisum. Optime et uberrime de his calamis commentatur *Harduin. ad Plin.* 16, 36.

*Arundo Ampelodesmon* *Cyrill. neapol. fasc.* 2, c. 12. est φλειώ illa, quae et πλόκαμος dicitur (*hist.* 4, 11.) cuius foliis etiamnum Itali utuntur ad vinciendas vites et ad cribra, cuius radix lixivium praebet. Aliam φλοῦν indicam habet *Herodotus* (3, 98.).

*Arundo Phragmites* (χαράκας *hist.* 4, 12.).

*Arundo epigeios* (κάλαμος ἐπίγειος *ib.*).

*Stipa tenacissima* vel *Lygeum Spartum* est λινέσπαρτον (*hist.* 1, 8.) quo ad conficiendas sportu-

has et floreas utuntur; alienum plane a σπάρτῳ *Aristotelis* (*hist. anim.* 9, 40.) cuius floribus apes laetentur, quod sine dubio est *Spartium scoparium*. Claſſicus autem locus de Stipa nostra extat in *Strabone* (3, 243.) ubi de σχοινοπλοικῇ σπάρτῳ sermo est, quae inter Saguntum et Setabin Hispaniarum uberrimè crescat.

*Avena sterilis* (αἰγίλωψ, *hist.* 8, 7. 9.) ob culmorum copiam et molem terram extenuare dicitur.

*Avena fatua* (βερόμος, *hist.* 8, 9.).

*Lolium temulentum* (αἶθα, *hist.* 2, 5. 8, 7. 9.). In id *Triticum sativum* mutari.

*Saccharum cylindricum* (ἀλωπέκουρος, *hist.* 7, 10.). Cf. *Dalechamp hist.* 1, 430.

*Hordeum nudum* (κριθὴ, μάλιστα τῶν γυμνοσπερμάτων, *hist.* 8, 4.). Aliae species ibidem, nimirum *H. hexastichon*, vulgare et *Zeocritikon* (τῶν μὲν κριθῶν αἱ μὲν εἰς δίστιχα) memorantur.

*Secale villosum* forte est στελεφούρος (*hist.* 7, 10.) qui spicam gerat tritico similem sed hirsutam.

*Secale cereale* (τίφη *hist.* 8, 1. 2. 4.) tritico simile, sed fermen folliculis inclusum gerit. *Secale cereale* a Theophrasto primum memoratum, in Armenia sponte nasci dicitur a *Clavijo* (*Historia del gran Tamorlan*, p. 103. Madr. 1782. 4.).

*Triticum hybernum et aestivum* (πυρὸς χειμο-

σπορούμενος καὶ τρέμνους *causs.* 4, 12.) probe distinguuntur. Illud esse multi- hoc pauciculme.

*Triticum Zea* (ζεία, *hist.* 8, 9.).

*Triticum Spelta* (ἑλυστα, *hist.* 8, 4.). De eadem sub nomine πυροῦ θραυίου πελυλλέπου (*causs.* 4, 12.) loquitur.

*Triticum repens* (ἀγρώστις, *hist.* 1, 10. 2, 2. 4, 11. Radice gaudere γονατώδη, quae culmos denovo edat, qui si abscissi fuerint, esse herbam vulgarem inter culta. Nutrimentum, quod stolones cum radiculis praebent, antiquitus cognitum fuit. Hinc Aegyptios ἀνέχθονες hac ἀγρώστιδι nutritos, ac deinde, manibus eam gestantes, Deos semper precatos fuisse, Diodorus narrat (1, 43.). Neque tamen negandum, posse et, historici viri negligentia, Papyrus intelligi.

*Ficus Sycomorus* (συκάμινος, *hist.* 4, 2.). Fructus e trunco ipso. Cf. Norden *voy. en Egypte*, 1. t. 38.

*Cornus mascula* (κράνεια, *hist.* 3, 4. 12.). fructus edules ferre et πρῶτον βλαστάνειον esse.

*Cornus sanguinea* (θελυκράνεια, *hist.* 3, 6. 12.) paullo serius florere, fructus ferre non edules, ligno gaudere flexili et laxo.

*Rubia tinctorum* (ἰσχυροδάνας, *hist.* 7, 9.). At alio loco (*hist.* 9, 14.) alia planta eodem nomine occurrit, foliis hederaceis, sed rotundioribus, de qua certi aliquid definire nequeo.



*Galium Aparine* (ἀπαρίνη, *hist.* 8, 8.).

*Plantago maior* (ἀρνόγλωσσον, *hist.* 7, 9. 10.).

*Plantago Cynops* (κύνωψ, *hist.* 7, 8.).

*Plantago Coronopus* (κορωνόπους, *hist.* 7, 9.).

*Potamogeton serratus* (τρέβολος ἐν τοῖς ἐλώδεσι τῶν ποταμῶν, *hist.* 4, 11.).

*Heliotropium europaeum* (ἡλιοτρόπιον, *hist.* 7, 8.).

*Anchusa tinctoria* (ἄγχουσα, *hist.* 7, 9.).

*Convolvulus sepium* (λασιώνη, *hist.* 1, 21. *causs.* 2, 25.) μονόφυλλον ἄνθος, διαγχαφὴν ἔχον τῶν πλειόνων: humi serpere et arbores scandere vicinas.

*Menyanthes trifoliata* (μήνανθος, *hist.* 4, 11.).  
Haec est τριφύλλος ea, quae paludes *Paxamo* indigebat (*Geopon.* 2, 4.).

*Lycium barbarum* aut *europaeum* forte οἶσος (*hist.* 3, 17.).

*Cordia Myxa* (πέρσιον, *hist.* 2, 3. 4, 2.).

*Cordia Sebestena* (κοκκυμηλέα αἰγύπτια, *hist.* 4, 3.).

*Verbascum nigrum* (φλόμος μέλαινα, *hist.* 9, 13.).

*Atropa Mandragora* (μανδραγόρας, *hist.* 6, 2.).

*Solanum Melongena* (στενυχνός, quem crudum comedunt, *hist.* 7, 7.).

*Solanum insanum* (στενυχνός μανικός, *hist.* 9, 12.).

*Physalis somnifera* (στενυχνός ὑπνώδης, *ib.*).

*Viola odorata* (ἰωνία μέλαινα, *hist.* 6, 6.).

*Cuscuta europaea* (ἐρεβάγχη, *hist.* 6, 8.).

Ab ea plantas circumvinciri et angi, unde nomen. Fuit sine dubio haec ἐρεβάγχη, quam et ἐσπερολόσωντα vocat Sotion Tiberii tempore (*Geopon.* 2, 42.) et quam describit *Puxamus* (*ib.* 2, 43.).

*Cerastonia Siliqua* (κερατωνία, *hist.* 1, 18.). Vocatur etiam σῦκος αἰγύπτιος (*hist.* 1, 23. 4, 2.) cuius fructum manifesto ἑλλοβον, leguminosum habet et folia sempervirentia.

*Rhamnus Alaternus* (Φυλίκη, *hist.* 1, 15.).

*Rhamnus lycioides* est forte ῥάμνος ὁ μέλας (*hist.* 3, 17.).

*Zizyphus vulgaris* (ῥάμνος λευκός, *ib.*).

*Zizyphus Paliurus* (παλίουρος, *ib.* 4, 3.). Cf. *Anguillara* p. 54.

*Zizyphus Lotus* (λωτός Λιβυκός, *hist.* 4, 3.). Sed *Celtim australem* simul describit, ut *Anguillara* (p. 74 f.) recte observat.

*Evonymus europaeus* (εὐώνυμος, *hist.* 3, 18.).

*Hedera Helix* (κιστός, *ib.*).

*Beta vulgaris* (τσῦτλον, *hist.* 7, 2.).

*Asclepias procera* intelligitur (*hist.* 4, 9.) ubi aegyptia planta describitur, parallelis foliis glandens, qua medici πρὸς τὰ γυναικεία utantur. Cf. *Prosp. Alpin. de plant. Aeg.* c. 25. *Norden voy. en Egypte*, 1, t. 59.

*Eryngium planum* (ἡρίγγιον, *hist.* 6, 1.).

*Bupleurum* forte *rotundifolium* est βούρη-  
στis, olerum species (hist. 7, 8.).

*Coriandrum sativum* (κορίαννον, hist. 7, 3.).

*Ferula tingitana* (σίλφιον, hist. 6, 3.) est li-  
byca illa planta, quae ὀπὸν κυρηναϊκὸν largiebatur.  
Folium μάσπετον dictum, cum Apio Petrofélino  
comparatur, semen ob alas membranaceas Φύλλον  
dicitur. Eam speciem, alienam a perfica Asa foe-  
tida, primus descripsit Hermannus (parad. bot.  
p. 165.) simul etiam Rivinus (pentap. reg.). Loxi-  
ge aliena est a perfica, quam Kämpferus (amoen.  
536.) delineavit, quaeque eadem fere cum ea esse  
videtur, quam Prosp. Alpinus (exot. 210. f.) e  
seminibus thracis eduxerat. Perficam speciem f.  
*Asam foetidam*, in Caucaso nasci et a pecudibus ad-  
amari Aristobulus refert apud Arrianum (exp.  
Alex. 3, 28.). In Media provenire Strabo (11,  
p. 797.) vid. supra ad Hippocr. De silphio cf. Lau-  
rence new system of agriculture, p. 384—400.  
Nostra enim folia magis laciniata habet, quibus ad  
Petrofelini similitudinem accedit. Nitida etiam sunt  
et e petiolis latissime vaginantibus surgunt. Perfica  
autem species, quae nostram Asam foetidam largi-  
tur, habet foliola integriuscula obtusiuscula alter-  
natim finuata.

*Ferula communis* et *meoides* sub nomine νά-  
ρκος καὶ ναρθηκύας (hist. 6, 2.) egregie descri-  
buntur. Utraque biennis, foliorum decomposito-

rum capillaceorum vaginis latissimis, floribus luteis et seminibus Anetho similibus insignitur. Illa autem maior, folia habet longissima, haec minor foliola appendiculata setacea. Cf. *Dodon. pempt. 2. p. 321.* In insulis Archipelagi crescit etiam *Ferula glauca*, *νάρθηξ* nostratibus Graecis dicta (*Tournefort. it. 1, 93.*).

*Laserpitium ferulaceum* (*μαργάρις*, *hist. 6, 3.*) cum *Ferulis* componitur, sed tenerius est *Ferula tingitana*, succo destitutum: semina tamen pariter alata. Describitur egregie a *Tournefortio* (*it. 2. p. 121.*). Cf. *Didym. in Geopon. 2, 35.*

*Laserpitium latifolium* (*πάναξ χειρώνιον*, *hist. 9, 12.*). Folia similia *λαπάθου* dicuntur, pro quo Nicandri scholiastes legit *ἀμαράκου*: melius illud; namque plantae nostrae folia multo magis eum *Rumice* quam cum *Origano Maioranoide* comparantur. Bene eam speciem delineavit *Dodonaeus* (*pempt. 2. p. 309.*).

*Laserpitium hirsutum* (*πάναξ Ἀσκληπικόν*, *hist. 9, 12.*) cuius folium *Thapsiae* simile et caulis articulatus praedicatur. *Haller stirp. helv. t. 19. Column. ecphr. 1, 86.*

*Laserpitium formosum Willd.* puto *ὄρεοσεῖλλον* esse (*hist. 7, 6.*) quum cum *Anetho* comparatur.

*Peucedanum officinale* (*πενκεδανον*, *hist. 9, 18.*).

*Tordylium officinale* (*σέσελι*, *ib.*)...

*Athamanta cretensis* (*δαῦκος*, *ib.*). Sed ma-

nifetto corruptus locus, namque *δαφνοειδής* de mulo *δαίκω* dici potest.

*Cachrys panacifolia* (*λβανωτὶς καρπιμὲς*, *histe.* 9, 12.) ita distinguitur, ut ad similitudinem foliorum cum Apio graveolenti respiciatur. Pictam habet *Morisonius* (vol. 3. f. 9. t. 1. f. 4.). In monte generoso Comensi se invenisse hanc *λβανωτίδα* autumat *Anguillara* (p. 91.) vocari ab incolis Livistico salvatico.

*Oenanthe pimpinellifolia* (*ολνάνθη*, *histe.* 6, 7.).

*Thapsia Asclepium* (*θαψία*, *histe.* 9, 10.). Primus delineavit *Matthiolus* 545.

*Pastinaca Opopanax* (*πάναξ Ἡράκλειον*, *histe.* 9, 12.). Follum magnum latum *τρισπιδαμαλον* et radices tuberosas describit, quas *Gouanus illuser.* p. 20. etiam habet.

*Smyrniū Olus atrum* (*ιπποσελίνον*, *histe.* 7, 6.) radice atra magna, foliis Apii graveolentis similibus sed latioribus.

*Anethum graveolens* (*ἄνηθον*, *histe.* 7, 6.).

*Apium Petroselinum* (*σέλινον*.).

*Apium graveolens* (*σέλινον ἔλειον*, *histe.* 7, 6.).

*Rhus Coriaria* (*ῥούς*, *histe.* 3, 18.). Egrege describuntur folia pinnata villosa, inflorescentia, fructus et usus ad rem coriariam.

*Drypis spinosa* (*δρυπίς*, *histe.* 1, 16.). Sed *Anguillara* p. 147. *Echinophoram spinosam*, alii *Salsolam Tragum* volunt.

*Sambucus nigra* (ἀμπή, *hist.* 3, 13. Egregia descriptio.

*Leucoium vernum* (λευκοίον, *hist.* 6, 7.) ob radicem bulbosam praecocemque florem nil aliud esse potest.

*Narcissus calathinus* forte τὸ κρίνον διανθές, quod alterum florem alteri insertum gerit (*hist.* 1, 21.).

*Narcissus orientalis* (νάρκισσος ἡ λείριον, *hist.* 6, 6.).

*Pancratium maritimum* (ἡμεροκάλης, *hist.* 6, 1.).

*Crinum asiaticum* videtur illud bulborum genus fuisse, quod, in India crescens, capillos sub exterioribus squamis gerat (*hist.* 7, 13.). Eo enim modo *radix toxicaria* a Rumphio (*herb. amboin.* 6. p. 155.) describitur.

*Bulbocodium vernum* (βέλβου κώδιον, *hist.* 6, 7.).

*Allium Porrum* (πράσον, *hist.* 7, 4.).

*Allium sativum* (σκόροdon, *ib.*).

*Allium Scorodoprasum* (*ib.*).

*Allium ascalonicum* (σκόροdon ασκαλώνιον, *ib.*).

Alio autem loco (*hist.* 1, 16.) nomine γητύου ἀνεφάλου occurrit. Cf. *Athen.* 9, 3.

*Allium nigrum* (μῶλυ, *hist.* 9, 15.).

*Allium Schoenoprasum* (σκόροdon σχισπὸν, *hist.* 7, 4.).

*Lilium candidum* (κρίνον, *hist.* 6, 6.).

*Lilium chalcedonicum* forte τὸ Φλόγιον, *hist.* 6, 7.

*Erythronium Dens Canis* (λίσσιον τὸ πορφυρεῖον, *ib.*).

*Scilla hyacinthoides* est bulbus ille sub squamis lana farctus, ad litora crescens (*hist.* 7, 13.). *Plinius* (19, 2.) nescire se fatetur, quid sit. Invenisse tamen in exemplaribus *eriophoron* id appellari. *Dodonaeus* (692.) *Lanariam plumosam* et *Scillam hyacinthoidem* delineat.

*Asphodelus ramosus* (*hist.* 7, 12.).

*Anthericum graecum* (ἀνθήριον, *hist.* 1, 7, 12.).

*Asparagus aphyllus* (ἀσπράγγος, *hist.* 1, 16, 6, 1. 3.). Cf. *Tournefort. it.* 1, 88. Sparogam a Slavoniae incolis vocari *Anguillara* p. 113.

*Loranthus europaeus* (στέλις, *causs.* 2, 23.).

*Acorus Calamus* var. indica (κάλαμος εὖσμος, *hist.* 9, 7.). Cf. *I. Bauhin. hist.* 2, 729. 730.

*Veratrum album* (ἐλάβερος λευκός, *hist.* 9, 11.).

*Musa paradisiaca* (*hist.* 4, 5.) ubi arborem esse in India refert, foliis duos cubitos longis, fructu thiocamelorum pennis similia.

*Oryza sativa* (ὄρυζα, *ib.*) cum *Zea* componit, granum cartilagineum esse. De cultura *Oryzae*

apud Indos prima relatio *Aristobuli* apud *Strabonem* (15, 1014.).

*Rumex Patientia* (λάπαθρον, *hist.* 7, 2.).

*Colchicum autumnale* (ἐφήμερον, *hist.* 9, 16.).

Sed videtur etiam ἀσπάλαξ (*hist.* 1, 11.) esse, quod talpae bulbum effodere consuecunt.

*Amyris Kasaf* Forsk. (λιβανωτοῦ δένδρον, *hist.* 9, 3.). De eo etiam *Herodot.* 3, 107.

*Amyris gileadensis* (βαλσάμου δένδρον, *hist.* 9, 6.). Describit et *Pausanias* (9, 28.) myrti magnitudine, foliis *Origani Maioranoidis*. *Cytiso* et *Terebintho* similem facit *Strabo* (16, p. 1107.).

*Epilobium alpestre* (οἰνοθήρα, *hist.* 9, 20.).

*Acer Pseudoplatanus* (σφένδαμνος, *hist.* 3, 6, 10.). Cf. *Bellon. obs.* 1, 17.

*Acer creticum* (γλῆνον, *hist.* 3, 11.).

*Diospyros Lotus* (διωσπερὲς, *hist.* 3, 13.) cum *Ceraso* comparatur.

*Diospyros Ebenaster* f. *Melanoxylon* (ιβένος, *hist.* 4, 5.). Sed simul graecam tractat, de qua vide sub *Anthyllide*.

*Daphne sericea* f. *oleaeifolia* (*hist.* 1, 16, 4, 11.) ad lacum *Orchomenium* crescere dicitur.

*Daphne Cneorum* (κνώρον, *hist.* 1, 16, 6, 2.).

*Erica scoparia* f. *arborea* (ἐρείκη, *hist.* 1, 23.).

*Polygonum* forte *maritimum* aut *divaricatum* est περδίκιον illud radice ampla, quod a perdicibus id quaerentibus nomen habeat (*hist.* 1, 11.). Ἐλ-



ζίν saltem cognominem adferunt *Dioscorides* (4, 86.) et *Galenus* (*fac. simpl.* 6, p. 173.).

*Butomus umbellatus* (βούτμος, *hist.* 1, 111) 4, 11.) maxime in lacu Orchomenio. Cf. *Pseudo-Democrit. in Geopon.* 2, 6.

*Laurus Cinnamomum* et *Cassia* (*hist.* 9, 5.) describuntur quidem peregrinatorum fide, sed ple-  
raque falsa. Frutices enim credit, in convallibus  
crescere refert etc.

*Cassyta filiformis* sine dubio τὸ συριακὸν βοτά-  
νιον est, quod Καδύτας appellatur, arboribus, ve-  
pribus ac aliis plantis innascens (*causs.* 2, 23.).  
Miram eam vocat et paradoxam, qualem *Forsko-  
ieus* (*flor. aegypt. arab.* p. 84.) Volutellae aphyll-  
ae nomine, in Arabia inventam describit.

*Cercis Siliquastrum* (κερκίς, *hist.* 1, 18.) in-  
ter leguminosas numeratur.

*Hyperanthera Moringa* (βαλάνου δένδρον, *hist.*  
4, 2.) describitur trunco παρικοτταμμένω, foliis  
myrti sed longioribus.

*Rhododendron ponticum* ea arbor esse videtur,  
quae, rosas floribus gestiens, mare ponticum (τὴν  
ἐξω θάλατταν) accolit (*hist.* 1, 21.).

*Arbutus Unedo* (κόμαρος, *hist.* 1, 15: 3, 16.)  
cuius fructus μεμαϊκίλον dicitur, folium laurino et  
ilicino simile sempervirens, flores myrtinis similes  
racemosi terminales.

*Arbutus Andrachne* (ἀνδράχνη, *hist.* 1, 15: 3,

16.). Ob paniculae pedunculos hispidos fructum ἰνπακποῦσθαι refert. Sine dubio lacuna in textu est. Forte de κοκκυγία (loco κοκκυμηλίας) sermo erat, cuius (*Rhois Cotini*) fructus ἰνπακποῦται.

*Tribulus terrestris* et *Fagonia cretica* (*hists.* 6, 1. 5.), nomine τριβέλου describuntur. Ille foliis cicerinis gaudet, haec etiam Φυλλάμανθος, sero proveniens et in filiqua semen gerit.

*Sedum Anacamperos* (ἐπίπετρον, *hists.* 7, 8.), sed ἄνανθος, vitio forte librarii, dicitur.

*Agrostemma flos Iovis* (Διὸς ἄνθος, *hists.* 6, 6.).

*Agrostemma coronaria* (Φλόξ, *ib.*).

*Lychnis chalcædonica* forte πόθος, *hists.* 6, 7.

*Euphorbia Paralias* (ὁ μυρτίτης καλούμενος τιθύμαλλος λευκός, *hists.* 9, 12. et μήκων sempervirens, *hists.* 1, 15.), foliis gaudere dicitur angustis setaceis, montosa amare et fructum κάρυα appellari.

*Euphorbia Peplis* (ὁ παράλιος κόκκος, *hists.* 9, 12.), foliis subrotundis.

*Euphorbia orientalis* (ὁ ἄρῆν τιθύμαλλος, *hists.* 9, 12.), foliis oleae similibus.

*Euphorbia antiquorum*, *hists.* 4, 5. bene describitur. Idem est καυλὸς fortibus spinis, succo copioso ficulnei simili, quem in India Aristobulus invenit (*Arrian. exped. Alex.* 6, 22.).

*Rhizophora Mangle* (*hists.* 1, 12. 4, 5.) fide peregrinatorum describitur. De ea narrat et *Onesicritus* apud *Strabonem* (15, 1016.).

*Sempervivum tectorum* (ἀειζων, *hist.* 1, 16, 7, 14.).

*Punica Granatum* (ῥοιὰ). Fructus immaturus κῆτινος (*causs.* 1, 16. *Galen. comp. medic. sec. loca*, 7, 256.).

*Cactus Opuntia* (*hist.* 1, 12.). Opus Locridis patria: ficus indica quoque appellatur.

*Prunus domestica* (κοκκυμηλία, *hist.* 1, 18.).

*Prunus infiticia* (σποδιας, *hist.* 3, 7.), quae sit velut prunus sylvestris.

*Prunus Cerasus* (κέρασος, *hist.* 3, 13.). Videtur tamen haud adeo vulgaris in Graecia fuisse, licet egregie Theophrastus describat: desquamationem corticis, florem et fructum.

*Prunus Padus* (πάδος, *hist.* 4, 1.). *Amygdalus communis* (*hist.* 7, 12.).

*Pyrus Cydonia*, cuius duplex varietas, στρουθίον, Cydonia oblonga et κυδωνίον, Cydonia maliformis (*hist.* 2, 3.) recensentur. Cf. *Athen.* 3, 81.

*Pyrus cretica* (ἔψος ὀψιβλαστότατον, *hist.* 3, 6. manifesto autem κολυτία τῆς Ἰδης *hist.* 3, 17.). Frutex est, folio laurino, subtus cano-tomentoso nervoso: nec florem nec fructum ferre dicitur. Descripsit tamen et florem et fructum *Alpinus exot.* c. 2.

*Pyrus Amelanchier* (συκὴ Ἰδαία, *hist.* 3, 17.).

*Pyrus torminalis* (μέσπιλος ἀνθηδών, *hist.* 3, 12.) ob incisum folium et spinarum defectum.

*Pyrus Aria* (ἀρία, *hist.* 3, 6.). Bene describit *Anguillara* p. 81.

*Mespilus Cotoneaster* (μέσπιλος, σπητάνειος, *hist.* 3, 12.).

*Mespilus Pyracantha* (ῥοζοδάκωνθα, *hist.* 3, 4. 6.).

*Crataegus Azarolus* (κράταργος, *hist.* 3, 15.).

Male *Athenaeus* (2, 11.) pro Ceraso habet, quod animadvertunt *Bodaeus* p. 131. et *Lefebure de Villebrune ad Athen.* p. 187.

*Sorbus domestica* (ὄκη, *hist.* 3, 12.).

*Spiraea sulcifolia* (σπειραία, *hist.* 1, 23. Cf. *Clus. hist.* 1. p. 84.).

*Rosa centifolia* (*hist.* 6, 6.) ad Philippos sponte crescere dicitur: sponte crescere in Macedonia iam *Herodotus* testatur (8, 138.). Et nostris temporibus inventa est ad Kubam in Schirwan Persiae borealis (*Marschall von Bieberstein Beschreib. der Länder am Kaukasus*, p. 78.): odoratissima Cyrenaica vocatur, quae forte *R. moschata*: sed sempervirens etiam memoratur (*hist.* 1, 15.), qualis in climate australi esse omnino potest. Totus frutex ῥωδωνία vocatur, sicut ἰωνία, κρινωνία.

*Rubus fruticosus* (βάλτος, *hist.* 1, 15.) semper-virens.

*Rubus oedus* (*hist.* 3, 18.) repens.

*Rubus idaeus* (*ib.*) erectus.

*Tormentilla erecta* (πεντάφυλλον, *hist.* 9, 14.).

*Papaver Rhoeas* (ῥοιὰς, *hist.* 9, 13.).

*Glaucium phoeniceum* (μήκων κερκίτης, *ib.*).

*Chelidonium maius* (χαλιδόνιον, *hist.* 7, 14.).

*Corechorus oltorius* (κόρχορες, *hist.* 7, 7.).

Cf. *Plin.* 21, 53. *Anguillara* p. 92. eandem credit cum *αναγάλλι* Dioscoridis, de quo vehementer dubito.

*Cisti* duae species, inter quas *C. creticus* flore purpureo (*hist.* 6, 2.) obiter memorantur: mala lectio *κισσού* pro *κίστου*.

*Tilia europaea* (Φίλυρα, *hist.* 3, 10. 5, 4.) manifesto est, quae folio, cortice, materie, flore fructuque insigniter cum nostra congruit.

*Tilia alba* forte ea est, quae folia ampliora et *εκλευκότερα* (candicantia) habere (*causs.* 2, 26.) dicitur. Non Americam enim solummodo, sed Hungariam etiam incolere, *Kitaibelus* nuper (*pl. hungar.* t. 3.) docuit. Graecia itaque incolam eam credere nil vetat.

*Nymphaea alba* (σίδη, *hist.* 4, 11.) in lacu Orchomenio.

*Nymphaea lutea* (νυμφαία, *hist.* 9, 13.).

*Nymphaea Lotus* (λωτός, *hist.* 4, 10.).

*Nelumbium speciosum* (νύαμος, *hist.* 4, 10.).

Et huius et Loti descriptionem vide apud *Herodot.* 2, 92.

*Anemone nemorosa* (άνεμώνη λεμωνία, *hist.* 6, 7. 7, 8.

*Anemone coronaria* forte alia ἀνεμώνη, quibus ad ferta conficienda utebantur.

*Ranunculus* forte *Ficaria* est ἀφία (hist. 7, 8.), quae simul cum foliis florem promit.

*Helleborus orientalis* (ἡλλείβορος μέλας, hist. 9, 11.).

*Teucrium Polium* (πόλιον, hist. 1, 16.).

*Teucrium creticum* (ἑλένιον, hist. 6, 6.). Mis-  
sam sibi e Cephalaria testatur *Anguillara* p. 172.

*Teucrium Chamaedrys* (χαμαίδρυς, hist. 9, 10.).

*Satureia capitata* (θυμός, hist. 6, 2.). Hunc  
thymum laudat praeprimis *Galenus* (antid. 1, 427.)  
ut optimam mellis materiam.

*Satureia Thymbra* (θύμβρα, ib.). Cf. *Bel-*  
*lon. obs.* 1, 2.

*Melissa cretica* (καλαμίνθη, causs. 2, 22.).

*Mentha sylvestris* (σισύμβριον, hist. 2, 5.  
causs. 2, 22.).

*Mentha sativa* (μένθος, ib.).

*Marrubium peregrinum* et *creticum* (πράσιον,  
hist. 6, 2.). Duae hae species satis bene distin-  
guuntur.

*Marrubium Pseude-Dictamnus* (ψευδοδίκταμ-  
νος, hist. 9, 16.).

*Origanum Maioranoides* (ἀμάρακος, hist. 1,  
15.).

*Origanum creticum* (ὀρίγανον λευκόν, hist. 6, 2.).

*Origanum heracleoticum* (ὀρίγανον μέλαν, ib.).

*Origanum Dictamnus* (δίκταμνος κρητικός, *hist.* 9, 16.).

*Origanum Tournefortii* (δίκταμνος τρέτος, *ib.*)  
ob folia hirsutiora, qualia *Mentha sylvestris* habet,  
diversum. Cf. *Tournefort. it.* 1, 91.

*Thymus vulgaris* (ἐρπυλλος, *hist.* 6, 7.).

*Lavandula Spica* (ἰφύον, *hist.* 6, 6.). Ex  
auctoritate *Hesychii*, qui (*ad h. v.*) λαβαντίδα,  
i. e. *Lavandulam* dicit. Cf. *Bod. ad Theophr.* p. 669.

*Ocimum Basilicum* (ὠκίμον, *hist.* 7, 3. et aliis  
locis.). Diu quidem, maxime ob radicem ligno-  
sam hæsitavi, essetne hæc planta, neque tamen  
alii assignare possum, quæ *Theophrastus* illi tri-  
buit. Cf. *Schol. Nicandr. alex.* 280., ἡδυόσµω  
ὅμοιον. *Tragus* (*stirp. hist.* 2, 25.) perperam  
*Polygonum Fagopyrum* esse vult, quod pabulum  
fuerit, priusquam filiquas proferat, metendum  
(*Varro r. r.* 1, 31.). Certiores nos tamen facit  
*Belonius* (*obs.* 2, 40.), ocimum in oriente li-  
gnescere, in triplo maiorem excrefcere altitudinem  
acolerum loco comedi. Cf. *Amoreux in act. soc.*  
*reg. agricult.*, Paris 1789. p. 62 f.

*Sesumum orientale* (σήσαµον).

*Melampyrum arvense* (μελάµπυρον, *hist.* 8, 6.).

*Antirrhinum maius* (ἀντίρρινον, *hist.* 9, 21.).

Sed corruptus locus, quum *Aparines* simile habe-  
tur. Bene tamen, fructus μόσχει ἕνας habere.

*Orobanche tinctoria* (αἰμόδαρον, *hist.* 8, 8.).

*Acanthus spinosus* (ἀκανθος, *hist.* 1, 16.).

*Alyssum sativum* (ἐλύσιμον, *hist.* 8, 3.).

*Brassica Eruca* (εὐζωμον, *hist.* 1, 9, 7, 3.).

Oleribus olim adnumerata, ut *Lactuca* comedebatur.

*Brassica Napobrassica* (γάγγυλις, *hist.* 7, 4.).

*Raphanus sativus* (ῥαφανίς, *ib.*). Et maior et minor varietas.

*Hesperis tristis* (ἑσπερίς, *causs.* 6, 28.). Cf. *Plin.* 21, 7.

*Portulaca oleracea* (ἀνδράχνη, *hist.* 7, 3.).

*Althaea officinalis* (ἀλθαία, *hist.* 9, 17.).

*Lavatera arborea* forte *μαλάχη* f. *ἀλμυρον* (*hist.* 1, 4, 4, 20.).

*Spartium Scorpius* (σκόρπιος, *hist.* 6, 1, 3.). Cf. *Anguillara*, p. 143.).

*Ononis antiquorum* (ὄνωνις, *hist.* 6, 5.).

*Anthyllis cretica* (ἐβένη, δένδρον θαμνώδες, ὡς περὶ ὁ κύτισος, *hist.* 4, 5.). *Ebenum* hanc creticam primus stabilivit *Honorius Bellus* (*ad Clus.* *hist. app.* p. 309.), dein *Prosp. Alpinus exot.* 2, 32. addita iconē p. 278.

*Phaseolus vulgaris* (δόλιχος, *hist.* 8, 3.). Iam tunc ex India forte cum Alexandri militibus adlatos fuisse phaseolos, patet e descriptione Theophrasti et e loco *Galenī* (*fac. alim.* 1. p. 317.), ubi a *Diocle* inde *Carystio*, Theophrasto tempore aequali, descriptos fuisse refert.



*Dolichos* forte *Catiang* (*hist.* 4, 5.). Fuisse legumen quoddam in India, quod Graeci *Φάκος* appellaverint, foeno graeco simile.

*Arachis hypogaea* (*κύγγον*, *hist.* 1, 1. 11.). Fructum sub terra ferre, *βλαστὸν* exilem, radicem longam et vescam, colligi Nilo redundante et aras eo coronari.

*Lathyrus sativus* (*λάθυρος*, *hist.* 8, 3.).

*Lathyrus Aphaca* (*ἀφάκη*, *hist.* 8, 5. 8.).

*Lathyrus amphicarpos* (*ἀραχίδνα*, *hist.* 1, 1. 11.). Ridiculum, Solanum tuberosum a *Clusio* huc relatum fuisse. *Lathyrum* tuberosum habet *Columna ecphraf.* 1, 156. p. 301.

*Lathyrus tuberosus* (*ἀρακος*, *hist.* 8, 8.). Cf. *Galen. fac. alim.* 1, p. 316,

*Vicia Faba* (*κνάμος*, *hist.* 8, 3.).

*Cicer arietinum* (*ἐρέβινθος*, *hist.* 8, 3. κρίς 8, 5.).

*Pisum sativum* (*ἐπίσος*, *hist.* 8, 3. *ἐρέβινθος ἐρεβιάϊος*, 8, 5.).

*Pisum Ochrus* (*ὠχρὸς*, *hist.* 8, 3.).

*Biserrula Pelecinus* (*πηλεκίνος*, *hist.* 8, 8.) inter *Lathyros* spontanea. *Coronillam* habet *Securidacem* *Clus. hist.* 2, 236. 237.

*Colutea cruenta* (*κολουτέα πρὸς Λίπαραν*, *hist.* 1, 18. 3, 14. 17.).

*Glycyrrhiza asperima* (*γλυκεῖα ῥίζα σκυθική*, *hist.* 9, 13.). Narrat, hac radice vefci *Scythas*

cum hippace. Idem adfirmat *Pallasius* (*Reise*, 1. app. n. 121.), qui hanc speciem frequentissimam in deserto ad Iaikum invenit, quae a Calmuccis avide comedatur et theae loco infundatur.

*Ervum Ervilia* (ὄροβος). Pabulum boum cultum. Cf. *Aristot. hist. anim.* 3, 21. *Galen. fac. alim.* 1, p. 304.

*Astragalus creticus* Lam. (τραγάκανθα, *hist.* 9, 1.). Prius soli Cretae peculiarem putasse, iam vero et in Achaide Peloponesi inventum fuisse. Hanc esse veram speciem gummiferam, *Tournefortius* docuit, invenit etiam nuper in Caucaso *Marshallius* (*Beschr. der Länd. am Cauc.* p. 78.).

*Medicago sativa* (μηδική, *hist.* 8, 8.).

*Medicago arborea* (κίτισος, *hist.* 4, 20.). Cf. *antiqu. bot.* p. 37.

*Citrus medica* (μηλέα μηδική ἢ περσική, *hist.* 1, 22. 4, 4.). Bene describitur, sed optime provenisse in Graecia haud videtur, quum edules fructus non haberentur, sed ob solam spiritus εὐσμάων in ore servarentur. Serebatur in vasis fictilibus perforatis, ut radicem agere tutius posset.

*Lactuca sativa* (θριδάκνη, *hist.* 1, 16. 7, 4.). Plures aderant varietates; candida, quae dulcior ac tenerior; rotundicaulis, Laconica, folio crispo spinoso (quae forte *L. crispa*) et laticanlis, adeo gigantea, ut pro valvis hortorum haberetur.

?*Prenanthes purpurea* est *Tabernaemontano* (1, 319.) λιβανωτὶς ἄκαρπος, (*hist.* 9, 12.).

*Tragopogon crocifolius* (τραγοπώγων, *hist.* 7, 7.), folio croceo, calyce amplissimo et pappo plumoso.

*Sonchus maritimus* (σόνχος 7, 9.) folio spinuloso.

*Leontodon Taraxacum* (ἀφάκη, *hist.* 7, 8.), primo vero florens, per totum annum durat.

*Cichorium Intybus* (κικώριον, *hist.* 1, 16. et aliis locis.).

*Helminthia echinoides* (πίκεις, *hist.* 7, 11.).

*Hyoseris lucida* (ὑποχόρις, *hist.* 7, 11.).

*Carthamus tinctorius* (κνήκος, *hist.* 6, 3. 4.).

*Carthamus mitissimus* (κνήκος μαλακώτερος καὶ λειότερος, *hist.* 6, 4.).

*Carthamus arborescens* sine dubio gigantea illa κνηκοῦ species est, quae (*hist.* 6, 4.) memoratur.

*Carthamus lanatus* (ἀτρακτυλὶς ἢ φόνος, *hist.* 6, 4.), qui vulneratus succum edat cruentum. Cf. *Column. ecphraf.* 2. *Anguill.* p. 149.

*Onopordon Acanthium* (ἄκανος, *hist.* 1, 16. 6, 1. 4. 9, 13.). Cf. *Honor. Belli epist.* ad *Clus.* p. 310. Ὀνόγωρον dicit *Nicander*, *ther.* 71. E Creta advectum describit *Anguillara* p. 189.

*Carduus leucographus* (λευκόκανθος, *hist.* 6, 3.).

*Carduus arvensis* (ἡ ἀκανθα ἡ κεάνωθος, *hist.* 4, 11.). Cf. *Column. ecphraf.* 1, 12. *Anguillara* p. 141.

*Scolymus maculatus* (σκέλυμος, *hist.* 6, 4.). Edulis tum radix tum floris basis ipsa. Diu arbitratus sum, nostram Cynaram Scolymum intelligi, donec *Anguillarae* optimi (p. 135.), *Clusii* (*hist.* 1, p. 153.) et *Beckmanni* (*Gesch. der Erfund.* 2, 209.) argumenta perpenderim. Docuerunt ii enim, Scolymum Linnaeanum, Bononienfibus *Eringio* dictum, radiceque vesca praeditum, omnino eundem esse cum Theophrasteo, alienum autem a Dioscorideo, quippe qui magis cum nostra Cynara congruat. Id eryngium *Plinii* (22, 8.) esse, maxime probabile est.

*Cynara Cardunculus* (κάκτος, *hist.* 6, 4.). Edules petioli foliorum. Cf. *Athen.* 2, 28.

*Arctium Lappa* (ἀπαρίνη altera, *hist.* 7, 14.).

*Carlina acaulis* (χαμαιλέων λευκός, *hist.* 9, 13.).

*Acarna gummiifera* (ἰξίνη, *hist.* 6, 4. 9, 1.). Mastichinum largiri laticem sanguineum. Cf. *Column. ecphraf.* 1. Bene describit, qualem in Umbria invenerit, *Anguillara* p. 138. Cf. *Alpin. exot.* c. 54. *ic.* p. 124. 125.

*Acarna cancellata* (πτέρνιξ, *hist.* 6, 4.). Capitula florum involucris spinulosis et feminibus papposi demtis, comedi. Hanc et antecedentem spe-

ciem Cretae incolae et hodie amant. *Σκαλίον* vocari, Scaleram autem ab incolis Tarenti *Anguillara* testatur p. 137. Cf. *Alpin. exot.* 2, 21. p. 255.

*Santolina* forte *Chamaecyparissus* (ἀβρότονον, *hist.* 6, 7.).

*Gnaphalium Stoechas* (ἐλέχρυσον, *hist.* 7, 3. 9, 21.).

*Inula viscosa* et *Pulicaria* (κόνωζα ἄρρεν καὶ θήλυ, *hist.* 6, 2.). Cf. *Schol. Theocrit. id.* 7, 68.

*Senecio vulgaris* (ἡβριγεῶν, *hist.* 7, 8.).

*Doronicum scorpioides* (θηλύφονον, σκέρπιος, *hist.* 9, 19. . Folia Cyclamini similia, radix scorpionem refert (Cf. *Column. ephr.* 2, 18. p. 36.).

*Centaurea benedicta* (ἄκορνα, *hist.* 1, 16. 6, 4. forte et ἄκορος, *hist.* 1, 22.), folio spinoso, flore flavido et λιπαρῷ. Cf. *Anguillara* p. 146.

*Centaurea Cyanus* (μήκων Ἡρακλεία, *hist.* 9, 13.). *Fab. Columna* saltem huc refert (*phytob.* p. 74. t. 21.).

*Brotera corymbosa* Willd. (χαμαιλέων μέλας, *hist.* 9, 13.). Primus eam in Sclavonia et Apulia viderat, delinearique curavit optimus *Anguillara* p. 139. 140.

*Echinops Ritro* (ἐύτερος 6, 3.). Cf. *Anguillara* p. 142.

*Orchis Morio* (ὄρχις, *hist.* 9, 19.).

*Aristolochia cretica* (ἀριστολόχια, *hist.* 9, 13. 22.). Cf. *Nicandr. ther.* 510.

*Typha latifolia* (τύφη, *hist.* 1; 8. 4, 11.).  
Sed corruptus locus: pro ἄφυλλος enim ἀφυλ-  
λῶνθης legendum. *Bod. ad Theophr.* p. 464.

*Phucagrostis maior* Caulin. (Φυκοῦ γένος τῇ  
ἀγρώστει ὅμοιον, *hist.* 4, 7.). Cf. *Caulin.* in  
*Usteri's Annal.* 11, 33. Aliud nomen *Cymodo-*  
*ceae aequoreae* largiuntur huic plantae auctores *an-*  
*nalium bot. angl.* vol. 2. p. 96.

*Alnus oblongata* Willd. (κλήθρα, *hist.* 3, 4.).

*Cocos nucifera* (κονκόφορα, *hist.* 4, 2.). A  
vulgari phoenice hanc palmam differre, quod fru-  
ticosa sit, fructum ferat rotundum, mole insignem  
et latice gratissimo plenum. Primus *Anguillara*  
(p. 70.) fructum hunc verum cognovit.

*Poterium spinosum* (Φλέως, στοίβη καλουμένη,  
*hist.* 6, 1. 5.).

*Thelygonum Cynocrambe* (Φύλλον θηλὲ γονον  
καὶ ἀρρενέγονον, *hist.* 9, 19.).

*Arum Colocasia* (ἄρον, *hist.* 7, 11.). Cf.  
*Anguillara* p. 127.

*Arum Dracunculus* (δρακοντίον, *ib.*).

*Corylus Avellana* et *tubulosa* Willd. distin-  
guuntur (*hist.* 3, 15. Esse enim, quae rotundam  
et aliam, quae oblongam nucem ferat.

*Carpinus Betulus* (ζυγία, *hist.* 3, 4. 6. 10.),  
*Plinio* (16, 15.) et *Vitruvio* (2, 9.) ita verten-  
tibus.

*Quercus Ilex* (πεῖνος, *hist.* 3, 16.).

*Quercus coccifera* (πρῖνος, ἡ τὸν Φαινικοῦν κόκκον Φέρει, *hist.* 3, 8.).

*Quercus Cerris* (ὀξύη ἀγρία). Namque folium habet solidum πολυσχιδές (1. δισχιδές), προμηκέστερον ἀπίου καὶ ἐξακανθίζον (*laciniae foliorum sunt mucronatae*). Καρπὸς βαλανῶδες ἐν ἐχίνῳ (*calyx hispidus crinitus*) καὶ οὐχ' ὡς ἡ Διὸς βάλανος ἀκανθώδης (*hist.* 3, 6.). *Caesalpinus* (*de plant.* 2, 3,) non sine difficultate *Fago sylvaticae* tribuit. Cf. *Bellon. obs.* 1, 41.

*Quercus Suber* (Φελλός, *hist.* 3, 16.).

*Quercus Pseudo-Suber Santi* (ἀλαφιλοῖς, *hist.* 3, 9.). Cf. praefertim *Dalechampii* descriptionem apud *Bod.* p. 154.

*Quercus Aegilops* (αἰγίλωψ, *hist.* 3, 9.).

*Quercus Esculus* (Φηγός, *hist.* 3, 9.).

*Quercus Ballota Desfont.* (ἡμερίς, *hist.* 3, 9.). De ea quercu loquitur *Strabo* (3, 215.).

*Quercus Tournefortii* (πλατύφυλλος, *ib.*).

*Quercus faginea* (σμίλαξ Ἀρκαδῶν, *hist.* 3, 16.). Haec forte est παιδέρως *Pausaniae* (2, 10.) humilis, Sicroni peculiaris, foliis subtus canis, minoribus quam *Qu. Esculi*. Cf. *Desfontaines in annal. phys. gall.* 38, 375 f.

*Iuglans regia* (καρύα παρσικῇ, *hist.* 1, 18, 3, 7.).

*Fagus Castanea* (Διὸς βαλανός εὐβοϊκῇ, *hist.* 1, 18, κασταναῖκὸν κάρυον, *hist.* 4, 10.).

*Morus nigra* (συκάμινος, *hist.* 1, 19.).

*Ostrya vulgaris* (όστρέα, *hist.* 3, 4. 10.).

*Pinus Abies* (ἐλάτη). Graeci nostrates, Pontus euxini accolae, ἐλάτης nomine insigniunt *Pinum orientalem* (*Tournefort. it.* 2, 104.).

*Pinus Larix* (πίτυς). Hanc solam regermi-  
nare e caelo trunco, ut in Lesbo acciderit, incen-  
so monte Pyrrhaeo (*hist.* 3, 10.).

*Pinus maritima* (πεύκη Ἰδαία, *hist.* 3, 10.),

*Pinus halepensis* (πεύκη παράλιος, *ib.*).

*Pinus picea* (πέυκη.).

*Pinus Pinea* (πεύκη κωνοφόρος, *hist.* 2, 3.  
*causs.* 1, 23.).

*Thuia articulata* (θύσον, θύα, *hist.* 5, 5.). In  
agro Cyrenensi copiosam esse Cupresso similem, ra-  
dicem densam, materiem densissimam. Inven-  
erunt in collibus Barbariae et *Shawius* et *Vahlus* (*symb.*  
2. f. 48.) et *Fontanefius* (*fl. atlant.* 2. t. 252.).  
Male sagacissimus cetero *Anguillara* (p. 47.) ad  
Sabinam refert.

*Cucumis sativus* (κολοκύνθης.).

*Cucumis Melo* (σίκενος.).

*Cucurbita Pepo* (σικύα.).

*Cucurbita Citrullus* (πέπων.).

*Salix Helix* (ιτέα ἔλιξ, *hist.* 3, 13.).

*Salix riparia* (ιτέα μέλαινα, *ib.*).

*Salix alba* (ιτέα λευκή, *ib.*).

*Salix babylonica* (ιλαιάγνος, *hist.* 4, 11.).



Humida loca amans, folio incano, flore populi simili, fructu nullo. Cf. *Rauwolf itin.* p. 112.

*Viscum album* (ἰξία, causs. 2, 23.).

*Iuniperus communis* (ἄρκενθος.).

*Iuniperus nana* (καδρίς, hist. 1, 15. 16.). Non arborefcit.

*Iuniperus Oxycedrus* (κεδρος, hist. 1, 16. 3, 12.). Nomine ἀρκενθου μεγάλης describit *Dioscorides* (1, 103.). Cf. *Anguillar.* p. 45. 46.

*Taxus baccata* (μῆλος, hist. 3, 10.).

*Buxus sempervirens* (πύξος, hist. 3, 15.).

*Phoenix dactylifera* (Φοῖνιξ).

*Cycas circinalis* (κύκας, hist. 2, 8.). Inde panes confici.

*Chamderops humilis* (χαμαιριφές, hist. 2, 8.).

In Creta et Sicilia inveniri, e radice germinari, infervire ad sportulas et vitilia. *Anguillara* p. 71. Cefaglione appellari in Sicilia.

*Tamus communis* (ἀμπελος Ἰδαία, hist. 3, 17.) folio rotundo minori integro.

*Populus alba* (λευκή) et *nigra* (αἰγειρος, hist. 3, 14.).

*Pistacia Lentiscus* (σχῖνος, hist. 9, 1.).

*Pistacia Terebinthus* (τέρμινθος, hist. 3, 15.).

*Smilax aspera* (σμίλαξ, hist. 1, 16. 3, 18.).

Φύλλον εἰς ὄξυ προῖκον καὶ παραγωνίζον.

*Ruscus aculeatus* (κεντρομυρέβη, hist. 3, 17.).

*Ruscus racemosus* (θραύκαλος, *hist.* 3, 7. 4, 1.).

*Ruscus Hypophyllum* (δάφνη Ἀλεξανδρεῖν ἐπι-  
φυλλοκάρπος, *hist.* 1, 16. 3, 17.).

*Acacia Senegal* (ἄκανθος λευκή, *hist.* 4, 3.).  
Huius flores esse adspectu pulcros (sulfureos) et  
odore suaves: coronis ideo implecti, quod et testa-  
tur *Hellanicus* apud *Athen.* 15, 678.

*Acacia arabica* (ἄκανθος μελανα, *ib.*). Illam  
cortice albo, hanc fusco insigniri, utramque gum-  
mi largiri et egregiam materiem. Hanc materiem  
cum ligno lotino componit *Herodotus* (2, 96.) et  
ad navigia struenda adhiberi testatur.

*Acacia Catechu* (ἄκανθος τῆς Ἀρείας χώρας,  
*hist.* 4, 5.) quæ lacrimam fundat.

*Mimosa polyacantha* (ὑλημα ἰδὼν περὶ Μίμωιν,  
*hist.* 4, 3.). Tôtus aspectus spinis horridus, folia  
filicina, quæ si quis tetigerit, collabi et post ali-  
quod tempus iterum erigi. Nulla, quod sciam,  
*Mimosa* Africae incola est, quæ sensitiva sit, prae-  
ter hanc speciem, quam *Brucius* nomine *Ergett et*  
*Krone* (*Reise*, 5, t. 7.) delineavit.

*Polypodium vulgare*, in arborum truncis quan-  
doque inveniri (*causs.* 2, 23.).

*Athyrium Filix femina* (θηλύπτερος, *hist.* 9,  
20.).

*Asplenium Trichomanes* (τριχομανές, *hist.* 7,  
13.). Stipite nigro, foliis parvis oppositis.

*Asplenium Hemionitis* (ήμιώνων, *hist.* 9, 19.).

*Scolopendrium officinale* (σκολοπένδρον, *ib.*).

*Adiantum Capillus* (ἀδίαντον, *hist.* 7, 13.).

*Fucus bulbosus* Turn. (Φύκους γένος, ὁ καλοῦ-  
σιν ἐνιοι πρᾶσον, ἄλλοι δὲ ζωστῆρα, *hist.* 4, 7.)  
latifolius, colore herbido, radice densa bulbosa ex-  
tus hirta supra squamata.

*Fucus aculeatus* Turn. (τὸ δὲ τριχῶδες, ὥσπερ  
τὸ μάραθρον, *ib.*).

*Fucus saccharinus* (πρᾶσον, *ib.*). Nasci in  
oceanō extra Herculis columnas, mira magnitu-  
dine, oriri autem velut ex umbilico. Est hic co-  
tyledon, quali Fucum delineavit *Gunnerus flor.*  
*Nor v. 2, t. 9. f. 4. 5.*

*Fucus cartilagineus* (Φύκους γένος κάλλιστον  
ἐν Κρήτῃ, ᾧ βάπτουσιν τὰς τανίας καὶ τὰ ἔρια, *ib.*).

*Fucus amariscifolius* Turn. *F. Myrica* *Gmel.*  
*fuc. t. 3.* (δρυς, ἥς Φύλλον μυρικωδέστερον καὶ λεπ-  
τόν, πολὺ δὲ καὶ οὐκ ἀνόμοιον τὰς τῶν ὀσπρίων λο-  
βοῖς, κοῖλον δὲ ἐνδοθὲν· ἡ δὲ μορφὴ σκολιωτέρα, ἀ-  
κρέμονας ἔχει σκολιωτέρας καὶ βραχυτέρας καὶ πυ-  
κνωτέρας, *ib.*).

*Fucus filiquosus* (ἐλάτῃ, ἥς Φύλλον προμηκί-  
στερον καὶ παχύτερον, ἡ δὲ μορφὴ μονόκαλος καὶ  
ὀρθή, *ib.*). In ramis animalcula marina residere.

*Fucus* forte *volubilis* f. *spiralis* *Barrel. ic.*  
1305. est ἄμπελος ποντία, *ib.*

*Fucus turbinatus* Gmel. *fuc. p.* 97. *t.* 5. *f.* 1.  
(συκῇ ποντία ἄφυλλος, *ib.*).

*Fucus palmatus* Gmel. *t.* 30. (Φοῖνιξ ποντία,  
*ib.*).

*Fucus membranifolius* Woodv. in *Linn. trans-*  
*act.* 3, *t.* 15 f. *F. Palmetta fl. dan.* 827. potest  
δάφνη ποντία esse.

*Ulna Lactuca* (ἄλλο δὲ βότρυον, ὃ φύλλον ἔχει  
ποῶδες τῇ χερά, πλατὺ δὲ καὶ οὐκ ἀνόμοιον ταῖς  
θριδακίναις, *ib.*).

*Tuber cibarium* Sibth. est ὕδνον, maxime κε-  
ραύνιον, κράνιον, γεράνειον (*hist.* 1, 9.) de quo et  
*Athen.* 2, 21.

*Agaricus* forte *deliciosus* f. *campestris*, μύκης  
(*hist.* 1, 8.).

*Helvella* forte *esculenta* aut *Morchella escu-*  
*lenta* erit πύξος f. ut legit *Athenaeus*, πέζια (*hist.*  
1, 9.).

En totum vegetabilium, quae cognovisse Theo-  
phrastus videtur, ambitum, in quibus definiendis  
si nonnunquam lapsus fuero, excusandus esse vi-  
deor et mancis descriptionibus et corrupto textu  
et ipsis auctoris erroribus. Etenim longe alienus  
Theophrastus a praeceptoris more fuit, qui omnia,  
quotquot descripsit, ipse etiam examinare fategit.  
Noster vero peregrinatorum fide aut relationibus,

quas vulgus ferebat, nixus, plurimas immiscuit fabulas, quae si ipsius fidem superare videbantur, περὶ τούτου δὲ σκεπτέον plerumque adiunxit.

#### PHYSICA VEGETABILIMUM.

Historiam plantarum naturalem Theophrastus obiter et quasi aliud agens tractavit, calamo eas fugaci delineans properavit ad rationes vegetationis, in quibus exponendis et ad artes, praesertim ad hortorum et agrorum culturam applicandis omnis esse studebat.

In *nominibus* partium deligendis curiosus fuit, eaque studiose definivit, quod satis laudandum, quum novo saepe et prius haud usitato significato voces usurpet. De definitionibus tamen agens (*hist.* 1, 6.) οὐκ ἀκρὴς βολογητέον inquit τῷ ἔρω, ἀλλὰ τῷ τύπῳ ληπτέον τοὺς ἀφορισμούς. Accidentales tamen et essentialis differentias probe agnoscit: sylvestres enim et urbanas, floriferas et non floriferas, arbores, frutices et herbas haud naturali et essentiali modo inter se differre manifesto docet.

Foliorum formas non male expressit, plerumque tamen similitudines adfert, προσεμφερὲς τῷ τῆς πετελας, δάφνης, ἐλαίας. Ad marginem praecipue respexit, ἐντομαῖς distinxit ab εὐσχίστοις foliis: μίσχον (petiolum) fere ubique descripsit. (*hist.* 1, 16.).

Arbores primus vocat μονοστελεχεῖς, Frutices vero (Φρύγανα) πολυστελεχεῖς ἀπὸ ῥίζης: posse tamen et olera arborefcere, quae δένδρολάχανα iccirco vocentur, et myrtum frutescere, ni continuo purgetur (*hist.* 1, 5.). Βρύον fere semper gemmas, βλάστημα autem germen e semine aut gemma prodiens (pousse ou rejetton Gallorum) ἔλικα capreolum, ἀκρέμονας ramos aut ὄζους vocat.

De fructibus agens paucissimas arbores ὄσπρια ferre aut gymnospermas esse existimavit: ἐλλοβοσπέρματα (*filiquosus*) optime distinxit ab ἐμφλοισπέρμασι et πακποσπέρμασι (*hist.* 1, 18. 7, 3.).

Ipsam vero plantae definitionem haud ausus est proferre: bene enim perspexit, adeo variam esse vegetabilium indolem, ut paucis verbis character eorum exprimi nequeat. (Ὅλως δὲ πολύχουν τὸ τῶν φυτῶν καὶ ποικίλον καὶ χαλεπὸν εἶπεῖν καθ' ἑλόν, *hist.* 1, 2.). Neque radicem enim neque caulem neque florem neque fructum omnibus singulisque plantis tribui posse.

Ceteroquin, veterum philosophorum more, a comparatione animalium cum plantis proficiscitur, ut et fabricam plantarum et partium usum exponat. Hinc ad humidum radicale et calidum primigenium omnia reducere conatur (*hist.* 1, 3. *causs.* 1, 13.).

Quum Aristoteles in animalibus ad fibras et venas ubique consilium transtulerit, noster simili ratione haec principia in herbarum physicam intro-

duxit. Definivit autem *fibrā* (ἵνα) longitudinale quid et continuum et fissile neque regerminans (ἀπαράβλαστον): *venas* vero esse maiores et densiores et ramosiores fibris. Inter utrumque principium semper carnem f. telam cellularem inveniri. Lignum maxime conflari ἐξ ἑνὸς καὶ ὕγρου. Progredi in folia et fibras et venas: e fibrillis folis constare folia graminea, ubi παρὰλληλαι progrediantur. Sic flores et fructus modo e fibris et carne, iam e fibris et cortice conflari (*hist.* 1, 17.). Venas et fibras omnium εὐγενεστάτας in abiete invenit (*hist.* 5, 2.). E quo quidem apparet, ἵνας Theophrasti esse fasciculos vasorum spiralia, sub sensus cadentes, atque ligni prima rudimenta constituentes, qui omnino non dividuntur. Venas autem habet vasa peculiararia f. interstitia textus cellulosi, quae humores peculiares vehunt.

Corticem plantarum, imprimis arborum, dividi in duas partes, epidermidem (ἐπιπολῆς) et corticem proprium (φλοιὸς κύριος.). Hunc maxime necessarium esse vitae, ut detracto eo pleraeque arbores intereant (*hist.* 4, 18. *causs.* 5, 24.). Corticem facile secedere a subiacente ligno, quum humores adscendant (*hist.* 1, 4. 5, 1.).

Ligni duritiem variam esse pro soli differentia. Quae enim in montium cacuminibus creverint, multo meliorem habere materiem, quam quae in paludosis locis et udis (*hist.* 1, 11.). Unde et

materiem Macedonicam praestare Euboica (*hist.* 5, 3.). Durissimum lignum buxi credit et celtis (*hist.* 5, 4.). Duriorem etiam habet ligni partem eam, quae proxime medullam ambeat, μήτρα aut ἰγνάδιον dictam (*hist.* 5, 5. 6.).

In medullae usu sibi constare noster haud videtur. Modo enim in ea ἀρχὴν τινα καὶ οὐσίαν ὑγρότητα quaerit, et, ut Arcades referant, medulla penitus exenta, arborem necessario interituram esse perhibet (*causs.* 5, 24.). Iam vero haud necessariam esse ac essentialē partem, quum cavi trunci ferre tamen et flores possint et fructus (*hist.* 4, 19.). Palmis nullam medullam, neque concentrica esse ligni strata, bene iam animadvertit (*hist.* 1, 9.).

Foliorum virorem exponere quidem nequivit: memoratu tamen digna explicatio, quam de sempervirentibus foliis exhibet: esse ea plerumque minoris molis et angustiora et pingua et suaveolentia (*hist.* 1, 13.). In Aegypto et Delta praeprimis tantum non omnes semper arbores virescere. Nullam esse rationem inter frondescentiae tempus et defoliationis: plura sero germinare aut frondescere, quae praecocius tamen folia perdant. Ante florum et fructuum proventum varias arbores delicere folia (*hist.* 1, 15.).

Nutriri plantas per folia egregie iam observavit. Nonnullos arbitrari, quod supinae foliorum faciei advehatur nutrimentum per partem



pronam, hanc enim ἔγκμον αἰεὶ esse καὶ χροῶσθην. Quod non recte fieri existimat, nullos enim esse meatus, quae folium penetrent, sed utramque paginam absorbere nutrimenta aërea (*hist.* 1, 16.).

Folia feminalia f. cotyledones probe iam differre animadvertit a reliquis, formam enim esse rotundiores simplicioresque, quae praecedere debeat angulosam et compositam (*causs.* 2, 22.). In eo *Göthium* τὸν πᾶνυ habet adscclam (*von der Metamorphose der Pflanzen*, p. 11.).

De crescendi modo plura eximie observavit. Radicem ubique primo propelli: eam hyeme et autumnō, τὸν βλαστὸν vero vere et aestate augeri (*causs.* 1, 13.). Alternam esse actionem crescendi et fructificandi. Quae enim in ampliorem succrescant magnitudinem, raro fructus perficere, et dum hoc fiat, augmentum plantarum suspendi (*causs.* 2, 14.). Bulbos ceparum et alliorum recta deorsum radices pellere, nec, ut tubera versus latera (*hist.* 1, 10.).

De duplici sexu plantarum multa occurrunt, quae tamen cum nostris ratiociniis haud facile congruunt. Vidit quidem flores masculos melonum terminales, sed simplices eos dicit, et tolli debere, quod βλάστησιν impediunt. Ibidem distinguit palmarum feminas a maribus (*hist.* 1, 22.). Sic et *Leontinus in Geopon.* 10, 4. Ὁ δὲ Φοῖνξ ἐστὶ καὶ δειμῶς ἐτέρου Φοίνικος. *Plin.* 13, 4. *Ammian.*

*Marcell.* 24, 3. *Achill. Tat.* 1, p. 57. Nihilominus perversam habuisse de eo sexu sententiam, vel inde patet, quod ubique fere arbores et sylvestres et urbanas distinguat in feminas et mares. Has esse nodosiores illis, ut pateat ex *κρᾶνείας* cum *Θηλυκρᾶνείας* comparatione (*hist.* 1, 13.). Hinc etiam non mirum est, si mares fructibus onustos ipse memorat (*hist.* 3, 6.).

In caprificatione multus est. Antiquum illum Graeciae morem, infecta, quae *ψῆνες* dicuntur, ficibus apponere, ut inde semina gignantur inatura, strenue defendit, quod e putredine *ζωοποιὸς ἡ φύσις* possit semina perficere. In solo macro autem et aquilonio haud desiderari caprificationem, quia propter alimenti penuriam sponte fructus ficcentur. Hinc etiam pulveris insperionem iuvare (*causs.* 2, 12. 13. 5, 1.). Nec in Italia tamen nec in Laconia necessariam esse hanc methodum (*hist.* 2, 9.). Cf. *Pontederæ anthol.* 2, 33—35. *Olivier voy. dans l'empire Othom.* 2, p. 171.

Quam parum lucida fuerit Theophrasti sententia de sexu plantarum, vel inde effici potest, quod amenta mascula avellanae (*βυλός*) cum gallis *Quercus cocciferae* comparat nec essentielles habet partes aut flores (*hist.* 3, 7. 8.).

De vitalitate seminum observationes haud paucas instituit. Generatim quidem ultra quadriennium haud durare perhibet (*hist.* 7, 6.), multo

diutius tamen leguminosa. Et esse in Cappadocia et Media locos, ubi per quadraginta et quod excurrit annos semina possint durare.

His accedunt *observationes singulares physicae*, quarum insignis copia apud Theophrastum invenitur.

Crescere plantas plurimas ἀπὸ δακτύων, e gemmis aut bulbillis, qui in malo arbore miram faciem bestiarum praebeant, mediam enim esse turgidiorum, fructiferam, laterales vero graciles folii- et frondiferas (*hist.* 1, 13.). A femine solo crescere coniferas: et quae e seminibus solummodo crescant et propagentur, necessario, deteriores fieri, haudquaquam easdem saltem qualitates fervare, quam quae ἀπὸ παρασπᾶδος, παραφυᾶδος aut ῥάβδων. Phoenicem, quae nusquam nisi seminibus propagetur, propagari tamen capite secto in Babylonia (Cf. *Houttuyn's Pflanzenyst.* 1, 130.). Cupressum et laricem rarissime a caudice aut radicibus progerminare, fieri autem id in Creta et Tarra (*hist.* 2, 3. 8.).

Generationem plantarum in locis, ubi ante non fuerunt, tum ex avium auxilio, quae seminibus vescantur (*causs.* 2, 24.) tum e fluviorum ripas inundantium graviditate declarat (*hist.* 3, 2.).

Soli et terrae efficaciam in plantarum indole mutanda magna fecit. In agro Elephantino nec vitum nec ficum folia perdere (*hist.* 1, 6.): apud

Gortynam Cretae esse platanum sempervirentem (*hist.* 1, 15.): panicam in Aegypto mutari in dulcem, circa Solos Cilitiae omnes fructus esse ἀπυρήνους (*hist.* 2, 3.). In Melo insula, quae fata sint, frumenta intra triginta aut quadraginta dies meti incipere. Quamobrem dicere incolas consuevisse: μέχρι τούτου δεῖ σπείρειν, ὥς ἂν εἶδῃ τις θεράγμα. In Chalcia Rhodiorum insula hordeum, quod cum reliquis frugibus satum sit, meti iterumque feri æ tandem cum iisdem frugibus meti solere. Segetes Salaminis longe prius perfici quam in ceteris Atticae tractibus (*hist.* 8, 3.). E Sicilia in Achaïam advectam fuisse tritici speciem bimestrem, quae vero ὀλγόχοος sit et ὀλγόγονος. Ponderosissimum triticum ferre et Siciliam et Boeotiam (*hist.* 8, 4.).

Terram generatim eo fertiliorē esse, quo artius partes mistae sint. Namque πλυντρίδα, qua fullones utantur, sterilem fere esse, fertiliorē sabulosam, λευκόγειαν (*causs.* 2, 5.). Sales plantis in totum nocere: consuescere tamen Indos palmarum proventum salis irrigatione promovere (*causs.* 2, 7. 3, 22.). Cf. *le Goux de Flaix in Bibl. œcon. phys. ann.* 3. p. 236. f.

Aëris et anni temporum efficaciam in producendis plantarum vicissitudinibus egregie observavit. Vænum tempus incipit ab ortu Arcturi acronyctico (πρὸ Ἀρκτούρου) Martio et terminatur ortu heliaco Pleiadum (ἐπὶ Πλειάδι) Maio. Inde

*aestas*, in duas divisa partes, quarum altera ad Solis heliacum ortum (ἐπὶ κυνι) Iulio, altera ad ortum usque Arcturi heliacum (ἐπὶ Ἀρκτουρέφ) Septembri progreditur. Unde coepit *autumnus*, occasu pleiadum heliaco (μετὰ δύσιος Πλειάδων) Nov. terminatus. Neque tamen defunt menses in Theophrasto; γαμηλιῶν (Ian.), μουνιχιῶν (Mart.), θαρ-  
 γηλιῶν (Apr.), σιυροφοριῶν (Mai.), ἑκατομβαιῶν (Jun.), μεταγεινιῶν (Iul.), βοηδρομιῶν (Aug.), πυναιψιῶν (Oct.).

De *morbis plantarum* exponendis optime meritus est. Praecipue vero frigoris effectus summo studio persequitur (*causs.* 5, 18.) licet tempestivas hyemes prodesse arboribus autemet; μὴ χεμασθέντα γὰρ κακοβλαστώτερα γίνεσθαι (*hist.* 4, 16.). Omnibus arboribus, praesertim fico et viti, communem esse σκωληκισμόν. Oleam autem pati praeterea ἥλον, quem et μύκητα aut λοπάδα appellitent, quod a solis ardore oriatur. Ficum σφακελισμῷ radicum affici, quem, dum ramos corripiat, κράδον appellari. Scabiem arbores maxime infestare, quum ἐπὶ Πλειάδι (Maio) pluviae parum ceciderit. Vitem obnoxiam esse ῥοαδί καὶ ἀστροβολισμῷ, oleam ἀραχινίφ et κανθαμῷ (*hist.* 4, 17.).

Seminum vitium commune habet ἐρυσίβην rubiginem, proprium esse ciceri σφακελισμόν; triticum infestari κανθαρίδι et cuminum ἄλμας. Ru-

biginem frequentiore esse in convalibus, quae vento nequaquam perflentur (*causs.* 5, 11.).

Ad horti et agri culturam pleraque pertinent, quae in libris de causis plantarum tractat. Maxime artificia quaedam exponere studet, ut rutam feri cum ficulnei ligni fragmentis (*causs.* 5, 7.): olea terra obruta teneriora reddi et sapidiora (*causs.* 5, 5.): ex amygdala amara dulcem gigni, dum circumcidatur (*causs.* 1, 21.). Explicat etiam varia miraculosa: quod statuae ex oleae ligno fabrefactae sudare videantur, (*causs.* 5, 4.): quod oleaster Megarensis continuerit *κνυμίδας* (*hist.* 5, 5.) etc.

---

## CAP. II.

### SCHOLA ALEXANDRINA.

Ptolemaeorum liberalitate et incredibili fere eruditionis omnigenae studio factum est, ut Alexandriam, aëre saluberrimo gaudentem et commercio per omnem terrarum orbem extenso florentem, confluerent et viri docti et qui doctrinam adfectarent. Etenim regis sumptibus in Museo, regiarum aedium parte, nutriti, peregrini fere fuerunt, qui munificentia regis adlecti, otio literario sibi indulserunt (*Strabo* 14, 991. 17, 1143.). Gloriosa Attalorum et Ptolemaeorum aemulatione tam immentia librorum cuiusvis generis copia Alexandriae

coacervata fuit, ut bonarum artium magistri et studiosa iuventus solum id fere officium duxerint atque in eo vitam fere consumserint, quanam ratione libri veterum sint exponendi ac commentariis illustrandi (*Galen. comm. 2. in libr. de nat. hum. p. 16. 17. Ammian. Marcell. 22, 16.*).

Praeter usum ingentis bibliothecae non defuisse Alexandriae rerum naturalium musea videntur. Namque ab ipso inde Philadelpho *Φιλαδέλφῳ* et ob corporis infirmitatem novis semper studiis incumbente (*Strabo 17, 1138.*), omnes fere Ptolemaei commercium et navigationem insigniter promoverunt. Non *καταμωμοφῶσαν* solummodo regionem, sed ipsam etiam Taprobanen (*Ceylonam Dionys. Perieg. peripl. v. 593.*) et Erythiam (*Maderam ib. 558.*) et Hesperios Aethiopes (*Senegambiam*) frequentarunt navigia, resque naturales non paucas inde Alexandriam advexerunt (*Athen. 14, 654. Dio Chrysostom. orat. ad Alex. p. 372 f.*). Ipsorum regum exemplo, hisque egregiis subsidiis historiae naturalis studium acerrimum esse Alexandriae debuisset, quum ipse Ptolemaeus Evergetes commentarios de rebus naturalibus scripserit, unde de phasianis e Media Alexandriam adlatis locum excerptit *Athenaeus (l. c.)*.

Aliter tamen accidit: nec res herbaria nec animalium historia, prosperrime ab *Aristotele* agitata, speratos progressus Alexandriae fecerunt. Quod

praecipuis studiorum rationi tribuendum est. Namque, qui libris legendis, transcribendis et exponendis omnem fere vitam impendebant, neglexerunt naturam ipsam adeo, ut σχολαστικοῖς solis inhaerent (*Galen. comm. 2. in libr. de nat. hum. p. 29.*). Quum ipsi reges ludos Musarum et Apollinis instituissent, quibus, qui vicerit, Olympicorum victorum more, coronaretur (*Vitruv. 7, praef.*) disputationes etiam sophisticas, grammaticas argutias, criticos commentarios omnibus aliis studiis anteposuerunt. Quae *Clearchus* apud *Athenaeum* (10, 457.) de griphis ac aliis ingenii lusibus fere puerilibus narrat, Alexandrinum scientiarum studium egregie nobis pingunt. Hinc historiae naturalis dignitas mox adeo labefactata fuit, ut nil nisi mirabilia quaererent, veterumque scripta, φιλοκερδοῦντων hominum malitia et incuria satis corrupta aut interpolata exponere et grammaticè illustrare studerent.

Ipsius Theophrasti libri tantum abest, ut integri ab Alexandrinis lecti fuerint, ut potius et Nelei incuria et mala Apellicontis fide corrupti exstiterint. Hinc necessarii erant commentarii, quibus *Andrantes* quidam inclaruit, difficilia exponere in Theophrasto sibi sumens (*Athen. 15, 4.*).

Otio etiam et opulentiae magistrorum tribuendum est, quod herbarum et radicum investigationem contemptam tradiderint vel indoctis hominibus,



Φαρμακοπώλαις aut ἐξοτόμοις, qui, diducta, ut *Celsus* refert, medicina in tres partes, a medicis et bonarum artium magistris separabantur. Empirici autem schola sibi sola eum vindicat honorem, ἐξιστομίαν iterum ab indigno liberasse contemptu, ac de re herbaria doctrinam alacri studio agitasse.

Quamlibet omnium propemodum sectarum scholae Alexandriae floruerint, eodem regum patrocinio fruentes, peripatetica tamen alias fere omnes antecellunt, ut et celeberrimi Lycei adieclae eo confluerint.

PHANIAS Eresius, Theophrasto fere tempore aequalis, quum ipsum Aristotelem audiisset (*Athen.* 2, 12.) libros reliquit περὶ Φυτῶν (*id.* 2, 14.), e quibus locum summe memorabilem *Athenaeus* servavit (2, 20.). Dari enim Phantias docuit, plantas, ut filices, fungos et tubera, quae τῇ σπερματικῇ κορυνήσει καὶ σπερματώσει careant. Doctissimo *Leseburio* (*Le banquet d'Athènes* p. 234.), qui antheras κορυνήσει et pollen σπερματώσει intelligi arbitratur, adfentiri nequeo. Germen enim, quod in Citris cum ἡλανάτη Theophrastus comparat, cum κορυνή illa componitur et σπερματώσει facultatem significat semina producendi. Alium locum Phaniae *Athenaeus* (3, 8.) male intellexisse videtur: loquitur enim de κέδρω spinis armata, unde ad Citrum id transferri debere grammaticus existimat, quum κέδρος ipsa (*Juniperus Oxycedrus*)

omnino folia acuta spinosa habeat. Idem Phnias primus videtur, qui σταφυλίου nomen pro Dauco Carota usurpaverit (*Athen.* 9, 2.); licet, qui eum exceperunt, Pastinacam etiam ita nominaverint.

DIOCLEs Carystius, secundus aetate famaque ab Hippocrate (*Plin.* 26, 2. *Galen. dissect. matr.* 213.) ἐκδοτομὸν conscripsit (*Schol. Nicandr. ther.* v. 647. *Athen.* 2, 13.). Experientiae soli in determinandis herbarum facultatibus confusus (*Galen. fac. alim.* 1, 303.) phaseolos δολιχῶν nomine bene cognovit (*ib.* 317.) Hippomarathrum foliis longissimis, seminibus Coriandri distinxit (*Plin.* 20, 23.), quod *Cachrys Merisani* esse videtur.

DIPHILUS Siphnius, qui sub Lyfimacho Alexandri successore vixerit (*Athen.* 2, 11.) temporis ordine sequitur. De alimentorum facultatibus scripsit, medicus *Athenaeo* dictus (2, 12.) Poëma fecit, e quo plura grammaticus Naucratis loca adducit (2, 14. 27.). Maxime memorabilis est differentia, quam inter fungos edules et noxios stabilivit: illos esse teneros, graciles et maxime friabiles, hos autem lividos et duros, elixosque aquam piceo colore tingere (*Athen.* 2, 19.). Primus Diphilus asparagos edules memoravit, quos ἄσπερον vocavit, postea ἀσφάρεωγεν καίμυθς dictum (2, 22.). Primus persica mala, τὰ περιστά

κοκκύμηλα memoravit (3, 7.). Castaneas appellavit καρδιάνους βαλάνας (2, 13.). Ceraforum etiam meminit, quae Theophrasto iam innotuerant (2, 11.). Staphylinum idem descripsit (9, 2.).

CLEARCHUS Peripateticus, in commentariis de re herbaria, fructus *Pruni infiticiae* descripsit βραβύλων et κοκκυμηλῶν nomine (*Athen.* 2, 10.).

ASCLEPIADES Myrleanus, Alexandriae florens, *Prunum Chamaecerasum*, quae in Bithynia provenit, memoravit (*Athen.* 2, 11.).

EUTHYDEMUS Atheniensis in libro de oleribus melonem vocavit σικύαν Ἰνδικήν, quod tam iam semina ex India adferrentur (*Athen.* 2, 18.).

OLON Smyrnaeus, de re herbaria et de victus ratione scripsit (*Plin.* 20, 20. 21. *Galen. compos. med. sec. loca*, 3, 202.).

APOLLONIUS Memphites, Stratonis Berytii discipulus (*Galen. diff. puls.* 4, p. 54.) περὶ βοτάνων scripsit (*Schol. Nicandr. ther.* v. 559.).

EPICURUM de herbis scripsisse *Diogenes Laërtius* testatur (10, 27.).

---

Singulare dein studium reges, Pergamenus ultimus, *Attalus* Philometor et *Mithridates* Eupator in herbarum cultura et experimentis circa earum facultates collocarunt. Ille in horto coluit venenatas plantas, *Hyoscyamum*, *Aconitum*, *Co-*

num, Helleborum, quarum virtutes et noxas studiose investigavit, antidotis simul exhibitis (*Plutarch. Demetr.* 897. *Galen. antid.* 1, 425.). Iisdem experimentis inclaruit Mithridates, cui uni excogitatum dicitur, quotidie venenum bibere, praesumptis remediis, ut consuetudine ipsa innoxium fieret (*Plin.* 25, 2. *Appian. bell. Mithridat.* 248 f.). Commentarios, quos doctissimus sua aetate et maximus regum reliquerat, in victoris Pompeii manus venerunt (*Plutarch. Pomp.* 639.). Eius auctoritatem regiam habet planta Eupatoria *Plinio* (25, 6.), nobis Agrimonia dicta. Iidem inscripsit *Cratevas* rhizotomus aliam plantam *Mithridatiam*, cui folia duo a radice acantho similia, caulis vero inter utraque sustinens roseum florem (*Plin. ib.*). Quam *Anguillara* (*semplici*, p. 174.) in agro Foroiulienſi viderat, *Caesalpinus* (*de plant.* 10, 18.) Erythronium Dentem Canis esse docuit. Primum id certe exemplum praemii, quod Linnaeus tanti aestimavit, ut unicum id et immortale praedicaret. Nostriſ etiam temporibus cum Commerſonio Schreberus regis illius nomen plantae satis singulari, ad Dorſteniam accedenti, quam Tambouriffam Sonneratus appellaverat, dederunt.

Et horum regum exemplo et empiricae scholae dominio *ἐμπειρική* et rei herbaria studium magis incensum fuit.

CRATEVAS, Rhizotomus fere celeberrimus, huius aevi omnino est. Inter praeclaros rei herbariae auctores ab *Epiphanio* (*haeres.* 1, p. 3.) relatus, a *Dioscoride* (*praef.*) laudatus, quod ἀκριβοστάτως plantas descripserit, taxatur tamen a *Plinio*, quod pinxerit effigies plantarum, quae vero fallaces fuerint, et coloribus tam numerosis, praesertim in aemulatione naturae, degenerasse transcribentium variam sortem (25, 2.). Ipse etiam *Dioscorides* (3, 140.), Cratevam, quae ab aliis audierit, de plantis referre, perhibet.

Eius operis, quod ῥιζοτομουμένων nomine a variis scriptoribus citatur (*Schol. Nicandr. ther.* v. 529. *Epiphan. haer.* 1. p. 3.) codex exstat etiamnum in bibliotheca Veneta, ubi Aloysius *Anguillara* eo usus fuit (*El. libr. de' semplici. Vineg.* 1561. 8.). Doctissimus *Carolus Weigelius* transcripsit, dum Venetiis degeret, eum codicem, mecumque fragmenta nonnulla communicavit, e quibus liquet, recte *Dioscoridem* de eo iudicare, quod ἀπαρασχημάτους plurimas liquerit herbas. Praeter nomen enim et usum nil descriptionis adest.

In nominibus ipsis satis facilis fuisse videtur. Φλόμον enim nomine, quo antiqui Verbascum appellaverant, insignivit umbellatarum genus, forte *Athamantam*, ilque duas adsignavit species, alteram foeniculi, coriandri folio alteram (*Schol. Nicandr. ther.* v. 856.). *Bryoniam* a quibusdam

σταφύλιον, ab aliis ἀμπέλιν ἀγρίαν, ab aliis autem χειρώνειον appellari (*ib. v. 858.*). Περισταρεῶνα ἢ περιστεροσίτην herbam, quae nostra est Verbena officinalis, primus fere dixit (*ib. v. 860.*) Dorycnium dixit Halicacabum (*Convolvulus Dorycnium*) (*Diosc. 4, 75.*); quam egregie delineavit *Alpin. exot. 73.* Helenium aegyptium descripsit, quod *Teucrium* videtur *creticum* (*Diosc. 1, 28.*). *Sium angustifolium* primus fere nominavit (*Diosc. 2, 154.*). *Lunariam annuam* nomine θάλασσιως ἐτέραν, ὃ καὶ σήνηπι περσικόν, descripsit (*Diosc. 2, 186.*). *Sideritidem* *Heracleam* dixit, quae nostrum forte est *Phellandrium Mutellina* (*Diosc. 4, 35.*). *Baccharim* *Dioscoridis* (*Gnaphalium sanguineum*) sub nomine ἀσάρου (*Anguillara p. 27.*); Αἰγύπτρον (*Theocrit. id. 4, 25.*) nominat, quam *Anguillara* doctissimus (*p. 145.*) credit esse *Ononidem antiquorum*.

Θαρηπίδιον descripsit ἐπὶ λίθων καὶ ὀστράκων παρὰ θάλασσαν φυόμενον θριδακώδη ἰσχνόν καυλὸν ἔχον, quod *Anguillara p. 171.* ubique per *Sclavoniam* reperisse testatur. Fueritne id *Fucus Palmetta* *Gmelin.* vel *alatus*?

Ἴκπομανές, de quo iam *Theocrit. (id. 2, 48.)* dicit, Φυντὸν εἶναι παρ' Ἀγκάσι, *Crataevus* ita exposuit, ut ad *Daturam Metel* consilium transferre possis (*Anguillara p. 233. 234.*).

Cum eodem iungendus *NICANDER Colopho-*

nus, Damnaei filius, Apollinis Didymaei sacerdos, qui Georgica sua Attalo tertio Philometori dicavit (*Suid. v. Νίκανδρος. Cic. de orat. 1, 16.*). In eo poemate Buniada primus dixit, quae alias γόγγυλος (*Brassica Napobrassica*) appellata fuerat (*Athen. 2, 19.*) primus Φιστιάκια (*pistacias*) συριακά introduxit (*Athen. 14, 17.*) de staphylino (*pastinaca*) egit (*Athen. 9, 2.*) et de fungis letiferis (*ib. 2, 11.*). Aliud poema, *νικάνθου* nomine, etiam periit (*Schol. Nicandr. ther. v. 585.*).

Quae supersunt, *θηριακῶν* et *ἀλεξιφαρμάκων* nomine ad nos venerunt. Venena et antidota, tum animalia tum vegetabilia in iis tractantur, hexametris difficilibus et non satis concinnis, dictione aspera et dorica praesertim dialecto, qua imitatus esse Antimachum quemdam dicitur (*Schol. Nicandr. ther. v. 3.*).

Editio *ἀλεξιφαρμάκων* optima est, quam *Schneiderus* Halae 1792. curavit, scholiis et commentario doctissimo ditatam. Theriaca et Alexipharmaca simul prodierunt, *Soteris* cura Coloniae 1530. 4. cum scholiis, absque iis, studio *Bandini* Florent. 1564. 5.

Scholia continent insignem notitiarum literariorum copiam, ipsae vero plantae male plerumque illustrantur. Sic (*alex. v. 405.*) Smyrnum cum Ferula communi comparant: alio loco (*ther. v. 311.*) Ericae folia tribuuntur hederacea.

Plantae, quae occurrunt, tum antiquae sunt, quas repetere superfluum esset, tum primum a nostro nominatae, in quibus parum subsistere licet.

*Valerianam celticam* L. *tuberosam* primus nomine Νάξου θυλακίτιδος (alexiph. 403.) proferre videtur. Epitheton enim, quo ab indica discriminatur, id docet.

*Anchusa italica* (ἀγγουσα θριδακνής, ther. 2. 838.).

*Oenothera orientalis* (λίπαψος ὀρμηνός, ib. 840.).

*Verbascum* forte *Lychnitis* (θρυαλλίς ἱερυθής, ib. 896.).

? *Convolvulus Dorycnium* (δορύκνιον, alex. 376.).

Sed de lacteo fucco nil nobis innotescit. Cf. Schulze *toxicol. vet.* p. 20. Invenit in Apulia *Anguillara* p. 270.

*Coriandrum testiculatum* (κόριον δυσαλθές, ib. 157.). Cf. Schulze p. 31.

*Echium rubrum* (ἐχθρίον, ther. 65. 637.).

? *Chironia Centaurium* (χείρωνος ῥίζα, ther. 500.).

*Campanula Rapunculus* (ῥινος, ib. 647.). Cf. *Column. phytob.* p. 83. t. 23.

*Tordylium officinale*. (ὄρδειον, ib. 841.).

*Caucalis orientalis* (καύκαλις, ib. 843.).

*Daphne oleaeifolia* (χαμαιλία αειθαλής, alex. 48.).

*Colechicum autumnale* (ἐφήμερον, ib. 849.).



*Polygonum divaricatum* (πουλύγονον, ib. 264.).

*Ruta graveolens* (ρύση, ib. 306.).

? *Oxalis Acetosella* (όξάλλις, ther. 840.).

*Cotyledon Umbilicus* (κοτυληδών, ib. 680.).

*Euphorbia* ? *Paralias* (μήκων-θυλακίς, ib. 850.).

*Aconitum Napellus*. De eo narrat (alex. 36.), quod mures soleant radicem circumlambere, quod confirmatur a *Pallasio* (nov. spicil. glir. p. 219.).

*Asiuga Chamaepitys* (χαμαιπίτυς, alex. 65.).

*Origanum Onites* (όνιτις όρειή, ib. 56.).

*Melissa Nepeta* (πολύκνημον, ib. 57.).

*Melissa cretica* (ύδρηλη καλάμινθος, ther. 60.).

*Melissa officinalis* (μελισσορόβος, ib. 677.).

*Thymus Tragoriganum* (τραγορέγανος, alex. 310.).

? *Thymus Zygis* f. *Satureia graeca* (κονίλη, ther. 626.), άγρωρέγανον idem vult *Diosc.* (3, 34.).

*Ononis antiquorum* (όνωνις πολύγωνος, ther. 872.).

*Trifolium creticum* (μελισσωτος, ther. 896.).

*Doronicum scorpioides* (σκορπιόεις, alex. 145.).

*Pistacia vera* (πιστάκια, theriaco. 891.) primo fere nostro dicta inter Graecos, quae repetuntur ab *Athenaeo* (14, 649.) mutante in Φιστάκια: a *Damogeronte* vero (*Geopon.* 10, 12.) in ψιττάκια. Hic etiam primus in Terebinthum inferi docet. Cf. omnino *Niclas ad Geopon.* L c.

HERACLIDES Tarentinus, celeberrimus auctor, inter primarios rei herbariae scriptores laudatus *Dioscoridi* et *Epiphanio* et *Galen*o, Mantiae discipulus, Empiricus, huius temporis est. Primus nomine ὕλης ἰατρικῆς uberrimum opus de re medicamentaria conscripsit, aliud συμποσίου nomine (*Athen.* 3, 33.), sed descriptionem plantarum omnino omisisse *Dioscoridi* dicitur.

PETROMIYS. ἐν ὕλησιν laudatur ab *Erotiano* (*expos.* 260.) et ab *Epiphanio* (*haeref.* 1. p. 3.).

ANDREAS medicus dictus cum *Cratæa* curatius botanicam partem materiae medicae exposuisse fertur (*Diosc. praef.*). Νάρθηκα nominat opus *Schol. Nicandr. ther.* 684. Alienus videtur ab *Andrea Chrysari* filio, qui nomina babylonica, arabica et chaldaica introduxit ac superstitiones pueriles (*Galen. fac. simpl.* 6, 68. *expos.* 484.). Orchidem Merionem dixit *Serapiada*, ob multiplicem bulbi usum (*Diosc.* 3', 142.). *Carduum* parviflorum κλεσιον dixit, ob auxilium adversus varices (*Diosc.* 4, 119.).

IOLAUS Bithynius, iidem *Epiphanio* dictus et scholiasti *Nicandri* (*ther.* 683.) descriptionem tamen plantarum mancā dedit (*Diosc. praef.*).

ANTONIUS ἐξότομος (*Galen. compos. med. sec. loc.* 3, 184.). Fuitne idem *Antonius Cous* cuius ἀλυσσον (*Marrubium Alysson*) *Galenus* (*antid.* 2, 11.) citat? Cf. *Dodon. p.* 88.

**ASCLEPIODORUS** Alexandrinus, magna industria et vulgares et rarissimas conquiſiuit plantas (*Suid. voc. Ἀσκληπιόδωρος*).

**DALION**, herbarius (*Plin. 20, 17.*).

**DIONYSIUS** Uticensis, ἐξοτομικὰ scripsit (*Schol. Nicandr. ther. 520.*). Pinxit etiam herbas, Cratevae more (*Plin. 25, 2.*). Transtulit *Magonis* Carthagenensis libros de re rustica in graecam linguam, Sextilio Praetori dicatos (*Varro de re rust. 1, 1.*). Hi libri γεωργικῶν nomine citantur ab *Athenaeo* (14, p. 648.).

**PAMPHILUS**, grammaticus potius fuisse videtur: commentatus est in *Nicandri* ophiaca (*Suid. v. Παμφ.*) *Athenaeo* saepius dictus (2, 12. 3, 7.). Inter scriptores tamen rei herbariae citatur ab *Epiphanio*, icones herbarum dedisse *Suidas* testatur. Superstitiosus idem forte μυγματοπώλης, qui nec somno quidem viderit plantas, quas descripserit (*Galen. fac. simpl. 6, 68. comp. med. sec. loc. 7, 266.*), e quo *Geoponica* multa habent excerpta, de δαμασκηνοῖς prunis (10, 39.) deque modo, quo femina, in disitis regiones amandanda, terrae immittuntur, ut prius germinet (10, 86.).

**TRYPHONIS** historia plantarum ab *Athenaeo* (3, 5.) citatur.

**MNESITHEUS** Cyzicenus (*Oribas. coll. 4, 4.*), περὶ ἰδιστῶν scripsit (*Athen. 2, 16.*). Confudit

tamen *τίφην* et *ἀλύραν* (*Secale et Speltam*) (*Galen. fac. alim.* 1, 312.).

AMERIAS Macedo in *ἐκζοτομικῇ* laudatus ab *Athenaeo* (15, 8.).

IULIUS BASSUS Tylius, *Epiphanio* dictus.

GLAUCIAS Empiricus, de herbis edulibus scripsisse videtur (*Athen.* 2, 28.). *Plinio* dicitur (20, 23.) circa carduos diligentissimus.

ICESIUS, scholae Erasistrateorum restitutae antistes (*Strabo* 12, 869.) non parvae auctoritatis medicus (*Plin.* 27, 4.) *περὶ ὕλης lateinῆς* scripsit (*Athen.* 15, 8.).

MENODORUS, ipsius amicus (*Athen.* 2, 18.). Idem forte cum *Metrodoro*, qui *ἐκτρομὴν τῶν ἐκζοτομουμένων* edidit (*Plin.* 20, 20.) pictis simul effigiebus plantarum (*id.* 25, 2.).

SEXTIUS NIGER. *Epiphanio* laudatus, *περὶ ὕλης* scripsit (*Erotian.* 244.), e quo quidem libro multa transcripsit *Dioscorides Phacas* (*Galen. expos.* 402.). Vitio ipsi vertit *Dioscorides*, quod vulgares licet plantas non male delineaverit, confuderit tamen rariores, atque alias pro aliis venditaverit.

In eundem errorem lapsi sunt alii Alexandrini, qui cum naturam ignorarent, folisque grammaticis argutiis insudarent, pessima inde orta fuit confusio. NIGERATUM quemdam et DIODOTUM nominant *Dioscorides*, *Plinius* et *Epiphanius*, qui

## 134 LIB. II. CAP. III. RES HERBARIA

eodem modo erraverint. Petronius Diodotus *διολογούμενα* scripſiſſe dicitur (*Plin.* 20, 8.).

Id vel maxime elucet ex *Athenaei* Naucratis lectione, qui nec ipſas patriae plantas vulgares unquam vidit, omnia e libris ſumſit, quos nonnunquam male intellexit. Namque Theophrasti locum de *Φύκους* genere ita pervertit ut fungum putet (2, 19.). Confundit Corylum Avellanam cum *Διὸς βάλανος* (2, 13.). Sub nomine Connari deſcribit Zizyphum Iuiubam (14, 17.). Primam tamen mentionem facit Philadelphi coronarii ex *Apollodoro* (15, 8.). *Cosmosandalum* putaverim *Cypripedium Calceolum* (15, 10.), quod iam intellexit *Conr. Geſnerus* (*epiſt.* 3, f. 96 b.)... *Echinopoda* (3, 8.) habeo *Geniſtam luſitanicam* vel *Spartium horridum* (*Alpin. exot.* p. 14.). Eius meminit etiam *Plutarchus* (*ſympoſ.* 1, 4, p. 621.).

### CAP. III.

## RES HERBARIA SUB ROMANO- RUM IMPERIO.

Quum Roma Graeciae potita eſſet, accepit a Graecis victis literarum diſciplinās, maxime vero eloquentiae et hiftoriae patriae ſtudium agitari coepit, quippe quod ipſis reipublicae negotiis foveretur. Alias autem diſciplinās nec eo ardore nec

nova plane ac sua ratione coluerunt: in iis fere substituerunt, quae a Graecis acceperant: neque aliquid, ut cum *Strabone* (3, 257.) loquar, addiderunt. Ubi itaque Graeci lacunas reliquerunt, a Romanis resarcinatio earum haud expectanda: omnes denique voces artium Graecam originem agnoscunt.

Historiae naturali hactenus duntaxat operam dederunt, quatenus ad vitae victusque commoda pertinet. Varii scriptores collegerunt aut interpretati sunt, quae Graeci reliquerant, sed de suis pauca aut nulla addiderunt. Quod *Dionysius* Halicarnassensis (2, 91.) de mythologia refert, multo maiore fuisse superstitione repletam apud Romanos, quam apud Graecos, id valet etiam de historia naturali.

Optimus ille *Marcus Cato*, cuius auctoritati, ut cum *Plinio* loquar, censura ac triumphus minime conferunt, tanto plus in ipso erat (29, 1.); exemplo *Curii*, herois frugalissimi incitatus, luxu semet abdicavit, praedium ipse coluit et filiis instituendis et vitibus arboribusque plantandis vitam fore consumpsit (*Plutarch. Cato*, 340 f.). De re rustica, quam tantopere amavit, reliquit commentarium, etiamnum superstitem, et cura *Schneideri*, eruditissimi et optimi viri, pereleganter editum.

Quanquam vulgo notissimum sit eius odium erga Graecos philosophos, quod tantum fuit, ut

filium a Graecis literis revocaverit, vaticinatus, quum disciplinis Graecis imbuti fuerint Romani, imperium orbis terrarum amissuros esse, ut omnem etiam philosophiam Graecanicam ludibrio ex ambitione habuerit (*Plutarch. Cato*, 560. *Plin.* 7, 36.); haud tamen plane alienus ab eruditione fuit Graecorum. Ipse enim, quum quondam Athenis degeret, orationem Graecam ad populum habuit: scripta ipsius e Graecis auctoribus plura continent: ac e Thucydida Demostheneque hausit decus orationis et lepores (*Plutarch. l. c.* 343.).

Communi sui aevi confessione optimus agricola ac sine aemulo (*Plin.* 14, 4.); fundo suburbano arbutum maxime convenire iudicavit. *Pira* primum *volema* (*Martyn. ad Virg. georg.* 2, 88.), *Aniciana*, *sementina*, *tarentina*, *mustea* et *curbitina*: *Mala struthea* et *cotonia* (*Pyrus Cydonia* varr.), *Quiriniana*, *Scantiana*, *conditiva* et *punica*: *oleas orchites* (*Martyn. ad Virg. georg.* 2, 86.) et *forba* (*Cato*, c. 7.): *vites Aminaeas* (*Voss. ad Virg. georg.* 2, 97.) *Margentinas*, *Apicias*, *Lucanas*, *helvolas* et *geminas Euganeas* (c. 6.): *ficus Mariscas*, *Africanas*, *Herculanas*, *Saguntinas*, *hibernas* et *Tellinas atras* recehset. In horto coronamenti omne genus et bulborum, myrtos, laurum Delphicam et Cypricam, nûces calvas (*Inglandes*, *Praenestinas* et *avellanas*) co-  
luit (c. 8.). *Salice Graeca* (quae forte *babyloni-*

ca) vites vincivît (c. 41.). Veratrum nigrum circa vites plantavit (c. 116.). Brassicae genera tria, levem nimirum latifoliam magnoque caule; crispam apiacoon (selinuntiam) et lenem minutis caulibus teneram et omnium acerrimam cognovit (157.). *Ocinum* pro pabulo, viciam, fabam, foenum Graecum, ervum feruit (37.). Sed sementes exfugere hordeum, foenum Graecum et ervum: stercolare autem lupinum, fabam et viciam docuit (38.).

Institutionis varios modos bene cognovit, ipsamque ablactationem, quae vitibus semet contingentibus fiebat (41.). In aulas etiam, aut in qualos pertusos vel calyces (*vasa fictilia*) plantavit ramulos, ut propagarentur arbores fructiferae (52.).

Sequitur Catonem Marcus Terent. VARRO, qui sub magno Pompeio contra Mithridatem prima meruit stipendia, ubi corona navaii decoratus fuit (*Plin.* 7, 30.). Dein Pompeii copiis in Hispania legatus praefuit (*Cic. ad Dolab.* 9, 13, *Caes. bell. civ.* 1, 38.). Tandem cum Caesare consuetudine iunctus curam comparandorum et digerendorum librorum, quos Caesar eongererat, suscepit (*Suet. Caes.* 44.). Bene meritis miles in otio literario delituit, donec fundus eius Casinas ab Antonio diriperetur (*Cic. philip.* 2, 40.). Quo facto Tullianum migravit, ubi plus quam octoginta annos saetus decessit.

Libros *de re rustica*, qui supersunt, a Schnei-



*δαρο τῶν πάλιν* editos, anno conscripsit octogesimo, ut, ipse testatur, „sarcinas collecturus, priusquam „proficisceretur e vita.“ Tum ex omni Graecarum literarum disciplina, tum e sua ipsius experientia regulas collegit, quas sequi debeat, qui agro hortoque colendo, fundoque rite administrando, operam dat.

Inter pabula refert etiam ocimum, quod viride secandum fit antequam generet filiquas (1, 31.): dein ervillam (1, 32.) cannabim, spartum (1, 23.). Roseta concidit radicitus in virgulas palmares, ut viviradix fiat (1, 35.). Ablaqueationem bene ita describit: Est altera species ex arbore in arborem inferendi nuper animadversa in arboribus propinquis. Ex arbore, e qua quis vult habere furculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit et in eius ramo praeciso ac diffisso implicat (1, 40.). Medicam et Cytisum ferit pro pabulo; illa Medicago fativa, haec arborea (1, 42. 43.). Taxandus itaque *Sicklerus* (*Geschichte der Obstz.* 320.) qui Citrus Medicam subintelligit. Nimis subtilem arbitror *Anguillaram*, qui (p. 83.) quod statura non tam alta sit, quam faciunt Graeci, dubitat eandem esse Cytisum cum Medicagine arborea. At continuo demessa pabulo, haud eam staturam adipisci potuit. Cerasum, quam Graeci iam cognoverant, primus noster e Romanis memorat: brumalibus diebus feri (1, 39.). Ea arbor a Lucullo

post Mithridaticam victoriam triumpho Romam primum advecta fuit (*Plin.* 15, 25.).

DIOPHANES Bithynus, Iulio Caesari aequalis, interpretationem graecam librorum Magonis, auctore Dionysio Uticensi, in sex librorum epitomen redegit (*Colum.* 1, 1.) et Deiotaro regi misit (*Varro* 1, 1.). Ex ea epitome multa servarunt Geoponici: inter ea mirabilia plura de insitione ficuum in platanos, mororum in castaneas, esculos, malos, terebinthos, pyros, ulmos et populum albam, unde mora fieri alba (*Geop.* 10, 76.).

VIRGILIUS.

Immortalis poeta, Publius VIRGILIUS Maro, Mantuanus, inter rei herbariae scriptores omnino recensendus est. „Tantus enim amor florum“ fuit, ut innumeris fere locis, maxime Georgicorum, eas praedicet. Quum agraria largitione celebri patrimonium suum Andinum perdidisset, Neapolin tendit, ubi rusticari in campis phlegraeis aut liborinis (*Plin.* 18, 11.) et summa poemata canere perrexit. In gratiam Maecenatis receptus, ab Augusto Imp. magni aestimatus, Romam tamen semper vitavit, donec tandem, Aeneide confecta, Graeciam tenderet, ut divinum opus per otium expoliret. Brundisii tamen decessit aetatis anno 52. Iuxta viam ad Puteolos tumulus est, lauro et Polypodii vulgaris varietate viterbiensi obumbratus.

*Martynii* et *Vossii* eruditione illustrata elegantissima poemata insignem continent copiam plantarum; quae tamen ulteriori etiamnum indigent examine. Experiamur, quid conferri et nostra opera possit ad explicandas iuventutis nostrae pariter ac virilis aetatis delicias.

In *Amomo* Virgilii, quod manifeste (*georg.* 4. 25.) *assyrium* vocat, exponendo desudarunt tot tantique viri, ut dissuadeatur fere quivis novus conatus. Et plurimas quidem difficultates gignit *Dioscoridis* descriptio (1, 14.) qui fruticem esse bryoniae foliis et leucoli floribus, crescere autem tum in Armenia tum in Media tradit. Quod *Plinius* fere (12, 13.) repetit. Possemus quidem cum *Salmasio* (*exerc. Plin.* 284.) autumare, ἀμύμον esse saepius aroma quodvis sincerum et incorruptum. Hoc vero casu certa quaedam ac determinata planta intelligi videtur. Longissima certe abfuit a veritate *Euric. Cordus*, qui (*botanol.* p. 19.), *Amomum* idem cum *Anastatica* credit hierochuntica, defensus a filio *Valerio* (*in Diosc.* 1, 14.) quod folia conspici in ficcata planta nequeant. Refutarunt hanc opinionem iure suo *Amatus Lusitanus* (*in Diosc.* 1, 14.) et *Ant. Musa Brasavolus* (*exam. simpl.* p. 156.). Ad veritatem vero proxime accedere *Andr. Caesalpinus* pluribus videtur, qui *Piper Cubebam*, quod *Garcias* ab *Orto* (*arom. hist.* 1, 23.) primus descripserit, pro *Amomo* veterum habet (*Caesalp.*

de *plant.* 2, 23.): At ea species Piperis nec in Armenia, nec in Media crescit, nec faciem eam habet, quam Amomo Dioscorides tribuit. Ad primum respondet L. Bauhinus (*hist.* 2, 197.), plures fructus et plantas indicas a veteribus nominatas fuisse ab emporiis, e quibus proxime eas habuerint. Siquidem multis aliis exemplis constat, Armeniam et Pontum delata fuisse aromata indica, unde denique Romam transvecta fuerint. Nec a Busbequii (*legat. turc.* 1, p. 34.) inde temporibus quisquam in Armenia similem Amomo plantam invenire potuit. Quod faciem Piperis Cubebae a descriptione Dioscoridis plane alienam attinet (nam illud folia cordata integra et flores omnino nullos habet) Io. Bauhinus sentit, Dioscoridem nunquam vidisse plantam, sed peregrinatorum fide hanc dedisse descriptionem. Adiungam verba Aloyfi Anguillarae, e rarissimo libello: *semplici (Vineg.* 1561. 8.) p. 34. „Oggi nel regno di Benin ed a „Manicongo si trova una forte di Pepe, laquale i „Portughesi chiamano Pimenta del Rabo . . l'istesso si trova anco in Soria ed è chiamato Pepe savatico. E questo un sottofrutice con foglie di vite et fiori in grapi di color bianco, che dopo il „loro disflorire lasciano alcuni grani grandi come „un granello di veschia di sapore acutissimo.“ Casior Durantes (*herbar.* p. 24.) pingit quidem Amomum, sed forte ex imaginatione, quae Atriplicis

potius species est. Tandem *Pluknetus* (mant. p. 27.) *Arbusculam bacciferam circumplicatilem* huc trahit, quae *Cissus* est *vitiginea*. Eam autem verum sistere *Amomum*, Arabes secuturus deinde evincam.

*Ligustrum vulgare* (ecl. 2, 18.).

*Fraxinus Ornus* (Rigida ornus, ecl. 6, 71. sterilis, Georg. 2, 111. Antiqua summis in montibus, aen. 2, 626.).

*Valeriana celtica* (baocar, ecl. 4, 20.).

*Valeriana Saltunca*, Allion. pedem. t. 70. f. 1. est *Saltunca humilis*, ecl. 5, 17. Accedit ea proxime quidem ad Val. celticam, sed differt foliis cuneiformibus tridentatis, quae integerrima obtusa in V. celtica sunt, floribusque subcapitatis, qui racemosi in V. celtica sunt. Crescit copiose in Apennino monte: Cf. Plin. 21, 7.

*Gladiolus communis* est *Hyacinthus* Virgilii, suave rubens ecl. 3, 63. ferrugineus, georg. 4, 183. Ob nectarostigmati lineas AI, Aiacis nomen legabant veteres in flore: unde exponendi versus:

„Dic, quibus in terris inscripti nomina regum  
„ nascantur flores.“ (ecl. 3, 100.)

*Martynus* (georg. p. 1432.) male *Lilium Martagon* huc trahit. Cf. *Theocrit. id.* 10, 28. et schol. Plin. 21, 11. *Anguillara* p. 154 l. Optimus *Sibthorpius fl. graec.* t. 38. varietatem habet, quam

*Gl. triphyllum* dicit, elegantissimo nectarostigmate conspicuam.

*Crocus sativus*, autumnis florens, ob stigmatum colorem, *rubens* dicitur *georg.* 4, 182.

*Lolium temulentum* (*infelix*, *ecl.* 5, 37.).

*Avena sterilis* (*ib.*).

*Cornus mascula* (*bello bona*, *georg.* 2, 447.).

*Cerinthe maior* (*ignobile gramen*, apibus tamen gratum, *georg.* 4, 63.).

*Zizyphus Paliurus* (*ecl.* 5, 40.).

*Zizyphus Lotus*; *Diospyros Lotus*: (Genus haud unum, *georg.* 2, 84.) *Lotus* vero *corniculata*, ovibus grata, *georg.* 3, 394.

*Ferula communis*. (*Silvanus florentes ferulas quassans*, *ecl.* 10, 25.).

*Cicuta virosa*. (*Fistula septem compacta cicutis*, *ecl.* 2, 36. 10, 85.). E fistulosis caulibus possunt tibiae confici.

*Bubon gummiiferum*. (*Galbanum*, *georg.* 3, 415. 4, 264.).

*Apium graveolens*. (*Virides apio ripae*, *georg.* 4, 121. *amarum*, *ecl.* 6, 68.).

*Anethum graveolens* (*bene olens*, *ecl.* 2, 48.).

*Hedera Helix* (*modo pallens*, *ecl.* 3, 39. 4, 124. iam nigra dicta 2, 258. Solet enim quandoque folia habere nervis albis pallentia.).

*Viburnum Lantana* (*lentum*, *ecl.* 1, 25.).

*Tamarix gallica* (*myrica*, *ecl.* 4, 2.).

*Sambucus Ekulus* (ecl. 10, 27.).

*Narcissus poëticus* (purpurens, ecl. 5, 38.).

*Narcissus ferotinus* (sera comans, georg. 4, 122.).

*Lilium candidum*. (Silvanus grandia lilia quasians, ecl. 10, 25.).

*Daphne Cneorum*. (Casia, ecl. 2, 29. viridis, georg. 4, 30. humilis apibus grata, georg. 2, 213. Cf. Martyn. ad h. l. *Anguillara* p. 31.).

*Diospyros Ebenum*. (Sola India nigrum fert Ebenum, georg. 2, 116.). Distinxerunt quidem aethiopicum, quod africanum putarunt, ab indico: sed *Herodotus* (3, 97.) manifesto aethiopicum Indiae ipsi tribuit.

*Amyris Kataf* (Turifera arbor, georg. 2, 139. Solis est turea virga Sabaeis, georg. 2, 117.).

*Arbutus Unedo* (depulsis hoedis dulcis, ecl. 3, 82.).

*Rosa damascena* (Paesti bis florens, georg. 4, 119.).

*Papaver somniferum* (vescum, quod terram emaciat, georg. 1, 212.; lethaeum, georg. 1, 78. 4, 545.).

*Tilia europaea* (pinguis, apibus grata, georg. 4, 183. 144.).

*Aconitum Napellus* (georg. 2, 152.)

*Reseda Luteola* (croceum lutum, ecl. 4, 44.).

*Delphinium Aiacis* (vaccinia nigra, ecl. 2, 18. mollia, ecl. 2, 50.).

*Ranunculus hirsutus* Ait. *Philonotis* Retz. (Sardoa herba, ecl. 7, 42.). *Diosc.* 2, 206. *Xvovδίστρογον* dicit alijs speciebus. Vidisse se hanc plantam in Etruria ad flumen, quod e Carrara venit, iuxta Venzam, testatur optimus *Anguillara* p. 178.

*Satureia capitata* (Thymus hyblaeus, ecl. 7, 37. Cecropius, georg. 4, 270.).

*Satureia Thymbra* (Thymbra graviter spirans, georg. 4, 31.).

*Thymus Serpyllum* (Serpylla late olentia, georg. 4, 30.).

*Thymus vulgaris* (apibus gratus, ecl. 5, 77.).

*Origanum Dictamnus* (aen. 1, 412.

„Dictamnus genitrix Cretaeae carpit ab Ida,

„puberibus caulem foliis et flore corantem

„purpureo, non illa feris incognita capris

„gramina, cum tergo volucres haesere sagittae.“)

*Melissa officinalis* (Melisphyllum, georg. 4, 63.).

*Verbena officinalis* (ecl. 8, 65.).

*Acanthus mollis* (ecl. 3, 45. georg. 4, 122.).

Xystos hortorum eo decorare consueverunt Romani, quod et ex *Plin. iun. epist.* 5, 6: patet, ubi *Acanthus mollis* in plano et, paene dixerim, *liquidus* dein *lubricus* et *flexuosus* vocatur.



*Cheiranthus incanus* (pallens viola, ecl. 2, 46.  
Cf. Martyn. ad bucol. p. 66.).

*Althaea officinalis* (hibiscus viridis, ecl. 2, 30.  
gracili hibisco fiscellam texere, ecl. 10, 71. Cau-  
lium fibrae, cannabina methodo separatae, fila prae-  
bent mollia, subtilia, fortia, candida, quae rite  
parata materiem praebent textoribus perutilem Ca-  
van. disj. 2, p. 94.).

*Bombax gossypium* f. *Gossypium arboreum*  
(nemora aethiopum molli canentia lana, georg. 2,  
120.).

*Spartium iunceum* (Genistae lentae, georg. 2,  
12.).

*Lupinus albus* (tristis, georg. 1, 75.).

*Ervum Ervilia* (ecl. 3, 100.).

*Medicago arborea* (Cytisus apibus et capris  
grata, ecl. 10, 50.).

*Citrus medica* (Hesperidum mala, ecl. 6, 68.

„Media fert tristes succos tardumque saporem

„felicio mali . . . . .

„Ipse ingens arbor, faciem simillima lauro etc.“

(georg. 2, 126.).

*Cichorium Endivia* (Intubum potis gaudet ri-  
vis, georg. 4, 120.)

*Cichorium Intybus* (Amaris intuba fibris, ge-  
org. 1, 120.)

*Aster Amellus*, georg. 4, 271:

„Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello  
„fecere agricolae, facilis quaerentibus herba: etc.“

Cf. Martyn. ad h. l. p. 450. ubi delineavit.

*Centaurea Centaurium* (centauria graveolentia, georg. 4, 270.). Cf. Clus. hist. 2. p. 10.  
Succus radicis croceus graveolens.

*Calendula officinalis* (caltha luteola, ecl. 2, 50.).

*Arum Colocasia*, ecl. 4, 20.

*Carex acuta*, georg. 3, 231. Conf. Martyn. ad h. l. p. 328 f.

*Typha latifolia* (ulva palustris, georg. 3, 175. ecl. 8, 87.).

*Pinus Pineae* (pinus in hortis, ecl. 7, 65.).

*Pinus Piceae* (abies in montibus altis, ecl. 7, 68. Voss. ad h. l.

*Quercus Ilex* (arguta, ecl. 7, 1.).

*Quercus Robur* (Esculus, georg. 2, 15. Cf. Martyn. ad h. l.).

*Acaëa vera* Willd. (semper frondens acanthus, georg. 2, 119.).

*Cupressus sempervirens* (cyparissus idaea, georg. 2, 84. aen. 3, 680.).

*Salicem capream Anguillara* p. 86. credit esse Siler Virgilii, georg. 2, 12. licet Plin. 24, 10. semina medicamentum praebere perhibeat, unde Caesalpinus (plant. 2, 50.) Evonymum europaeum divinat.

*Salix vitellina* (lenta salix, *ecl.* 5, 16.) flores apibus grati, *ecl.* 1, 55.

*Salix argentea*, (glauca, *georg.* 4, 183.).

*Rufus aculeatus* (horridus, *ecl.* 7, 43.).

*Phucagrostis maior* Caulin. (alga vilis proiecta, *ecl.* -, 4.).

*Populus alba*. (Herculeae coronae umbrosa arbor, *georg.* 2, 66. Alcidae gratissima, *ecl.* 7, 61.).

*Pistacia Terebinthus* (*aen.* 10, 631.).

Poëtae ceteroquin ignoscendum, si nec generis nec speciei veram informationem habet. Infitionem enim et in alienis generibus succedere arbitrantur: prunum lapidosi cornis (*georg.* 2, 32.) mala platanis, pira ornisi, quercum ulmis inferi (*georg.* 2, 70.).

#### C O L U M E L L A.

Non multo post Virgilium, quem maximi facit, Tiberii aetate, quod ipse (*de re rust.* 11, 3.) testari videtur, L. Iunius Moderatus COLUMELLA vixit, Gaditanus, in Baetica saltem provincia, a patruo Marco Columella, diligentissimo agricola et doctissimo educatus (2, 16. 5, 5.). Ipse usu longo et experientia doctus, assidua etiam praestantissimorum auctorum lectione instructus, itinera multa suscepit, ut Ciliciam viderit et Syriam (2, 10.): prudens vir et a praeiudiciis sui aevi alienus, qui ipse contra astrologos scripsit (11, 1.).

In libris 12 de re rustica a *Schneidero* nostro optime editis, insitionis rationem primus egregie exponit. Omnem enim furculum posse omni arbori inferi, cui cortice et fructu similis sit (3, 11.). Liber decimus continet poemata de plantis hortensibus, intellectu fere difficilius, quam Nicandri versus. Nihilominus et hic plura mihi clarius videre videor.

Inter plantas oleraceas et calinares recenset primus fere *Sifer*, quod *Daucus* certe *Carota* est.

*Pastinacam* fativam eodem nomine, ut etiam *Staphylini*.

*Chaerophyllum* quod *Scandix Cerefolium*.

*Panax*: *Laserpitium Chironium*.

*Olus atrum*: *Smyrni* species saepius iam dicta.

*Apium graveolens*.

*Affyria radix*, quae forte *Slum Sifarum*.

*Beta pede candida*: vulgaris.

*Atriplex hortensis*.

*Hyacinthi* nivei et coerulei, qui sine dubio alieni a Virgilianis, videntur ad nostrum *Hyacinthum* orientalem referri debere.

*Allii sativi* varietatem habet *Ulpicam*, quam et punicum dicit et ἀφροσνόροdon: praeterea *Porrum* sativum et capitatum et *Cepam ascalonicam*.

*Asparagi hortensis*, quem rustici vocent *Corrudam*, cultum uberius indicat, ut et *Capparidis*,

quam culturam omnem respuere Graeci autumaverant.

*Satureiam hortensem* distinguit a *Cunila transmarina*, quae *Sat. capitata* est. *Mentham sylvestrem* pariter ac Graeci, in M. sativam transire arbitratur.

*Erucae* (Brassica Eruca) *Nasturtium* (Lepidium latifolium) *Lepidium* (sativum) *Sinapi* (nigram forte) *Rapas* et *Napos* et *Raphanos* optime cognoscit.

Primus, quod sciam pruna *armeniaca* nominat 10, 404. 2, 15.

Inter legumina *Phasellum* (*Phaseolum vulgarem* 2, 10.) *Cytisum* (*Medicaginem arboream* 5, 12.) *Genistam* (*Spartium iunceum* 4, 31.), Lupinos et Fabas aliaque in vulgus nota habet.

*Inula* eius I. *Helenium* esse videtur.

*Cynara Scolymus* egregie describitur libr. 10:

„Haec modo purpureo surgit glomerata corymbo,  
 „myrtilo modo crine virescens flexa collo  
 „nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit,  
 „nunc similis calatho spinisque minantibus horret,  
 „pallida nonnunquam tortos imitatur acanthos.“

*Humulus*ne noster *Lupulus* intelligatur sequentibus versibus, ignoro:

„Quaeque tuas audax imitatur Nyctis viteis,  
 „nec metuit sentes, nam vepribus improba surgens  
 „schrados indomitasque bryonias adligat ulmos.“

## DIOSCORIDES. COLUMELLA. 151

*Ulmi atinia* gallicae nomine praedicatur *Carpinus Betulus*, cuius folia bubus iucundiora foliis ulmi campestris sint (5, 6.).

*Rumputinum* vocat (5, 7.) arbuſtum gallicum vitibus ſuſtentandis idoneum, quod repetit *Plinius* (14, 1. 24, 18.). Eſt autem *Acer Opalus* vel *campeſtre*.

*Salix viminalis* et *perticalis* (vitellina) diſtinguantur (4, 31.).

*Cucumeres* (forte *Melones*) ſub terra, ſimo coacervato praecoces fieri, praecociores ſub ſpecularibus, quales Tiberius Caefar per totum annum habuerit. Cucurbita alexandrina Citrullus eſſe videtur (11, 3.).

Inter frumenta denique *adoreum* celebrat (*Triticum Spelta*) *Hordeum hexaſtichon* et *diſtichon* et *Siliginem* (*Secale cereale*). (2, 6. 9.).

\* \* \*

## D I O S C O R I D E S.

Celeberrimus omnium, quotquot exſtant veterum de plantarum hiſtoria et materia medica ſcriptorum, ſingulare etiam ſtudium meretur, ſi de factis rei herbariae fermo eſt. Etenim per ſedecim, et quod excurrit, ſaecula, huic uni fere tanta tributa eſt auctoritas, ut ab eo proficiſcerentur, in eius verba iurarent, quicunque vel rei herbariae operam impenderent, vel medicamentorum cogni-

tionem sibi comparare fluiderent. Ad saeculi decimi septimi usque initium rei herbariae universum studium et academicum et privatum solius fere Dioscoridis verbis comprehensum ac finitum, liberalius tum demum agitari coepit, cum immensa botanices augmenta, peregrinationes per disitas regiones doctae, ac examen curatissimum ipsius naturae manifesto docerent, quam angusti sint limites cognitionis, quae soli huic scriptori, utut doctissimo, fideret.

Pedacium *Dioscoridem* Anazarbeum Neronis certe aetate vixisse, inde patet, quod Areus Aesclepiadeus, cui libros suos dicavit, Licinii f. Lecanii Bassi consulis amicus fuerit (*Galen. comp. med. sec. gen.* 5, p. 293. *Tacit.* 15, 33.). Ipse fatetur stipendia meruisse ac exercitus romanos sequutum fuisse (*praef.*). Graeciam certo, Italiam totam, Asiam minorem, forte et Galliam narbonensem ipse peragravit, plantasque plurimas in iis provinciis collegit. Multo maiorem autem copiam fide aliorum descripsit.

Περὶ ὕλης ἰατρικῆς existant libri, quorum codices manuscripti celeberrimi servantur; 1) Vienne; huic adiunctae sunt icones, quae vero haud praestantes sunt. Earum specimina inseruit *Dodonaeus* stirpium historiae, ut facile videas, veterum plantas inde parum lucis accipere; e. g. *Arctium p.*

149, *Coronopus* p. 109, *Lotus aegyptia* p. 573, *Stoebe* p. 123. Scriptus esse fertur saec. 6. (*Lambec. bibl. caesar. vindob. lib. 2. p. 489. 519 f. Weigel. in Baldingers Journ. 32. p. 10 f.*). Is est, quem Busbequius, orator austriacus Constantino-  
poli ad Matthiolum misit: nomine Cantacuzeni ab hoc citatus. 2) Parisius fervatur codex, a *Salmasio* (*exercit. Plin. p. 254.*) laudatus, saec. 9. scriptus. Adiunctae sunt icones, ac nomina tum arabica, tum coptica, unde in Aegypto scriptus esse efficitur. (Cf. *Millinus in Journ. d'hist. nat. N. 20. p. 281.*). 3) Neapolitanus iam Viennae servatur (*Kollar suppl. ad Lambec. bibl. vindob. p. 33 f.*). Antiquior is primo putatur. Cf. omnino *Weigelius l. c.* 4) Leidae sunt tres.

Editus est hic liber primum ab Aldo Manutio 1499. Venet. et satis vitiose quidem. Repetita fuit haec editio, Venet. 1518, 4. Ianus Cornarus emendatus textum edidit Basil. 1529. 4. Cum interpretatione Marc. Vergilii Colon. 1529. fol. Multo puriorem prioribus textum restituit Iac. Goupylus, editum cum versione Paris. 1549. 8. quem sequutus demum Ian. Anton. Sarracenus plenissimam dedit et castigatissimam editionem Frac. 1598. fol. Hac ultima editione et ego utor: aegerrime autem semper tuli, nullum rei herbariae peritum virum utilissimo huic scriptori operam impendisse.



Numerosissimi exstant, ut studiorum ratio per saecula iussit, in Dioscoridem commentarii, quorum copiosissimus fere *Matthioli* est, aequae fere utilis est *Caesalpini* et Alois. *Anguillarae*. Barthol. *Marantae* etiam, Valerii *Cordii*, Remb. *Dodonaei*, Io. *Manardi* et Fabii *Columnae* auxilio uti debet, qui plantas Dioscoridis explicare satagit. Indicem locupletissimum nominum omnium, quae viri clarissimi introduxerunt, Casp. *Bauhinus* in pinace exhibuit, cuius frater Io. *Bauhinus* incredibili fere industria et studio summo innumeras Dioscoridis plantas exposuit. Minima profecto fides habenda Leon. *Fuchsio*, Amat. *Lufitano*, *Ruellio*, *Tabernaemontano*, *Trago* et *Dalechampsio*, qui, vel quod alieni a rei herbariae essent peritia, vel quod Italiam nunquam perscrutati essent, plerumque fere errant et lectores seducunt. Barthol. *Maranta* nemo uberius, luculentius et disertius explicuit rationes illustrandi et exponendi Dioscoridis.

Italiae, „magnae frugum parenti, magnae virum,“ ea laus tribuenda, quod rei herbariae rudimenta, post literas restitutas, prima posuerit, quod *Matthiolos*, *Caesalpinos*, *Anguillaras*, *Columnas* excitaverit, qui augustae patriae plantas colligerent, collectas cum veteribus compararent, comparatas exponerent. Quodsi ii viri nonnullas plantas Dioscoridis vel penitus silent, vel perperam

explicant, quodsi ipse etiam, qui per quatuor fere lustra in principibus artis meae totus sum, subinde lapsus fuero, vitio id auctori ipsi vertendum, qui non nostro eoque systematico modo plantas describere, sed habitu quodam seu nota aliqua peculiari duntaxat indigitare consuevit.

Quodsi enim ordinem spectes, qui alioquin lucis aliquid foenerare potuisset, nullus fere in Dioscoride est, licet aromaticas arbores et gummiferas alimentaue et cerealia seorsim tractet. Ob nominis saepius adfinitatem plantas alienissimas coniungit, ut Medium et Epimedium, Althaeam cannabinam cum Cannabi, Hippophaestum (Cnicum stellatum) cum Hippophaë, Salsolam Tragum cum Hyperico hircino et Pimpinella Saxifraga (Tragio), Parnassiam cum Tritico etc.

Descriptiones adeo mancae sunt, ut variarum plantarum nomen tantummodo, praetereaue nihil, exstet. Quae fuerit Cinna (4, 32.) gramen in Cilicia noxium, ignoro. Talium plantarum descriptionem tentavit Barthol. *Maranta* (*method. cogn. simpl.* 2, 14.) licet haud ubique felici eventu. Ubique comparat Diosc. habitum, folia, flores cum aliis plantis, nonnunquam satis inepte; sic Elichryso largitur folia Abrotani, Cnici folia habet ἐντετριμένα, Symphyto officinali eadem periodo tribuit καύλον κοῦρον καὶ δασέα. Non raro a vocum significato aberrat, ut nulla ipsi fuisse certa no-

menclatio videatur: sic λάβος non legumen solum, sed quævis fructum, non semel quoque florem ipsum σκιάδιον umbellam, sed et strobilum Origani et capitulum notat. Quod quidem bene *Galenus* animadvertit (*simpl. facult.* 11, p. 144.), vocum significatum Dioscoridem ignorasse, et ipse rogat (*praef.*) *ne τὴν ἐν λόγοις δύναμιν* lector spectet.

Eadem planta nonnunquam vel eodem nomine bis, ut *Bromus*, vel diversis etiam, ut *Lonicera Caprifolium*, occurrit. Errores plurimos, quos incuria produxit, commisisse palam est. Sic e ferulacea arbore euphorbium stillare (3, 96.), Onosmæ echioïdem flore fructuque carere (3, 147.) femina filicum vermiculus esse (3, 121.) perhibet.

Insignis tamen thesaurus plantarum italicarum et graecarum, nonnunquam bene observatarum, accuratam meretur enumerationem.

? *Amomum hirsutum* Lam. Tsjana Kua *Rheed. mal.* 11, t. 8. (κόστος). Tres facit Dioscorides (1, 15.) species, quarum una *arabica* est, levis, alba, odorata; indica altera, crassa, levis, nigra, ferulacea; syriaca tertia buxæa, nigra, graveoleus. Primus animadvertit Ant. Musa *Brassavolus* (*exam. simpl.* 258.) nullam costi speciem recentioribus cognitam esse. Sperat, Alphonsum Ferrariae Ducem verum costum apportari iussurum. At spes eum adeo sefellit, ut et nostræ etiamnum of-

ficinae nullum omnino verum costum possideant; costum dulcem enim, quem venditant, eundem esse cum Canella alba iamdiu comperi. Indicus costus forte est radix *Amomi sylvestris*, quae, etsi atra non sit, tamen obscuri, fusci est coloris et nodosa (*Rumph. amboin.* 6. t. 63.). Quae syriaca sit species, plane ignoro (Cf. *Lam. encycl.* 1, 136.). Zedoariae radicem eandem esse cum Costo, perhibet *Anguillara* p. 34. Cf. *Niclas ad Geopon.* 7, 13. . . ? *Amomum Zedoaria* (καρδάμωμον 1, 5). . . *Anomum Zingiber* (ζγγίβερι 2, 190.). Ex Arabia traglodytica apportabatur.

*Phillyrea latifolia* (Φιλλυρέα 1, 125.). Folia oleae familia sed latiora: fructum cum Lentisco comparat. Cf. *Sibthorp. fl. graeca* t. 2. . . *Rosmarinus officinalis* (λαβαντής 3, 89.). . . *Salvia Horminum* (ὄρμινον 3, 145.). Cf. *Sibthorp. fl. graec.* t. 20. . . *Salvia argentea* (αἰθιωπὶς 4, 105.). Cf. *Sibthorp. fl. graec.* t. 27. . . *Piper nigrum* (πέπερι 2, 189.).

*Valeriana Dioscoridis*, *Sibthorp. fl. graec.* t. 33., foliis omnibus pinnatis, radicalium foliolis ovatis dentato-repandis, radice tuberosa, quam ad Limyrum fluvium Lyciae Hawkins, Sibthorpii comes, invenit: est sine dubio Φού *Diosc.* 1, 10. Namque, nasci in Ponto, Smyrnio Oleri atro familia habere folia, flores ex albo-purpurascens, radicem digiti minoris crassitudine: quae omnia cum

elegantissima Baueri apud Sibthorpium iconē consentiunt. . . *Valeriana celtica* (νάρδος κελτική, 1, 7.). In Liguriae alpibus et Istria provenire. Cf. *Plin.* 12, 12. *Iacqu. coll.* 1, p. 24. . . *Valeriana tuberosa* (νάρδος ὀρεινή ἢ καὶ θυλακίτις 1, 8.). Manifesto corruptum esse textum, *Caesalpinus* (4, 3.) iam divinavit et *Anguillara* (p. 24.) emendare studuit. Optima est correctio, quam *Matthiol.* p. 35. suadet: loco αὐτε δὲ καυλὸν οὐτε καρπὸν αὐτε ἄνθος φέρει legendum οὐτε δὲ καυλὸς οὐτε καρπὸς οὐτε ἄνθος συμφέρει (sed sola radix). Delineavit *Alpinus exot.* 132. Folia eryngio similia perhibentur, at molliora, neque spinosa, dein vero nullum adesse caulem dicitur, adferri autem e Cilicia. Certe Dioscorides plantam nunquam viderat. . . *Crocus sativus* (κρόκος 1, 25.). Optimum esse corycium, tam lycium. . . *Gladiolus communis* (ξίφιον 4, 20.). Cf. *Sibthorp. fl. graec. t.* 37. . . *Iris germanica* (ἴρις 1, 1.). Cf. *Anguillara* p. 17. *Sibthorp. t.* 40. . . *Iris foetidissima* (ξύρις 4, 22.). Cf. *I. Bauhin. hist.* 2, 73. . . *Schoenus mucronatus* (ὀξύσχονος 4, 52.). Gramen marinum cyperoides *I. Bauh. hist.* 2, 498. Cf. *Sibthorp. fl. graec. t.* 43. . . *Schoenus nigricans* (σχοῖνος μέλας ib.). *Scheuchz. agrostogr. t.* 7. f. 12—14. . . *Cladium germanicum* Schrad. *Schoenus Maritimus* L. (ὀλόσχοιμος σαρκωδεστέρα 4, 52.). Cf. *Hofst. gram.* 3. t. 53. . . *Cyperus longus* (κύ-

πειρος 1, 4.). Cf. *Jacqu. coll.* 3, 191. Huc et  
*νάρεδος συριακή* 1, 6. *ζέρενα* dicitur *Pseudo-Democri-*  
*to Geopon.* 12, 6. . . *Andropogon Schoenanthus* (*σχοῖνος εὖσμος* 1, 16.). . . *Andropogon*  
*Nardus* (*νάρεδος Ἰνδική* 1, 6. ni fuerit *Valeriana*  
*Spica Iones* in *act. beng.* 2, 433. Sed dubito,  
quod semper graminis speciem faciunt veteres. . .  
*Phalaris aquatica* (*Φάλαρις* 3, 159.). Qui *Ph.*  
*canariensem*, praeunte *Trago* (2, 669.) cre-  
dunt, negligunt altitudinem bipalmarem non qua-  
drare, neque patria huius graminis eo aevo cogni-  
tam fuisse. . . *Arundo Donax* (*δόναξ* 1, 114.). . .  
*Arundo Calamagrostis* (*καλαμάγρωστις* 4, 31.). . .  
*Avena sterilis* (*αἰγίλωψ* 4, 139.). . . *Avena sa-*  
*tiva* (*βεῦμος* 2, 116. 4, 140.). . . *Triticum*  
*repens* (*ἄγρωστις* 4, 30.). . . *Triticum Zea*  
(*ζεία* 2, 111.). . . *Triticum Spelta* (*όλύρα* 2,  
113.). . . *Lolium perenne* (*Φόινιξ* 4, 43.).

*Globularia Alypum* (*ἄλυπον* 4, 180.). Cf.  
*Actuar. meth. med.* 5, 8. ubi et descriptio. . .  
*Dipsacus fullonum* (*δίψακος* 3, 13.). . . ? *Pe-*  
*naea mucronata*. Ut Dioscoridis (3, 99.) et  
nostris temporibus *Sarcocolla* e Persia advehitur,  
hunc fruticem autem id gummi largiri Linnaeus au-  
tumat. . . *Parietaria officinalis* (*ἐλξίνη* 4, 86.).  
Cf. *Caesalpin.* 4, 38. . . *Sanguisorba officinalis*  
(*σδηρίτις ἐτέρα* 4, 34.). Cf. *Column. ecphraf.* 1,  
37. p. 124. *Hermodorum Listerahum primum*

faïsse, qui hanc plantam detexerit, adfirmat *Anguillara* p. 257. et insulis Archipelagi eam σιδηρί-  
τιδα etiamnum nominari. . . . *Galium Aparthe*  
(ἀπαρίνη 3, 104.). . . *Galium verum* (γάλλιον  
4, 96.). . . *Rubia tinctorum* (ἐρυθρέδανος 3,  
160.). Ravennae, in Caria et Galilaea ferebatur. .  
*Plantago media* (ἀγρόγλωσσον μικρὸν 2, 153.). .  
*Plantago altissima* (ἀγρόγλωσσον μέζον 2, 153.). .  
*Plantago Coronopus* (ὀλέστιον 4, 11.). . . *Plan-*  
*tago Pysyllium* (ψύλλιον 4, 70.). . . *Hypocoum*  
*procumbens* (ὑπήκοον 4, 68. . . *Trapa natans*  
(τρίβολος ἔνυδρος 4, 15.). . . *Potamogeton na-*  
*tans* (ποταμογείτων 4, 101.).

*Heliotropium europaeum* (ἡλιοστρέπιον 4, 193.). .  
*Myosotis scorpioides* (μυωώτις 2, 214.). *Litho-*  
*spermum officinale* (λίθοσπέρμον 3, 158.). . . *Li-*  
*thospermum fruticosum* (ἀγχουσα τρίτη 4, 25.).  
Cf. *Alpin. exot.* t. 68. *Barrel.* 1168. *Galenus*  
(*facult. simpl.* 5, 71.) ὀνόκλειον vocat et aliam,  
quae forte *Anchusa tinctoria* est, ἀλκυβιάδιον. . .  
*Anchusa italica* (ἀγχουσα 4, 23.). . . *Anchusa*  
*tinctoria* (ἀγχουσα ἐτέρη 4, 24.). . . *Symphy-*  
*tum officinale* (σύμφυτον 4, 10.). . . *Cynoglof-*  
*sum officinale* (κυνόγλωσσον 4, 129.). . . *Bu-*  
*rago officinalis* (βούγλωσσον 4, 128.). . . *Ono-*  
*sma echioides* (ὄνοσμα 4, 147.). . . *Echium ita-*  
*licum* var. γ. *Lycophis monspeliaca* *Mortson. hist.*  
284. (λύκοψις 4, 26.). . . *Echium rubrum*

(ἔχιν 4, 27.). Cf. *Caus. hist.* 2, 144. 145. . .  
*Cyclamen hederæfolium* (κυκλάμινος 2, 194.). . .  
*Hottonia palustris* (στρατιώτης χιλιόφυλλος 4, 103.). *Matthiolum* (797.) pessima huc *Phellandrium aquaticum* retulit. In simili errore versatur *Amatus Lusitanus* (446.) et *Maranta* ridet etiam eos, qui aliter sentiant (2, 15. p. 178.). . .  
*Anagallis arvensis* (ἀνάγallis 2, 209.). Phoeniceam habet et coeruleam, alteram putat marem esse, feminam alteram. . . *Plumbago europaea* (τριπόδιον 4, 135.). Cf. *Column. ecphraf.* 161. Qui *Aster Tripodium* arbitrantur (*Matthiol.* et alii) negligunt comparationem foliorum cum *Isatidis* foliis. . . *Convolvulus sepium* (σμίλαξις 4, 145.). Μαλακόνισσος *Pseudo-Democr.* Geopon. 12, 6. . . *Convolvulus Imperati* (κράμβη θαλασσία 2, 148.). Cf. *Rauwolf. it.* p. 54. et *Cassian. Bass. geopon.* 12, 1. . . *Convolvulus Scammonia* (σκαμμωνία 4, 171.). . . *Campanula Medium* (μέδιον 4, 18.). . . *Campanula Erinus* (ἐρινός 4, 29.). Cf. *Caesalpini.* 9. 31. . . *Polemoniūm coeruleum* (πολεμώνιον 4, 8.). . . *Lonicera Caprifolium* (κυκλάμινος ἑστῆα, κισσάνθεμον ἢ κισσόφυλλον 2, 195.). . . *Lonicera Periclymenum* (περικλύμενον 4, 14.). . . *Coris monspeliensis* (κόρις 3, 174.). . . *Verbascum Thapsus* (φλόμος θάλασσα 4, 104.). . . *Verbascum ficutum* (φλόμος ἀγρὸν ib.). . . *Verbascum*



*cum Lychnitis* (τρίτη Φλομὶς, λυχνίτις *ib.*). Reliquae autem sunt verae Phlomidēs. . . *Verbascum ferrugineum* (ἄρκτιον, ἀρκτεῦρος 4, 106.). Non credo esse Celsiam Arcturum, quae multo angustiora Verbasco folia habet: ἄρκτιον autem largiora habere debet. . . *Hyoscyamus reticulatus* (ὕοσκ. οὐ τὰ ἀνθη ὑποπόφυρα φέρει, φύλλα σμίλακι ὅμοια, σπέρμα μέλαν καὶ τοὺς κυτίνους σκληροὺς καὶ ἀπανθώδεις 4, 69.). Cf. *Camerar. hort. p. 77.* . . *Hyoscyamus aureus* (ὕοσκ. οὐ τὰ ἀνθη μηλοειδῆ, φύλλα καὶ λόβοι ἀπαλώτερα, σπέρμα ὑπόξανθον, ὥσπερ ἐρύσιμον *ib.*). . . *Hyoscyamus albus* ὁ τρίτος λιπαρὸς, οὐ τὰ ἀνθη λευκὰ, *ib.*). . . *Phyfalís somnifera* (στέρυχνον ὑπνωτικὸν 4, 73.). *Primus delineavit Alpinus exot. c. 33.* . . *Physalis Alkekengi* (ἀλκικάβος 4, 72.). . . *Solanum nigrum* (στέρυχνος κηπαῖος 4, 71.). *Esse herbam innocentis gustus.* . . *Varietates orientales in Aegypto comeduntur.* . . *Solanum insanum* (στέρυχνος μάνικος 4, 74.). . . *Lycium europaeum* (λύκιον 1, 132.). Cf. *Rauwolf. it. n. 285. Hasselquist. it. 498.* *Berberis creticam* putat esse *Alpinus (exot. c. 11.)*; sed succum ex eadem elici non invenit. . . *Chironia Centaurium* (κενταύριον μικρὸν ἢ λυμναῖον 3, 9.). . . *Cordia Myxa* (περσέα 1, 187.). . . *Zizyphus vulgaris* (ζάμνος 1, 119.). . . *Zizyphus Paliurus* (παλίουρος 1, 121.). . . *Rhamnus infectorius et saxatilis*

(ῥάμνος ἐτέρα λευκοτέρα καὶ τρίτη μελαντέρα 1, 119.). Cf. *Anguillara* p. 54. . . *Cuscuta Epithymum* (ἐπίθυμον 4, 179.). Eadem forte *Poterio spinoso* (στοῖβη f. Φλώ, Φίω) adnascens, *Plinio* (26, 8.) *Hypopheo* appellatur. . . *Viola odorata* (ῖον 4, 122.). . . *Hedera Helix* (κισσός 2, 20.). Tres esse potissimum differentias, albam, nigram, quam *διονύσιον* dicant, et ἑλκμα dictam, candicantibus foliis praeditam. *Tournefortius* (it. 2, 14. 15.) orientalem varietatem fructibus auratis bene descripsit. Nil nisi varietatem esse *Anguillara* (p. 180. 181.) bene animadvertit. . . *Illecebrum Paronychia* (παρωνυχία 4, 54.). . . *Vinca* maior et minor (κληματὶς 4, 7. Sed miror, in Aegypto tantummodo indigenam dici, quum per totam Europam australem proveniat. Cf. *Dodon.* 405. 406. . . *Nerium Oleander* (νήριον 4, 82.). *Rosae lauræ* nomine describit *Apuleius* (*metam.* 4, p. 64.). . . *Periploca angustifolia*, *Billard.* ic. plant. syr. dec. 2. n. 17. (ἀπέκυνον 4, 81.). Canes trucidare expertus est *Anguillara* p. 274. . . *Asclepias Vinetoxicum* (ἀσκληπιάς 3, 106.). . . *Asclepias nigra* (κηραία 3, 134.). Folia Solano nigro similia, flores nigricantes, semina corniculis inclusa, nasci locis petrosis. *Anguillara* (p. 229.) describit plantam huic similem in Apulia inventam. . . *Chenopodium Botrys* (βότρυς 3, 130.). . . *Chenopodium album* (κυννεγάμη 4, 192.). . . *Atri-*

*plex Halimus* (ἄλιμος 1, 120.). Cf. *Anguillara* p. 57. . . *Salsola Tragus* (τράγος 4, 51.). . . *Salsola polyclonos* (ἐμπειρον ἢ φακκοειδές, σίλικόν ἐν ὄρειοις καὶ παράλίοις 4, 181.). *Barrel.* 275. . . *Cressa cretica* (ἀνδύλλις, ἥς τῆ φύλλα φακῶ ἔμοια καὶ μαλακά, κλωνία σπινθαμῆς ὕψος 3, 153.). Cf. *Alpin. exot.* 156. Possiet quidem reduci ad *Arenariam peploidem*, sed haec non spithamea aut do-drantalís est nec fruticosa. . . *Gentiana lutea* (γεντιάνη 3, 3.). . . *Lagoëcia Cumihoides* (κίμινον ἄγριον 3, 69.). *Eryngium planum* (ἑρύγγιον 3, 24.). . . *Bupleurum longifolium* (κακαλία 4, 123.). Media foliá trāsire caulem, flores bryoniæ quadantenus similes esse, in montibus crescere. . . *Bupleurum fruticosum* (σέσελι αἰθιοπικόν 3, 61.).<sup>10</sup> Bene describit, ut invenessit prope Massiliam, *Anguillara* p. 212. . . *Tordylium officinale* (σέσελι κρητικόν 3, 63.). . . *Caucalis orientalis* (καύκαλις 2, 169.). *Bellon.* 3, 49. . . *Daucus Gingidiium* (γγιδιον 2, 167. Cf. *Plin.* 20, 5. *Galén. fac. simpl.* 6, 166. *Anguillar.* p. 106. . . *Daucus mauritanicus* (σταφυλίνος ἄγριος 3, 59.). In umbellæ centro πορφύρεοὶς τι esse (flores abortivos centrales carnosos). . . *Ammi copticum* (ἄμμι αἰθιοπικόν 3, 70. Cf. *Anguill.* 130. . . ? *Bunium Bulbocastanum* (βούνον 4, 124.). Sed de tubere nulla fit mentio: forte *Peucedanum Silaus*? . . *Bunium aromaticum*

(ψευδοβούνιον, θάμνον σπιθαμιαῖον ἐν Κρήτῃ 4, 125.). . . *Conium maculatum* (κώνισον 4, 79.).  
Corruptum textum arbitratur *Anguillara* p. 273.  
et χοριάνδρου loco γάρθηκος Φύλλα legendum esse. . . *Selinum Oreoselinum* (έρεοσέλινον 3, 76.).  
Sed caulis tantum modo σπιθαμιαῖος dicitur. Credit *Anguillara* (p. 123.) Scandicem Cerefolium esse, sed id σκάνδυξ est. . . *Athamanta cretensis* (δαῦκος κρητικὸς 3, 83. . . *Athamanta Matthioli* (μέον, τὸ καλούμενον ἀθαμαντικὸν 1, 3.). Cf. *Matthioli*. 25. . . *Peucedanum officinale* (πενκέδανον 3, 92.). . . *Crithmum maritimum* (κρίθμον 2, 157.). . . *Cachrys Libanotis* (λιβανωτὶς πρώτη, ἧς τὰ Φύλλα μαράθρου ὅμοια, τὸ δὲ σπέρμα σφονδυλίου 3, 87.). . . *Cachrys Morisoni* (ἱππομάραθρον, σπέρμα κάγχρυι ὅμοιον, 3, 82.). Description apud *Anguillaram* p. 124. (*Finocchio salvatico*). . . *Ferula communis* (νάρθηξ 3, 91.). . . *Ferula tingitana* (σίλφιον λιβυκὸν 3, 94.). . . *Ferula Asa foetida* (σίλφιον μηδικὸν 3, 94.). . . *Ferula persica* largitur forte σαγαπηνὸν, ὅπὸν πῶας νάρθηκοειδοῦς, γενομένης ἐν Μηδίᾳ (3, 95.). . . *Laserpitium Libanotis* (λιβανωτὶς ἑτέρα 3, 87.). . . *Laserpitium filifolium* (δαῦκος ἕτερος, οὗ τὰ Φύλλα σελίνῳ ἀγρίῳ ὅμοια 3, 83. . . *Laserpitium latifolium* (πάναξ χειρώνιον 3, 57.). Linnæus novam speciem *L. Chironium* fecit, quæ vero eadem esse dicitur ac *L. latifolium*. *Lam. encycl.* 3,

423. . . *Laserpitium hirsutum* (πάναξ Ἀσκληπιὸν 3, 56.). . . *Heracleum Sphondylium* (σφονδύλιον 3, 90.). . . *Heracleum gummiiferum* Willd., hort. berol. 1, t. 53. 54. (ἀργασυλλίς, ἡ τὸ αἰμμωνιακὸν φέρει 3, 98.). . . *Ligusticum Levisticum* (λγυστικὸν 3, 58.). *Imperatoriam Ostruthium* credit Anguill. 211. . . *Ligusticum peloponneseense* (σέσελι πελοποννησιακὸν 3, 62.). . . *Sium angustifolium* (σίον 2, 154.). . . *Stium Sissarum* (ἑλαφοβόσκον 3, 80.). Cf. *Column. phytobaf.* p. 71. . . *Sison Ammi* (σίσιων 3, 64.). . . *Bubon gummiiferum* (μετώπων 1, 71.). . . *Cuminum Cyminum* (κύμινον 3, 68.). Καρναβάδιον dixerunt seriores, ut Florentinus, Geopon. 9, 28. ad quem locum vide Niclas. . . *Oenanthe pimpinellifolia* (οινάνθη 3, 135.). . . *Phellandrium Maseellina* (σιδηρῆς τρίτη, Φύλλα καριάνω ὅμοια, ἐνεγείθη, ἀνθη δὲ φοινικά 4, 35.). *Columna perperam* pro *Sanicula* habet. . . *Coriandrum sativum* (κόριον 3, 71.). . . *Scandix odorata* (μύρξις 4, 116.). Cf. *Column. ecphraf.* 1, 33. p. 112. . . *Scandix Cerefolium* (σκάνδουξ 2, 168.). Mirum, huius oleris Theophrastum non meminisse, quum tamen satis copiose ab Atheniensibus coleretur. Cf. *Aristoph. acharn. act.* 2. sc. 4. ubi Euripidi obicitur, a matre, quae Scandica vendiderit, natum esse. Cf. *Gall. noct. att.* 15, 20. *Plin.* 22, 22. . . *Seseli elatum* (3, 60. σέσελι μασσαλευ-

την). Cf. Gerard, gallopr. 253. Sequens huc trahit C. Bauhin. ad Matth. p. 550. Ipse Matthiolum vero *Daucum Vishagam*. . . *Seseli tortuosum* (ἵππομάραθρον ἕτερον 3, 82.). . . *Thapsia Asclepium* (Θαψία 4, 157.). . . *Pastinaca sativa* (εἰσαρον 2, 159.). Cf. Column. phytob. p. 68. *Anguillaria* p. 112. . . *Pastinaca Oropanax* (ὀποπανάξ 3, 55.). Eademne cum L. Chironio L. ut duae potius plantae, haec nimirum et L. latifolium, sub ea denominatione comprehendantur? . . *Smyrniolum Olus atrum* (ἵπποσελινον 3, 78.). . . *Smyrniolum perfoliatum* (σμύρνον, ὅπερ ἐν Κιλικίᾳ πετροσελινον καλοῦσι, γενόμενον πλεῖστον ἐν τῷ Ἀμανῷ ὄρει. Φύλλα ὅμοια τῷ ἵπποσελίνῳ, ἀλλὰ πλατύτερα, ὑπολίπαρα, ῥωμαλέα 3, 79.). . . *Anethum graveolens* (ἄνηθον 3, 67.). . . *Anethum Foeniculum* (μάραθρον 3, 81.). . . *Carum Carvi* (κάρος 3, 66.). . . *Pimpinella Saxifraga* (τράγιον ἕτερον 4, 50.). Cf. Column. phytob. p. 61. t. 17. *Rauwolfius* it. p. 123. Astragali speciem huc trahit, quam Billardierius (ic. pl. syr. n. 9.) sub nomine *A. emarginati* delineavit. Sed, quae in Libano monte crescit, plantula, Dioscoridi haud adeo nota ac vulgaris esse potuit. . . *Pimpinella dioica* forte est λιβανωτὶς ἄκαρπος 3, 87. Alia saltem est planta ac Theophrasti, Cachrydi Libanotidi similis, sine flore et fructu. . . *Pimpinella Anisum* (ἄννησον 3, 65.). . . *Pimpinella per-*

*agrina* (δάκκος, τρίτος 3, 83.). Cf. *Column. ec-  
phr* 1, 32. p. 109. . . *Asiunt graveolens sativum*  
et sylvestre (σάλλον κηπαῖον καὶ ἐλαίοσάλλον 3, 74.  
75.). . . *Rhus coriaria* (ῥοῦς βυρσοδεψική 1,  
147.). . . *Sambucus nigra* (ἀκτὴ 4, 174.). . .  
*Sambucus Ebulus* (χαμαιάκτη 4, 175.). . . *Ta-  
marix gallica* (μυρική 1, 116.). . . *Parnassia pa-  
lustris* (ἀγρωστὶς ἐν τῷ Πάργασσῳ 4, 32.). *Fo-  
lia hederacea, flos albus,*

*Narcissus Pseudonarcissus et poëticus* (νάρκισ-  
σος, ἄνθος λευκόν, ἔσωθεν δὲ κροκῶδες, ἐπ' ἐνίων δὲ  
πορφυροειδές 4, 161.). . . *Pancratium illyricum*  
vel *Narcissus orientalis* (βολβὸς ἐμετικὸς 2,  
201.). . . *Allium Ampeloprasum* (ἀμπελόπρασσον  
2, 180.). . . *Allium Porrum* (πράσον 2, 179.). . .  
*Allium sativum* (σκόροδον 2, 182.). . . *Allium*  
*arenarium* (ἐφιοσκόροδον ib.), Cf. *Bauhin. hist.* 2,  
599. . . *Allium Scorodoprasum* (σκοροδόπρατον 2,  
183.). . . *Allium Cera* (κρόμμυον 2, 181.). . .  
*Allium nigrum* (μῶλυ 3, 54.). . . *Lilium candi-  
dum* (κρίνον βασιλικόν 3, 116.). . . *Lilium Mar-  
tagon* (ήμεροκαλλὶς 3, 137.). Cf. *Anguillara p.*  
231, . . *Uvularia amplexifolia* (ἰδαία ῥίζα, ἐξυ-  
μυρσίνη τὰ φύλλα ἔοικε, παρ' αὐτὰ δὲ ὡς ἔλακες  
μικραὶ πεφύκασιν, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἄνθος 4, 44.). *Vac-  
cinium Vitim idaeam Columna credit et Anguilla-  
ra* (p. 259.). . . *Erythronium Dens Canis* (σα-  
τύρον ἐρυθρόνιον 3, 144.). . . *Ornithogalum sta-*

*chyoides* (ἐφήμερον 4, 85.). Folia lilii sed angustiora, flores. candidi. Longe aliud certe est ac ἐφήμερον Theophrasti, nec plausibus digni, qui vel *Lyfimachiae* speciem (*C. Bauhin.*) vel *Lilium Martagon* (*Matthiol.*), vel *Convallariam maialem* (*Fuchf.*), vel *Digitalem* etiam (*Column.*), vel *Convallariam verticillatam* (*Caesalp.* 5, 33.) putarunt. Per Europam australem, praesertim in Gallia narbonensi nostra species in nemoribus invenitur, delineata a *Rudbekio* (*camp. elyf.* 2, p. 134, f. 5.). . . *Ornithogalum nutans* (ὄρνιθογάλον 2, 174.). Stamina dilatata campanae more, ut *C. Bauhinus*, vocat alterum florem alteri innatum. . . *Scilla maritima* (σκίλλη 2, 202.). . . *Asphodelus ramosus* (ἀσφόδελος 2, 199.). . . *Anthericum Liliastrum* (φαλάγγιον 3, 122.). Florem Lilii candidi, sed minorem, habet, radicem συνελκομένην, fasciculatam. . . *Convallaria latifolia* (πολυγόνατον 4, 6.). Folia laurinis latiora, pedunculis axillaribus multifloris. Errarunt, qui *C. Polygonatum* dixerunt, quum hoc habeat pedunculos subunifloros; nec *C. multiflora* est, quippe quae magis boreales amat regiones. . . *Hyacinthus orientalis* (ὕακινθος 4, 63.). . . *Hyacinthus ? comosus* quibusdam est βόλβος ἐδάδιμος 2, 200. . . *Aloë perfoliata* (ἀλόη 3, 25.). Folia esse scillae familia, sed crassa spinulosa deflexa, flores albidos, In Stoechadibus insulis copiose provenire. *Quique*



(ἀβένος 1, 129.). . . *Amyris giteādēnsis* (τὸ βαλ-  
σάμου δένδρον ἐν μόνῃ Ἰουδαίᾳ 1, 18.). . . *Amy-  
ris Kafal* Forsk. (τὸ λαβάνου δένδρον 1, 81.). Vid.  
supra floram biblicam. Ex eadem arbore *Canca-  
mum* (1, 23.) sumi, olim (*antiqui bot. p. 87.*)  
demonstravi. Optime eodemque modo turiferam  
arborem *Diodorus* (5, 41.) describit. Distinguit  
*Dioscorides* (1, 83.) *mannam turis* a turē ipso,  
illam esse micas concussu elisas. *Galenus* (*meth.  
med.* 13, 175.) ὑπόσεισμα esse λαβανωτοῦ perhi-  
bet et adstringentem ei tribuit virtutem. . . *Erica  
arbores* (ἐρείκη 1, 117.). . . *Daphne Gnidium*  
(χαμέλαια 4, 172.). . . *Daphne-Cneorum* (δυ-  
μέλαια 4, 173.). . . *Polygonum Hydropiper*  
(ὕδροπέπερι 2, 191.). . . *Polygonum Persicaria*  
(παραπαιόγονον 3, 139.). . . *Polygonum marisi-  
um* (πολύγονον ἄρξεν 4, 4.). . . *Polygonum  
incanum* (πολύγονον θῆλυ 4, 5.). *Ochreae* cilia-  
tae describuntur, Φυλλαρίοις ἐοικυῖαι ἐξοχαί πέντος  
περὶ τοῖς γόνασιν ἐν κύλῳ. . . *Polygonum dume-  
torum* (ἐλξίνη 4, 39.). Huc magis quam ad *Con-  
volvulum arvensem* referenda esse videtur.

*Laurus nobilis* (δάφνη 1, 106.). . . *Laurus  
Cinnamomum* (κιννάμωμον 1, 13.). . . *Laurus  
Cassia* (κασσία 1, 12.). Speciem habet nigro-  
purpureascentem, rosarum odore, medico usui prae-  
sertim commodam, ζγγιεῖ dictam. Ea vox arabi-  
ca est *جذع* *qubor*. *Galen.* (*antidot.* 1, 434.). γέ

ζ. dicit speciem, cinnamomo proximam, quae forte *عصا* e trunco arboris sumta fit. . . *Rheum Rhaponticum* (ζα 3, 2.). Nil nisi radicem describit crassam extus nigricantem, intus subrufescentem, *ῥεῖον*, seu potius *ῥοῖον*. Venire autem e regionibus trans Bosphorum: ubi et *Ammianus Marcellinus* (12, 7.) a fluvio quodam hanc radicem nomen habere perhibet. Qui crediderunt, Centauream esse Rhaponticam (*Dodon.* 389.), patriam non agnoverunt, namque haec in Helvetiae Italiaeque alpibus provenit, neque qualitates habet, quas Dioscorides suae ζα adscribit. *Matthiolus* optime (*comm.* 475 f.) et *Prosp. Alpinus* (*exon.* 2, 4. p. 187. 188.) differentias docuerunt inter hanc radicem et *Rhei barbari*, quod ab Alexandri Tralliani inde temporibus innotuit. Nostram speciem *Scribonius Largus* (167) radicem Ponticam dicit.

*Hyperanthera Moringa* (δένδρον τῆς βαλάνου μυρεψικῆς 4, 160.). Sed cum Tamarice comparat arborem, quod falsum. . . *Anagyris foetida* (ἀνάγυρις 3, 167.). Cf. *Clus. hist.* 1, 93. . . *Ruta graveolens* (πῆγανον 3, 52.). . . *Styrax officinale* (στύραξ 1, 79.). Arborem cum Pyro Cydonia non immerito comparat: optime cresceret in Piscidia montibus, quod et testatur *Strabo* (12, p. 856.) et *Moses Chorenensis* (*geogr. Armen.* p. 353.). . . *Saxifraga Hirculus* (τράγον, ᾧ δολι-

ζεται νάρδος κελτικῇ 1, 7.). Cf. Clus. exot. 1, 33. . .  
*Cotyledon Umbilicus* (κοτυληδών 4, 92.). *Bel-*  
*lon. obs.* 1, 53. . . *Cotyledon serrata* (κοτυλη-  
 δών ἑτέρα 4, 93.). . . *Gypsophila Struthium*  
 (στρούθιον 2, 193.). . . *Gypsophila ?fastigiata*  
 (σύμφυτον πετραῖον 4, 9.). *Sed dubius haereo. . .*  
*Saponaria Ocimoides* (ὠκυμοειδὲς 4, 28.). . . *Tri-*  
*anthema fruticosum* Vahl. (ἀνάκαλις 1, 118.). Fru-  
 tex dicitur aegyptiacus, cuius fructus tamaricis simi-  
 lis. Nullum alium cognosco, qui huc trahi possit.  
*Amatus* quidem *Lusitanus* perperam olim *Ericam*  
*baccantem*, Lusitaniae propriam, alii *Empetrum*  
*nigrum* intellexerunt. . . *Tribulus terrestris* (τέρι-  
 βολος χερσαῖος 4, 15.). . . *Sedum Anacampteros*  
 (τηλέφιον 2, 217.). Vehementer fallitur *Colum-*  
*ba* (εσφρας. 1, 39.) dum *Zygophyllum Faba-*  
*ginem* huc trahit. . . *Sedum Capaea* (καπαῖα 3,  
 168.). . . *Sedum stellatum* (ἀείζωον τέτραν 4,  
 91.). . . *Cerastium aquaticum* f. *Stellaria nemo-*  
*rum* (ἀλσίνη 4, 87.). . . *Agrostemma corona-*  
*ria* (λίχνος 3, 14.).  
*Asarum europaeum* (ἄσπερον 1, 9.). . . *Pe-*  
*ganum Harmala* (πήγανον ἄργεον 3, 53.). Cf.  
*Dodon.* 121. *Bellon.* 3, 50. . . *Lythrum Salica-*  
*ria* (λυσιμαχία 4, 3.). . . *Agrimonia Eupatoria*  
 (εὐπατόριον 4, 41.). . . *Refeda Phyteuma* (φύ-  
 τευμα 4, 130.). *Nescio*, qui factum sit, quod  
*Codonia* (εσφρ. s. 22.) *Scabiolam siculam* huc

trahere potuerit. . . *Reseda alba* (σησάμοειδὲς μέ-  
γα 4, 152.). *Galenus* (*facult. simpl.* 8, 108.)  
ἀντικυρτικὸν ἑλλέβορον vocal. . . *Euphorbia offici-*  
*narum* (δένδρον εὐφορβίου 3, 96.) Sed male id ha-  
bet ναρθηκοειδὲς. . . *Euphorbia Chamaesyce* (χα-  
μαισύκη 4, 170.). Ramos palmares procumben-  
tes, folia lenti similia, fructus sub foliis rotundos  
habet, sed florem nullum. Haec quadrant omni-  
no ad nostram speciem. Cf. *Clus. hist.* 2, 187. . .  
*Euphorbia Peplis* (πεπλὺς 4, 169.). Folia por-  
tulacae, subtus rubentia, fructus in foliorum axil-  
lis. Cf. *Clus. l. c.* et *Scopol. carn. n.* 583. . . *Eu-*  
*phorbia Peplus* (πεπλὺς 4, 168.). Folia non be-  
ne cum rutaceis comparat. Cf. *I. Bauh. hist.* 3,  
670. . . *Euphorbia Lathyris* (λάθυρις 4, 167.).  
Folia cum amygdalinis comparat, fructum esse tri-  
coccum, τρίχωρον. Cf. *Matthiol. p.* 868. . . *Eu-*  
*phorbia Apios* (ἄπιος 4, 177.). Radix pyriformis,  
ramuli exigui, foliis exiguis. Cf. *Clus. hist.* 2, 190.  
*Bellon. obs.* 1, 42. . . *Euphorbia Pityusa* (πιτυ-  
ῶσα 4, 166.). Caulis cubitalis, πολυγόναιος, fo-  
liolis pinguum aemulantibus, flores exigui subpurpu-  
rascentes. Cf. *Morif.* 3. f. 10. t. 1. f. 25. . . *Eu-*  
*phorbia Paralias* (τιθύμαλος παραλίας 4, 165.).  
Folia conferta lini similia, flores albicantes, nasci  
in maritimis. Cf. *Dodon.* 270. . . *Euphorbia he-*  
*lioscopia* (τιθύμαλος ἡλιοσκόπιος 4, 165.). . . *Eu-*  
*phorbia platyphyllos* (τιθύμαλος πλατύφυλλος,

ζεται νάρδος κελτικῇ 1, 7.). Cf. *Clus. exot.* 1, 33. . .  
*Coryledon Umbilicus* (κοτυληδών 4, 92.). *Bel-*  
*lon. obs.* 1, 53. . . *Coryledon ferrata* (κοτυλη-  
 δών ἑτέρα 4, 93.). . . *Gypsophila Struthium*  
 (στρουθίου 2, 193.). . . *Gypsophila ? fastigiata*  
 (σύμφυτον πετραίων 4, 9.). *Sed* dubius haereo. . .  
*Saponaria Ocimoides* (ώκιμοειδὲς 4, 28.). . . *Tri-*  
*anthema fruticosum* Vahl. (ἀνάκαλις 1, 118.). *Fru-*  
*tex* dicitur aegyptiacus, cuius fructus tamaricis simi-  
 lis. Nullum alium cognosco, qui huc trahi possit.  
*Amatus* quidem *Lusitanus* perperam olim *Ericam*  
*baccantem*, Lusitaniae propriam, alii *Empetrum*  
*nigrum* intellexerunt. . . *Tribulus terrestris* (τρι-  
 βολος χερσαῖος 4, 15.). . . *Sedum Anacampteros*  
 (τηλέφιον 2, 217.). Vehementer fallitur *Colum-*  
*na* (*ecphraf.* 1, 39.) dum *Zygophyllum* Fabaginem huc trahit. . . *Sedum Capaea* (κηπαῖα 3,  
 168.). . . *Sedum stellatum* (ἀείζων στέφαν 4,  
 91.). . . *Cerastium aquaticum* l. *Stellaria nemor-*  
*um* (ἀλσίνη 4, 87.). . . *Agrostemma coronaria* (λύχνις 3, 14.).

*Asarum europaeum* (ἄσπερον 1, 9.). . . *Peg-*  
*anum Harmala* (πήγανον ἄγριον 3, 53.). Cf.  
*Dodpn.* 121. *Bellon.* 3, 50. . . *Lythrum Salica-*  
*ria* (λυσιμαχία 4, 3.). . . *Agrimonia Eupatoria*  
 (εὐπατώριον 4, 41.). . . *Reseda Phyteuma* (φύ-  
 τευμα 4, 130.). Nescio, qui factum sit, quod  
*Columna* (*ecphr.* 1, 22.) *Scabiosam* ficulam huc

trahere potuerit. . . *Reseda alba* (σησάμοειδὲς μέγα 4, 152.). *Galenus* (*facult. simpl.* 8, 108.) ἀντικυρτικὸν ἑλλέβορον vocat. . . *Euphorbia officinarum* (δένδρον εὐφορβίου 3, 96.) Sed male id habet γαρθρηκοειδὲς. . . *Euphorbia Chamaesyce* (χαμαισύκη 4, 170.). Ramos palmares procumbentes, folia lenti similia, fructus sub foliis rotundos habet, sed florem nullum. Haec quadrant omnino ad nostram speciem. Cf. *Clus. hist.* 2, 187. . . *Euphorbia Peplis* (πεπλὶς 4, 169.). Folia portulacae, subtus rubentia, fructus in foliorum axillis. Cf. *Clus. l. c.* et *Scopol. carn. n.* 583. . . *Euphorbia Peplus* (πεπλὸς 4, 168.). Folia non bene cum rutaceis comparat. Cf. *I. Bauh. hist.* 3, 670. . . *Euphorbia Lathyris* (λάθυρις 4, 167.). Folia cum amygdalinis comparat, fructum esse triloccum, τριχώρον. Cf. *Matthiol. p.* 868. . . *Euphorbia Apios* (ἄπιος 4, 177.). Radix pyriformis, ramuli exigui, foliis exiguis. Cf. *Clus. hist.* 2, 190. *Bellon. obs.* 1, 42. . . *Euphorbia Pityusa* (πιτυῶσα 4, 166.). Caulis cubitalis, πολυγόνωτος, foliis pinguum aemulantibus, flores exigui subpurpureascentes. Cf. *Morif. 3. f.* 10. *t. 1. f.* 25. . . *Euphorbia Paralias* (τιθύμαλος παράλιος 4, 165.). Folia conferta lini similia, flores albicautes, nasci in maritimis. Cf. *Dodon.* 270. . . *Euphorbia helioscopia* (τιθύμαλος ἡλιοσκοπίος 4, 165.). . . *Euphorbia platyphyllos* (τιθύμαλος πλατύφυλλος,

*ib.*). *Clus. hist.* 2, 190. . . *Euphorbia Cyparissias* (τιθύμαλος κυπαρισσίας, *ib.*). . . *Euphorbia Myrsinites* (τιθύμαλος θήλυσ, *ib.*). *Cf. Clus.* 2, 189. . . *Euphorbia dendroides* (τιθύμαλος ὃ ἐν ταῖς πέτραις Φυόμενος, *ib.*). Hanc speciem per Liguriam et Etruriam invenit *Anguillara p.* 294. *Cf. Lobel. advers.* 150. . . *Euphorbia Characius* (χαρακίας, *ib.*). Nec *E. amygdaloides*, quum frutex sit. *Cf. Clus.* 2, 188. . . *Sempervivum tectorum* (αἰζώων τὸ μέγα 4, 89.). *S. arboreum*, quod in Cephalonia Anastasiae nomine veniat, intelligit *Anguillara p.* 277. . . *Sempervivum sediforme* (αἰζώων τὸ μικρὸν 4, 90.). *Cf. Jacq. hort. vindob.* 1. t. 83. . . *Amygdalus Persica* (τὰ μῆλα περισκόια 1, 164.). . . *Prunus Armeniaca* (τὰ μῆλα ἀρμένιακά, Προμαῖ στί δε πραικόκια 1, 165.). . . *Mespilus Pyracantha* (ὀξύκανθα 1, 122.). . . *Rosa canina* (κυνέσβατον 1, 123.). . . *Rubus fruticosus* (βάτος 4, 37.). . . *Rubus idaeus* (βάτος ἰδαίκα 4, 38.). . . *Tormentilla erecta* (πεντάφυλλον 4, 42.).

*Capparis spinosa* (κάππαρις 2, 204.). . . *Papaver dubium* (μήκων ῥοιὰς 4, 64.). *Vulgo P. Rhoeas* habetur, sed κεφαλή προμήκης obstat. Folia *Origani*, *Brassicae* *Erucae*, *Cichorii* aut *Thymi* similia declarantur, unde inconstantiam auctoris effeceris. . . *Papaver somniferum* (μήκων ἡμερος, κηπευτή 4, 65.). . . *Papaver Rhoeas* (ἡ ἀργία μήκων, ἐγκαθήμενην ἔχων τὴν κωδίαν, ὃ καὶ πιθίτις

καὶ ῥιζὰς ὀνομάζεται, *ib.*). . . *Papaver hybridum*  
 (τρίτη ἀγρωτέρα μήκων καὶ μακροτέρα (μικροτέρα)  
 τούτων, ἔχουσα τὴν κωδίαν ἐπιμήκη, *ib.*). . . *Papaver Argemone* (ἀργημώνη 2, 208.). . . *Glaucium luteum* (χελιδώνιον μέγα 2, 201.). *Tum*  
*ex eo, tum e Glaucio phoeniceo parabatur succus*  
*Glaucii* (3, 100.). Μήκωνα κερατίνην ἢ θαλατ-  
 τὴν vocat *Galenus* (*facult. simpl.* 7, 99.). . .  
*Nymphaea lutea* (νυμφαία ἄλλη 3, 159.). . .  
*Nymphaea alba* (3, 158.). . . *Nymphaea Lotus*  
 (λωτὸς ὁ ἐν αἰγύπτῳ 4, 114.). . . *Cistus ladaniferus*  
 (κίστου εἶδος λῆδον 1, 128.). Cf. *Tournefort. it.* 1, 29. 30. . . *Cistus villosus* (κιστὸς  
 ἄρξην 1, 126.). *Potest et C. incanus esse.* . . *Cistus salvifolius*  
 (κιστὸς θῆλυ, *ib.*). . . *Paeonia officinalis* (γλυκυσιδὴ θήλαια 3, 157.). . .  
*Paeonia corallina* (γλυκυσιδὴ ἄρξην, *ib.*). . . *Delphinium Consolida*  
 (δελφίνιον 3, 84.). . . *Delphinium Aiacis* (δελφίνιον ἕτερον, οἱ δὲ ὑάκινθον, Ῥω-  
 μαῖοι βουκίνους (*vaccinia*) 3, 85.). . . *Delphinium Staphis agria*  
 (σταφίς ἀγρία 4, 156.). *Pedicularia herba Scribon. Larg.* 8. . .  
*Aconitum Lycostonum* (ἀκόνιτον ἕτερον 4, 78.). *Lycostonum*  
*etiam dici, folia habere platani similia, sed multo*  
*magis incisa et coloris obscurioris.* . . *Nigella fa-*  
*tium* (μελάνθιον 3, 95.). . . *Nelumbium speciosum*  
 (κράμος αἰγύπτιος 2, 128.). . . *Anemone hortensis*  
 (ἀνημώνη ἡμερὸς 2, 207.). . . *Anemone*



*apennina* (ἀνημῶνη ἀργία, *ib.*). *Folia latiora et flos purpureus*. . . *Clematis Vitalba* (δαφνοειδές 4, 148.). . . *Clematis Viticella* (κληματῖτις 4, 182.). . . *Thalictrum minus* (θάλικτρον 4, 98.). . . *Ranunculus Ficaria* (χελιδόνιον τὸ μικρὸν 2, 212.). . . *Ranunculus aconitifolius* f. *platanifolius* (βατράχιον τέταρτον, ἄνθος γαλακτίζον 2, 206.). . . *Ranunculus Seguieri* (βατράχιον κορίου φύλλοις, ἄνθος ὑπόλευκον, *ib.*). . . *Ranunculus hirsutus* (βατράχιον χνοωδέστερον, πλειστόν ἐν Σαρδονίᾳ γινόμενον, *ib.*). . . *Ranunculus repens* (βατρ. κορίου φύλλοις, ἄνθος μῆλινον, *ib.*). Vel hic vel *R. sceleratus* est βατράχιον ἢ χρεσάνθεμον *Pseudo-Democrit. in Geopon.* 12, 6. . . *Isopyrum fumarioides* (ισόπυρον 4, 121.). . . *Helleborus orientalis* (ἐλλέβορος μέλας 4, 151.). *Folia platani similia, subaspera, flores purpurascences.* Optimum ex Anticyra et Helicone venire.

*Aiuga Iva* (ἀνθύλλις ἐτέρα, χαμαιπίτυς τὰ φύλλα, δασύτερα δὲ, ἄνθος πορφυροῦν 3, 153.). Cf. *Clus. hist.* 2, 186. Invenit in Creta *Anguil-lara* p. 237. . . *Aiuga Chamaeritys* (χαμαιπίτυς 3, 175.). . . *Teucrium Botrys* (χαμαιπίτυς ἐτέρα, φυλλάρια λεπτὰ λευκὰ, ἀνθήλια μῆλινὰ 3, 176.). . . *Teucrium Pseudo-Chamaeritys* (χαμαιπίτυς ἐτέρα, κλάδους ἔχουσα πηχυαίους ἀγνωροειδείς, ἄνθος λευκὸν 3, 176.). Cf. *Clus. hist.* 2, 185. In Italia, Gallia narbonensi et Hispania non

ταυτά. . . *Teucrium Marum* (μάρον 3, 49.) . .  
*Teucrium Scordium* (σκόρδιον 3, 125.) . . *Teu-*  
*crium Chamaedrys* (χαμαιδρυς 3, 112.) . . *Teu-*  
*crium lucidum* (τεύκριον 4, 111.) *Chamaedryi*  
 simile, foliis exiguis, ciceris similibus. . . *Teu-*  
*crium montanum* (πόλιον ὀρεϊνον 3, 124.) *Gra-*  
*veolens*, canum. . . *Teucrium Polium* (ἕτερον πό-  
 λιον θαμνωδέστερον, οὐχ' οὕτως εὐτονον τῇ ὁσμῇ 3,  
 124. . . *Teucrium creticum* (ἐλένιον αἰγύπτου 1,  
 28.) . . *Teucrium Pseudhyssopus* (ὑσσωπος ὀρει-  
 νὸς 3, 30.). Cf. *Column. ecphraf.* 1, 14. p. 67. . .  
*Satureia graeca* (ἀγριοξέφανον, καλούμενον τῷ Νικ-  
 ἀνδρῶ κονίλῃ 3, 34.) . . *Satureia Thymbra* (θύμ-  
 βρα 3, 45.) . . *Hyssopus officinalis* (ὑσσωπος 3,  
 30.) . . *Verbena officinalis* (περιστερεῶν 4, 60.) . .  
*Verbena supina* (ιερά βοτάνη 4, 61.). Cf. *Clusi-*  
*hist.* 2, 46. . . *Lavandula Stoechas* (στιχὰς 3,  
 31.) . . *Mentha sylvestris* (σισύμβριον 2, 153.).  
 Huius forte varietas distinguitur ἡδυόσμου ἀγρίου  
 nomine 3, 42. . . *Mentha sativa* (ἡδυόσμον ἡμε-  
 ρον, μίνθη 3, 41.) . . *Mentha Pulegium* (γλή-  
 χων 3, 56.) . . *Mentha cervina* (πολύκνημον 3,  
 108.). *Divinavit id unicus Caesalpinus* (11, 37.).  
 . . *Lamium album* (λευκάς 3, 113.). Cf. *Caesalp.*  
 11, 31. . . *Lamium purpureum* (γαλιόψις 4,  
 95.). *Nescio*, qualem plantam hoc nomine de-  
 scribat *Anguillara* p. 278. . . *Betonica officinalis*  
 (κίσστρον 4, 1.). . . *Stachys germanica* (στάχυς

3, 120.). . . *Stachys heraclea* (σιδηρεῖτις, αἱ δὲ ἡράκλειαν καλοῦσιν 4, 33.). . . *Ballota nigra* (βαλ-  
λωτῇ 3, 117.). . . *Marrubium vulgare* (πράσιον  
3, 119.). . . *Marrubium Pseudo - Dictamnus*  
(ψευδοδίκταμνος 3, 38.). *Temere perhibet An-*  
*guillara p. 201. totum hoc capitulum supposititium*  
*esse. . . Leonurus Marrubiaserum* (πυκνοκόμον 4,  
176.). *Cf. Plin. 26, 8. Anguillar. p. 298. . . Phlo-*  
*mis fruticosa et italica* (Φλομίδες διπλαῖ, δασεῖαι,  
περιφρεῖς τῇ γῇ, στερογγύλα ἔχουσαι τὰ φύλλα 4,  
104.). *Cf. Dodon. 146. . . Phlomis Lychnitis*  
(Φλέμος ἀργεία), *ib.*). *Folia Salviae similia, flos*  
*aureus fulgens. . . Clinopodium vulgare* (κλιν-  
πόδιον 3, 109.). . . *Origanum Dictamnus* (δί-  
κταμνος 3, 37.). . . *Origanum creticum* (δίκτα-  
μνος ἕτερος, φύλλοις ἑοικώς σισυμβρίω 3, 39.). . .  
*Origanum heracleoticum* (ὀρίγανος ἡράκλειωτικῇ 3,  
32.). . . *Origanum Onitis* (ὀνῆτις 3, 33.). . . *Ori-*  
*ganum Maioranoides* (σάμψυχον 3, 47.). *In Cy-*  
*zico, Cyprio et Sicilia provenire et laudatissimum*  
*esse. . . Thymus Serpyllum* (ἔρπυλλος 3, 46.). . .  
*Thymus vulgaris* (θυμὸς 3, 44.). . . *Thymus*  
*Zygis* (ἔρπυλλος ἄγριος, ὃς καὶ ζυγίς καλεῖται 3,  
46.). . . *Thymus Acinos* (ἄκινος 3, 50.). . . *Thy-*  
*mus Tragoriganum* (τραγορίγανος 3, 35.). *Op-*  
*time nasci in Co, Chio, Smyrna et Creta. Cf. Al-*  
*pin. exot. c. 56. . . Melissa officinalis* (μελισσό-  
φυλλον 3, 118.). . . *Melissa cretica* (καλαμίνθη

ἐρυνωτέρα, ἔχει Φύλλα ὠκίμῳ ὅμοια, ὑπόλευκα 3, 43.). Cf. *Barrel. ic.* 1166. . . *Melissa Calamintha* (καλαμίνθη τρίτη, ἥς τὰ Φύλλα τῷ ἡδύσμῳ ἀγρίῳ ὅμοια *ib.*). Sed poterit forte ad *Nepetam nudam* traduci: namque *Galenus* (*antidot.* 1, 430.) νάπετον καὶ καλαμίνθην eandem credit. . . *Nepeta Nepetella* (καλαμίνθη, ἥ γλήχωνι ὅμοια *ib.*). Cf. *Anguillara p.* 202. . . *Ocimum Basilicum* (ὠκίμον 2, 171.). . . *Antirrhinum spurium* (ἐλατίνη 4, 40.). *Folia Polygoni dumetorum pilosa*. . . *Antirrhinum purpureum* (ἀντίρρινον 4, 133.). . . *Antirrhinum repens* (ἔσσυρις 143.). Idem est cum *A. mouspeffulano*, ut *Smithius engl. bot.* 1253. evicit. . . *Antirrhinum Asarina* (χαμαίκισσος 4, 126.). *Glechoma hederacea* esse nequit, ob flores pallidos. . . *Orobanche elatior* (ὀροβάνχη 2, 172.). Differentes plantas esse Theophrasti et Dioscoridis, vidit iam *Anguillara* (p. 89.). . . *Vitex Agnus* (ἀγνός 1, 135.). . . *Acanthus mollis* (ἀκανθός ἐν παρθεσίῳ 3, 119.). . . *Acanthus spinosus* (ἀκανθὴ ἀγρία 3, 120.).

*Isatis tinctoria* (ἰσατὶς 2, 215. 216.). . . *Lepidium sativum* (λεπιδίον 2, 205.). . . *Lepidium latifolium* (κάρδαμον 2, 185.). . . *Lepidium Iberis* (ἰβερὶς 1, 188.). Cf. *Damocoratis* descriptionem apud *Gal. compos. med. sec. gen.* 10, 310. *Dodon.* 714. *Anguillara p.* 120. . . *Thlaspi campestre* (θλάσπι 2, 186.). . . *Cochlearia Ar-*

*moracia* (ῥαφανὶς ἀργία 2, 158.). . . *Cochlearia Draba* (δράβη 2, 187.). Cf. *Column. ecphraf.* 1, 109. p. 270. At *Clus. hist.* 2, 125. huc haud pertinet. . . *Coronopus Ruellii* (κορωνόπυς 2, 158.). . . *Alyssum alpestre* (ἀλυσσον 3, 105.). *Columna*, licet sibi in hoc frutice non confiet, vult tamen *Veronicam* esse, in *Φυτοβασάνω* *V. arvensis* p. 21. facit, quum ἀλυσσον tamen *Φρυγάνιον* dicatur, in *ecphrafi* vero p. 288. *V. montanam*. . . *Alyssum sativum* (μύαργον 4, 117.). . . *Sisymbrium Nasturtium* (σισύμβριον ἕτερον, ἡ καρδαμίνη 2, 155.). . . *Erysimum officinale* (ἐρύτιμον 2, 188.). . . *Brassica Eruca* (εὐζωμον 2, 170.). . . *Brassica oleracea sylvestris* (κράμβη ἀργία 2, 147.). . . *Cheiranthus incanus* (λευκόνιον 3, 138.).

*Erodium malacoides* (γεράνιον ἕτερον 3, 131.).  
Potest tamen et *Geranium molle* esse. . . *Geranium tuberosum* (γεράνιον φύλλω ἀνημώνης, ῥίζα ὑποστρεγγύλη γλυκίᾳ ib.). . . *Pistia Stratiotes* (στρατιώτης 4, 102.). Cf. *Alp. aegypt.* i. 108. . .  
*Althaea cannabina* (κάνναβις ἀργία 3, 166.). . .  
*Malva sylvestris* f. *mauritiana* (μαλάχη 2, 144.). . .  
*Malva Alcea* (ἀλκία 3, 164.). . . *Lavatera arborea* (μαλάχη κηπευτή 2, 144.). . . *Lavatera olbia* f. *Malope malacoides* (ἀλθαία 3, 165.).  
Cum utraque non omnino congruit.

*Fumaria officinalis* (καπνὲς 4, 110.). *Haec*

est fel terrae Scribonii Larg. (227.), quam male Rhodius (ad h. l.) pro Chironia Centaurio habet. . . *Polygala amara* (πολύγαλα 4, 142.). . . *Spartium iunceum* (σπάριον 4, 158.). . . *Spartium spinosum* (ἑτέρα ἀκανία ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Πόντῳ 1, 133.). Cf. *Anguillara* p. 65., qui in Corfica invenit, *Matthiol.* p. 172. Huc et alter *Aspalathus* 1, 19. Cf. *Alpin exot.* 12. . . *Genista aspalathoides* (ἀσπάλαθος 1, 19.). Eundem esse cum ligno rhodio, fide Constantini Rhodii, rhizotomi Cretensis, perhibet *Anguillara* (p. 36.). Delineavit *Pona bald.* p. 16. Lignum rhodium alii Convolvulo scopario tribuunt: huius vero patria Teneriffa veteribus, ante Infantem Henricum, ignota fuit. . . *Ononis antiquorum* (ὄνωγς 3, 21.). Cf. *Dodon.* 743. . . *Anthyllis cretica* (τέτῳ ἐβένου εἶδος θαμνωδες, κυτίσω ὅμοιον 1, 129.). Cf. *Ponae bald.* p. 51. . . *Phaseolus vulgaris* (σμίλαξ 2, 176.). . . *Orobus vernus* (ἀσπεράγαλος 4, 62.). Cf. *Column. phytob.* p. 48. t. 14. . . *Lathyrus Aphaca* (ἀφάκη 2, 178.). . . *Lathyrus Clymenum* (κλύμενον 4, 13.). *Column. ecphraf.* 1, 49. p. 155. Scorpiurum vermiculatam habet, nescio, quo demum iure. . . *Ervum Ervilia* (ἔρβορος 2, 131.). . . *Coropilla Securidaca* (ἡδύσαρον 3, 146.). Cf. *Dodon.* 546. . . *Ornithopus compressus* (κατανόκη 4, 154.). Male *Rauwolfius* (it. tab. inter 54 — 60.)

Plantaginem Lagopoda huc refert. . . *Scorpiurus fulcata* (σκορπιουειδής 4, 195.). . . *Hedysarum Onobrychis* (ὀνοβρύχης 3, 170.). . . *Indigofera tinctoria* (τὸ Ἰνδικὸν βαφικὸν 5, 107.). Cf. Beckmann *Gesch. der Erfind.* 4, 475. . . *Astragalus Glaux* (γλαῦξ 4, 141.). Cf. *Clus. hist.* 2, 241. . . *Astragalus sesamoides* (σησαμειδής μικρὸν 4, 155.). . . *Astragalus creticus* (τραγάκανθα 3, 23.). . . *Astragalus pugniformis* (καταγάγκη ἐτέρρα 4, 134.). . . *Astragalus Poterium* (ποτήριον 5, 17.). *Planta spinosa lanuginosa, floribus albis, Tragacanthae similis, radice gummifera.* Nulla alia quam haec species esse potest. Cf. *Lobel. hist.* 492. *Clus. hist.* 1, 108. *Vahl. symb. bot.* 1, 65. . . *Psoralea bituminosa* (τρίφυλλον 3, 123.). Τριφύλλον vocat *Galen.* (*antidot.* 1, 426.) ad Neapolin crescere et vino conservando inservire. *Trifolium italicum* f. *creticum* (μελίλωτος 3, 48.). . . *Trifolium arvense* (λαγώπους 4, 17.). . . *Medicago sativa* (μηδική 2, 177.). . . *Medicago arborea* (κύτισος 4, 113.). . . *Glycyrrhiza glabra* (γλυκυρρίζα 3, 7.). *Plinius* (22, 9.) descriptionem male intellexit. Etenim, cum folia Diosc. cum σχίνω (lentisco) comparet, *Plinius* σχίνω sine dubio legit, echinataque dixit. Male itaque *Gl. echinata* intelligitur, licet haec in Italia proveniat. . . *Lotus corniculatus* (λωτὸς ἡμερος 4, 111.). . . *Lotus rectus* (ἄγριος λιβυκὸς λωτὸς

4, 112.). Sed L. Dioscoridis huc pertinere non videtur, quum et patria Libya et altitudo duos cubitos excedens contradicant. Haec forte *λωτός ἀνδρομήκης* (Diodor. Sicul. 3, 43.), quam Agatharchides in Arabia invenit, quamque cum medica herba et agrostide comparat.

*Hypericum Coris* (ὕπερικόν 3, 171.) κλωνά-  
ρια ὑποδάσέα. . . *Hypericum Androsaemum* (ἄσ-  
κρον 3, 172.). Cf. Column. scphraf. 1, 16. . .  
*Hypericum montanum* (ἀνδρόσαιμν 3, 173.). Cf.  
Column. scphraf. 1, 15. . . *Hypericum hircinum*  
(τράγιον 4, 49.). Conf. *Ponae bald.* p. 31.

*Tragopogon crocifolius* (τραγοπόγων 2, 173.). .  
*Sonchus oleraceus* (σόγκος 2, 159.). . . *Scorzo-  
nera tuberosa* (κονδρίλλης ἕτερον εἶδος 3, 161.).  
Radicem et caulem esse sucoi plenum, ut Diosc. te-  
statur *Rauwolfius* (ἰν. 117.), qui circa Hale-  
pum invenit. . . *Lactuca perennis* (κονδρίλλη 2,  
161.). *Anguillara* p. 109. Caccialepre eam vo-  
cari ait. . . *Lactuca virosa* (θρίδαξ ἀγρία 2, 166.). .  
*Crepis virens* (ιεράκιον μικρόν 3, 73.). . . *Crepis  
biennis* (ιεράκιον μέγα 3, 72.). C. Dioscoridis  
esse nequit, cum caulem asperum et spinulosum ha-  
beat. . . *Lapsana communis* (λαμψάνη 2, 142.). . .  
*Cichorium Intybus* (σέρις ἀγρία θρίδακώδεστέρα 2,  
160.). . . *Cichorium Endivia* (σέρις κηπευτή στενό-  
φυλλος ib.). . . *Arcium Lappa* (ἀρκεῖον 4, 107.). . .  
*Carduus leucographus* (ἄκανθα λευκή 3, 14.).



Describit hoc nomine *Anguillara* p. 143. plantam, quam in Sclavonia et Umbria invenerit, et quae *Carthamus coeruleus* esse videtur. . . *Carduus arabicus* (ἀκανθα ἀραβική 3, 15.). . . *Carduus parviflorus* (κίρσιον 4, 119.). . . *Carduus marianus* (σίλβον 4, 159.). Cf. *Rauwolf. it. n.* 74. *Anguill.* p. 151. . . *Cnicus Casabonae* (λευκάκανθα 3, 22.). Cf. *Schmidel. icon. et anal. t.* 51. . . *Cnicus stellatus* (ἱππόφαιστον 4, 163.). . . *Onopordon Acanthium* (ἀκάνθιον 3, 18.). . . *Carlina acaulis* (χαμαιλέων λευκός 3, 10.). . . *Carthamus lanatus* (ἀτράκτυλις 3, 107.). . . *Stachelina Chamaepeuce* (χαμαιπέυκη 4, 127.). Cf. *Alpin. exot. c.* 35. . . *Chrysocoma Linosyris* (χρυσοκόμεη 4, 55.). Cf. *Caesalp.* 12, 14. *Column. ecphraf.* 1, 20. Mirum, *Anguillaram* (p. 264.) eam non cognovisse. . . *Santolina Chamaecyparissus* (ἀβρότονον θήλυ, θάμνος δένδρσειδής, ὑπόλευκος, φύλλαις λεπτοσχηδέσιν, ὥςπερ σεριφίου περὶ τὰ κλώνια, πλῆρες ἄνθους, ἐπ' ἄκρου ἔχον κορυμβῶδες χρυσοειδές, εὐῶδες μετὰ ποσοῦ βάρους 3, 29.). Cf. *Clus. hist.* 1, 341. *Columna ecphr.* 1, 13. perperam hanc plantam ad πύλλον (3, 124.) traduxit. Cur *Anguillara* p. 166. malit ad Art. Abrotanum relegare, nescio. Quadrant fere omnia. . . *Santolina maritima* (γναφάλλον 3, 132.). . . *Artemisia Abrotanum* (ἀβρότονον ἄρρεν 3, 29.). . . *Artemisia Santonica* (ἀψιγιθίου τρίτον εἶδος, ὃ σαντώνιον

καλοῦσι 3, 28.) σαρδόνιον legit *Anguillara* p. 166. Obstat tamen *Galen.* (*facult. simpl.* 5, 69.), qui non semel tantum σαντόνικον dicit. . . *Artemisia campestris* (ἀρτεμισία λεπτόφυλλος 3, 128.). . . *Artemisia camforata* (ἀρτεμισία μονοκλῶνος εὐωδέστερα 3, 127.). Cf. *I. Bauh. hist.* 3, 194. . . *Artemisia pontica* (ἀρτεμισία λεπτοτέρα ἔχουσα τὰ φύλλα 3, 127.). *Artemisia chamaemelifolia* (ἀρτεμισία πλατυτέρα ἔχουσα τὰ φύλλα *ib.*). . . *Artemisia Aspynthium* (ἀψύνθιον 3, 26.). . . *Artemisia fragrans* (ἀψύνθιον, θαλάσσιον, τινες δὲ καὶ σερίφιον καλοῦσι, ὅπερ πλεῖστον ἐν τῷ περὶ Καππαδοκίαν Ταύρῳ ὄρει γεννᾶται, βαρύοσμος, 3, 27.). Possitne forte et *Artemisia maritima* intelligi, aut *A. taurica* Willd.? *Artemisiam maritimam* vult *Anguillara* p. 165. . . *Gnaphalium sanguineum* (βάκχαρις 3, 51.). Herba fruticosa, suaveolens, coronaria: folia tomentosa latiuscula, caulis cubitalis, flores purpureo-albicantes. Eam speciem invenerunt *Rauwolfius* (*it.* p. 285.) et circa Aleppum *Russelius* (*Alepp.* p. 195.). Male autem interpretati sunt, qui vel Digitalem Thapsi, ut *Lacuna* et *Matthiolum* (p. 558.) vel Inulam Vaillantii ut *Clusius* (*hist.* 2, 21.) vel Salviam Sclaream, ut *Leoniceus* et *Caesalpinus* (11, 37.) vel Baccharidis speciem ut *Linnaeus*, crediderunt. . . *Gnaphalium Stoechas* (ἐλέχρυσον 4, 57.). . . *Gnaphalium Leontopodium* (λεοντοπόδιον 4, 131.).

Sed *Plantaginem creticam* facit *Alpinus exot. c. 51.*, quae esse nequit, quod caules nominantur et planta dicitur *διδακτυλαῖος*, summis quoque caullibus insidere fertur flos. Quae omnia haud quam cum *Plantagine cretica* congruunt. . . *Baccharis Dioscoridis* (κόνυζα μεγάλη 3, 136.). Cf. *Rauwolf. it. p. 54.* . . *Inula spiraeifolia* (κόνυζα μέση ib.). Cf. *Bauhin. hist. 2, 1049.* . . *Inula Pulicaria* (κόνυζα μικρά ib.). *Dozon. 52.* Haec est κόνυζα, quae paludes *Paxamo* indigitat (*Geopon. 2, 4.*) . . *Inula Helenium* (ἰλάνιον 1, 27.). . . *Tussilago Farfara* (βηχίον 3, 126.). . . *Tussilago Petasites* (πετασίτης 4, 108.). . . *Senecio Jacobaea* (ἡεργεῶν 4, 97.). . . *Aster Amellus* (ἀστὴρ ἀπτικὸς 4, 120.). . . *Anthemis Pyrethrum* (πύρεθρον 3, 86.). . . *Anthemis Cota, montana* et *Chrysanthemum monspeliense* ἀνθέμιδος nomine (3, 154.) comprehenduntur, Namque radius modo albus, modo flavus, modo roseus indicatur. . . *Anthemis valentina* (βούφθαλμον 3, 156.). Namque folia foeniculi, flores flavi. . . *Chrysanthemum coronarium* s. *segetum* (χρυσάνθεμον 4, 58.). . . *Achillea Ageratum* (ἀγέρατον 4, 59.). . . *Achillea tomentosa* (ἀχιλλεία, ἄνθος χρυσίζον 4, 36.). . . *Achillea tanacetifolia* (ἀχιλλεία, ἄνθος περφυρὸν ib.). . . *Achillea nobilis* (ἀχιλλεία, ἄνθος λευκὸν ib.). . . *Achillea Ptarmica* (πταρμική 2, 192.). . . *Tagetes patula* (ἐθόν-

va 2, 213.). Cf. *Caesalp.* 12, 43. . . *Centaurea Crocodillium* (προκοδείλιον 3, 12.). Cf. *Anguillara* p. 141., qui e *Cratæva* totum hoc caput sumtum esse testatur. . . *Centaurea* ? *Cyanus* (μήκων ἀφρώδης ἡράκλεια 4, 66. Cf. *Column. phytob.* p. 74. t. 21. Gratiolam credit *Anguillara* p. 268. . . *Brotera corymbosa* (χαμαιλίων μέλας 3, 11.). Cf. *Belon. obs.* 1, 16.

*Orchis pyramidalis* (ὄρχις, κυνόςρχις 3, 141.). . . *Orchis Morio* (ὄρχις ἑτερος, ἐν στεραπιάδα καλοῦσιν 3, 142.). . . *Orchis* ? *bifolia* (σατύριον 3, 143. Qui potuerit *Tulipa suaveolens* f. *praecoce* (*Clus. hist.* 1, 150.) huc trahi, nescio. . . *Serapias Lingua* (λογγίτις 5, 161.). Folia porri similia subrubentia, flores fusci seu ferruginei adspectu referentes πύλιστα, τῷ δὲ τύπῳ προσωπεῖα κωμικὰ κεχηνότα, dependet autem γλωσσάριον λευκὸν, ex hiatu: semen (*capsula*) trigonum lanciforme. Hanc plantam praeter *Caesalpinum optimum* (10, 21.) omnes ignorant. Is autem in montibus Etruriae invenit et sagacissime *Lonchitidem Dioscoridis* esse divinavit. Cf. *Column. ephraf.* 1, 148. t. 322. ubi autem folia nimis angusta sunt. *Bauh. hist.* 2, 766. *Morif.* 3. f. 12. t. 14. f. 21. Irin tuberosam huc trahit praestantissimus *Sibthorpius*, sed ubi est γλωσσάριον λευκὸν ex hiatu corollae? Neque semina sunt ὅμοια λόγγῃ vel in *Serapiade*. . . *Neottia spiralis* (ἐπιπακτίς ἢ ἐλλεβορίνη 4, 109.).

*moschata*. *Caesalpinus* (2, 49.) credit *νάσκαΦ-  
θον* (1, 22.) esse corticem externum huius  
fructus. . . *Ruscus Hypoglossum* (*ἰππόγλωσσον* 4,  
132.). Cf. *Column. ecphraf.* 1, 165. . . *Ruscus  
aculeatus* (*μυρσίνη ἀγρία* 4, 146.). . . *Ruscus  
Hypophyllum* (*δάφνη ἀλεξάνδρεια* 4, 147.). Cf.  
*Column. l. c.* . . . *Ruscus racemosus* (*χαμαιδάφνη*  
4, 149.).

*Equisetum ? sylvaticum* (*ἵππουρις* 4, 46.). Cf.  
*Pseudo-Democr. in Geopon.* 2, 6. . . *Equisetum  
? pratense* (*ἵππουρις ἐτέρα* 4, 47.). . . ? *Marfilea  
quadrifolia* (*ἐπιμήδιον* 4, 19.). Planta aquatica  
sine flore, foliis hederaceis. Certe *Botrychium  
Lunaria* non est, cui adiudicat *Columna* (*phytob.*  
p. 65.). . . *Polypodium vulgare* (*πολυπόδιον* 4,  
188.). . . *Polypodium Filix mas.* (*πτέρις* 4, 186.). . .  
*Polypodium Dryopteris* (*δρυοπτέρις* 4, 189.). . .  
*Aspidium Lonchitis* (*λογχίτις ἐτέρα* 3, 162.). . .  
*Athyrium Filix femina* (*θηλυπτέρις* 4, 187.). . .  
*Asplenium Hemionitis* (*ἡμιονίτις* 3, 152.). . .  
*Asplenium Ceterach* (*ἀσπλῆνον* 3, 151.). . . *As-  
plenium Trichomanes* (*τριχομανές* 4, 137.). . .  
*Scelopendrium officinale* (*φυλλίτις* 3, 121.). . .  
*Adiantum Capillus* (*ἀδίαντον* 4, 136.). Cf. *schol.*  
*Theocrit. id.* 13, 41. . . ? *Marchantia conica* (*λει-  
χήν* 4, 53.). *Column. ecphraf.* i. p. 331. Potest  
tamen quoque ad *Peltideam caninam* reduci. . .

*fera* (κόκκος βαφική 4, 48.). . . *Croton tinctorius* (ήλιοσφόπιον μικρόν 4, 194.). *Primus fera Clusius* (*hist.* 2, 47.) *veram Dioscoridis plantam delineavit*, post eum *Tabernaemontanus* (*herb.* 2, 265.). Sed *Caesalpinius* (11, 12.) et *Matthiolum* p. 894. toto coelo aberrant, dum modo *Myosotidem* modo *Calendulam* huc referunt. . . *Acacia vera* (άκακία 1, 133.). . . *Acacia Catechu* (άκκιον Ἰνδικόν, εκ θάμνου τῆς λεγομένης λογχίτιδος· ἐστὶ δὲ εἶδος άκάνθης 1, 132.). Cf. *Garc. ab Orto hist. arom.*, 10. Meminit eius etiam *Galen. antidot.* 1, 424. . . *Ricinus communis* (κρότων 4, 163.). . . *Momordica Elaterium* (ελατήριον 4, 154.). . . *Bryonia dioica* (άμπελος λευκή 4, 184.). . . *Bryonia alba* (άμπελος μέλαινα 4, 185.). . . *Cucurbita Pepo* (πέπων 2, 164.). . . *Cucumis sativus* (πολοκύνθη 2, 162. . . *Cucumis prophetarum* (κολοκύνθης 4, 178.). . . *Cucumis Melo* (σίκυς 2, 163.).

*Hippophæ rhamnoides* (ιπποφάς 4, 163.). . . *Cannabis sativa* (κάνναβις 3, 165.). . . *Pistacia Terebinthus* (τέρμινθος 1, 91.). . . *Smilax aspera* (σμίλαξ τραχεία 4, 144.). . . *Tamus communis* (άμπελος άγρία 4, 183.). . . *Rhodiola rosea* (ρόδιά ρίζη 4, 45.). . . *Mercurialis annua* (λινωζώστις 4, 191.). . . *Iuniperus Sabina* (βεγ. θύς 1, 104.). . . *Iuniperus Oxycedrus* (κεδρός 1, 105.). . . *Taxus baccata* (σμίλαξ 4, 80.). . . *Myristica*

ric. *Cordus* (botanol. p. 99.) et *Tragus* (810.) *Cuscutam* esse perhibent: cui plura argumenta, praesertim maritimam originem opponit Ant. Musa *Brassavolus*, qui ad litora maris adriatici frequens ἀνδροσακὺς semet invenisse testatur (exam. simpl. p. 63. 64.). Ipsi adfentitur *Amatus Lusitanus* (comm. in Diosc. 376. 482.). Quorum virorum argumentis victus *Madreporam Acetabulum* Linn. esse, fatendum est.

Non desunt plura, quae satis obscura manent, ab ipso auctore non cognita aut male descripta. Exemplo adducam Μαλάβαθρον, quod (1, 11.) aliqui pro nardi indicae folio habeant. Esse autem peculiare quoddam genus folii, quod paludibus innotet, nulla radice fultum. Id collectum, statim filo traiectionem, reconditum servari. Repetit id Plinius (12, 26.), novo addito errore, in Syria nempe gigni id malabathrum. Galenus duobus locis (fac. simpl. 7, 98. 114.) μαλάβαθρον et φύλλον μαλαβάθρου recenset, congruere virtutem cum v. nardi. Mox usus increbuit, φύλλα cum μαλαβάθρῳ eadem putare, quum Plutarchus (Gryll. 990.) dicat νάρδους καὶ φύλλα καὶ καλὰ μους ἀραβικὸς. At vero in Digest. l. 39. tit. 4. de publican. et vectig. l. 16. distinguitur malabathrum a folio barbarico. His aliisque argumentis victus primus fere Anguillara (p. 29.) bene distinxit folium barbaricum, quod idem cum *Pipere Beile*,

Malabathrum autem dici *Tembul*. Idem Tembul vero tanquam Piperis speciem quoque describit. Falli autem et eum *Garcias* (*Clus. exot.* 175 — 177.) perhibet, Malabathrum enim Cassiae lignae (*Laurus Cassiae*) esse folium, *folium* vero κατ' ἐξοχήν esse Betle Indorum. Cf. *Trew. in nov. act. nat. cur. vol. 2. app. p.* 385. Coram habeo etiam iconem *folii*, quod manifesto Lauri Cassiae est, et Betle dicitur, apud *Ramusium* (*viaggi* 1, 363.).

\* \* \*

Praeter hanc in materiam medicam introductionem adfunt alii etiam tractatus *Ἰνδικῶν* etc., ut et *νόθα* dicta, quae ad graecas plantarum voces latinas etiam continent, serioris certo originis, ut a monacho quodam compilata esse videantur.

#### P L I N I U S.

Duumviri hi imperio totum orbem literarium per sedecim et quod excurrit saecula regentes praecipuam merentur in rei herbariae historia attentionem. Plinius enim iisdem fere verbis plerumque, quibus Dioscorides, plantas describens, medio aetate gratior fuit Dioscoride, quod non latine solum scripserat, sed quod superstitiones etiam plures et fabulas admiscuerat. Cum literae restituerentur, necessarium quidem fuit, ab horum duumvirorum



ric. *Cordus* (botanol. p. 99.) et *Tragus* (810.)  
*Cuscutam* esse perhibent: cui plura argumenta,  
 praesertim maritimam originem opponit Ant. Musa  
*Brassavolus*, qui ad litora maris adriatici frequens  
*ανδροειδης* semet invenisse testatur (exam. simpl. p.  
 63. 64). Ipsi assentitur *Amatus Lusitanus* (comm.  
 in Diosc. 3. 6. 482.). Quorum virorum argumen-  
 tis victus *Madreporam Acetabulum* Linn. esse, fa-  
 tendum est.

Non desunt plura, quae satis obscura manent,  
 ab ipso auctore non cognita aut male descripta.  
 Exemplo adducam *Μαλὰβαθρον*, quod (1, 11.)  
 aliqui pro nardi indicae folio habeant. Esse autem  
 peculiare quoddam genus folii, quod paludibus in-  
 natet, nulla radice fultum. Id collectum, statim  
 filo traiectionem, reconditum servari. Repetit id *Pli-*  
*nius* (12, 26.), novo addito errore, in Syria nem-  
 pe gigni id malabathrum. *Galenus* duobus locis  
 (fac. simpl. 7, 98. 114) *μαλὰβαθρον* et *Φύλλα*  
*μαλὰβαθρον* recenset, congruere virtutem cum vi  
 nardi. Mox usus increbuit, *Φύλλα* cum *μαλὰ*  
*βαθρον* eadem putare, quum *Plutarchus* (Gryll.  
 990.) dicat *μαλὰβαθρον καὶ Φύλλα καὶ καλὰμας ἀγα-*  
*θὰς*. At vero in *Digest.* l. 39. tit. 4 de publi-  
 can. et vectig. l. 16. distinguitur malabathrum a  
 folio barbarico. His aliisque argumentis victus pri-  
 mus fere *Anguillara* (p. 29.) bene distinxit fo-  
 lium barbaricum, quod idem cum *Pipere Betle*,

pertiretur. Hac intentione tot volumina peregit, quot fere nemo Romanorum sui temporis.

Ipsi viri clarissimi mortis gloria immortalis proposita est, quod avido naturae studio eam sponte subierit. Fuit enim ingens illud Vesuvii montis incendium anni 79, quum ille classem Miseni imperio praefens regeret, quod ipsum adeo excitavit, ut Pomponianum peteret, prospiciendi causa et proximo, ecquid iam mare admitteret. Ibi fulfuris fumo crassioreque caligine suffocatus statim concidit.

E tanti viri scriptis numerosis ad nos solum pervenit opus *historiae naturalis*, libris 37., quibus ex his mille voluminibus scriptorum romanorum pariter ac graecorum universam naturae varietatem amplecti conatus est. A libro inde duodecimo ad vigesimum usque septimum omnia tractat vegetabilia, plantas, arbores, fruges, gramina totamque rem rusticam.

Optima editio totius operis est *Io. Harduini*, quam tribus voluminibus formae maximae comprehensis, Galliarum regis iussu anno 1723 absolvit. Quindecim codicibus manuscriptis usus esse dicitur. Rarissima autem est et pulcherrima editio *Bellocii Danesi*, Paris. 1532. fol. Bene quoque de Plinio meruit *Dalechampius* in editione Lugdunensi 1587. fol.

Praeter has praestantiores nostri auctoris edi-

tiones commentariorum etiam memorandi sunt, inter quos eminent Claud. *Salmafii* Plinianae exercitationes Ultraï. 1687. fol., omni eae quidem doctrinae genere abundantes, sed et malo in Plinium animo et sine ordine scriptae. Maxime autem vitio vertendum, quod a rei herbariae cognitione fere alienus sibi tamen sumferit de plantis veterum iudicare. Veteres commentatores, *Hermolaus Barbarus*, Nicol. *Leoniceus* alique textum quidem castigarunt, ad fontes Plinianos primi respexerunt, sed rei etiam herbariae non satis experti fuerunt, ut eorum vestigia tuto sequi possimus.

Diu autem iam acriter Plinium perstrinxerunt, quod sine iudicio, ac omnino saepius sine linguae graecae interiore cognitione, undique corraserit, quae curiosa scituque digna ipsi visa fuerint, quod nonnunquam penitus falso aut negligenter saltem interpretatus fuerit Graecos. Id autem perspicere non potuerunt, qui medio aevo coeci eum ducem solum sequebantur. Quae enim reprehendit in maioribus suis, quod notas ipsas herbarum velut vulgares strictim tantum et nominibus indicaverint (27, 8.) id et in ipsum cadit. Licet plures et diffitas quidem Romani imperii provincias viderit, plantas tamen perpaucas solummodo, et vero rariores minime cognovit.

Plurimas quidem fatetur plantas in hortulo Antonii Castoris semet observasse, qui tertius fere post

Theophrastum et Mithridatem regem peculiarem plantis alendis hortum constituit (25, 2.). Neque tamen rari sunt errores gravissimi, e cognitione plantarum manca orti. Confundit e. g. (12, 20.) Cassiam Romanorum (*Daphnen Cneorum*) cum Lauro Cassia: fabam Graecam appellat Celtim australem (16, 50.): oryzae florem tribuit purpureum (18, 7.): Gypsophilae Struthio lanuginosum caulem et spinosum (19, 3., ubi tamen defenditur a Paulo Boccone *mus.* 1, 172.): ligustrum nescit an idem sit cum celebri cyprio, seu Lawsonia inermi (24, 10.): Myriophyllum cum Achillea Millefolio componit (24. 16.): ad gramina numerat, quam *Anguillara* (p. 94.). Sedum esse stellatum docuit. *Macer* s. *Macis* ipsi (12, 8.) cortex radice cuiusdam maguae est.

Graeca sua exemplaria adeo negligenter legit et interpretatus est, ut hippacem Scytharum, quae caleus fuit (*Hippocr. morb.* 4, 508.) plantam crederet (25, 8.); ut *μήκωνος ἀφρώδους* folia, quae Theophrastus Struthii (*Gypsophilae*) aequales habet, speciem passerum (*στενυθάς*) praebere nugaretur (20, 19.); ut in media hederæ descriptione de cisto loquatur, commutatis *κισσῶ* et *κιστῶ* (16, 34.); ut, ubi Theophrastus perhibet, platanos esse raras (*σπανίας*) in Italia, noster interpretetur, alias platanos esse in Italia alias in Hispania (12, 1.); ut, ubi de marrubio (*πρασινῶ*)

Graeci loquuti essent, ipse semper *περάσας* legerit et *porrum* interpretatus fuerit (22, 25. 24, 15. 27, 8.). Taceo plura, quae ipsi obiecta sunt, ut animadvertam, paucis duntaxat plantis valissimum hoc opere locupletatam esse rem herbariam. Quae studio summo investigans tanquam novas, aut Plinio saltem peculiare inveni, hae fere sunt:

*Salvia Verbenaca* una cum *Verbena supina* (25, 9.) tractatur, adeo frequens per totam Europam australem, et mirum fuisset, si Plinius eius non meminisset. . . *Valeriana italica* Lam. est *Nardus cretica* (12, 12.) quam *Galen. compos. medic. sec. loca* 9, 4. etiam citat: sed descriptio Plinii ex *Dioscoride de Phu* desumpta. Cf. *Ponae mont. bald.* p. 49. 50.

*Eriophorum* sine dubio *angustifolium* est arundo ea (19, 1.) e qua vestes conficiantur. . . *Stipa tenacissima*. Sparti usus per Hispaniam Africanamque Carthaginensem uberrime (19, 2.) describitur; ut gramen id ocreatis cruribus textisque manicis, iligneisque conamentis convolvatur, maceretur et ad innumera vitae desideria adhibeatur. Cf. *Fischers Gemälde von Valencia* 1, 164. . . *Panicum miliaceum* et *italicum* (18, 7.) ita distinguuntur, ut illud a paniculis dictum, cacumine languide nutante, paulatim extenuato culmo, paene in furculum praedensis acervetur granis, cum longissima pedali phoba; *mili* vero (pauci italici) co-

mae granum complexae fimbriato capillo curventur. . . *Panicum Dactylon* hoc nomine (24, 17.) alioque loco (25, 8.) *Canariu* appellatur, quod canes eam mandant. Cf. *Lobel. hist.* 12. *Clus. hist.* 2, 217. . . *Panicum verticillatum* est Miliaria (22, 25.). . . *Hordeum murinum* dicitur (27, 9.). Holcus, quae in saxis nascatur ficcis: aristas habere in cacumine, tenui culmo, ob id a quibusdam appellari *aristidam*. Cf. *Anguillara p.* 210. *Lobel. obs.* 18.

*Dipsacus pilosus*, Gallidraga Xenocratis (27, 9.). Eadem est *Virga pastoris*, similis *Acanthae* Nyc. *Myrsine*. (1, 11.). Cf. *Anguillar.* 142. . . *Galium Aparinae*, Philanthropos (24, 17.) quod vestibus manibusque adhaereat. . . *Ilex Aquifolium* cum Quercu Illice confunditur (16, 6.). . . *Potamogeton pusillus* (26, 8.). Castor aliam noverat speciem tenui folio, velut equinis fetis etc.

*Myosotis Lappula* (25, 8.). Est et alia, quae ferat lappas minutas. . . *Pulmonaria officinalis*, Consiligo (25, 8.). . . *Asperugo procumbens* eodem nomine vocatur (26, 10.). . . *Primula vulgaris*, Dodecatheon (25, 4.). *Lobel. obs.* 517. . . *Azalea pontica* dicitur Aegolethron (21, 15.) cuius floribus mel venenatum fiat. Cf. *Tournefort. hist. acad. Paris.* 1704 551. . . *Convolvulus Cantabrica* (25, 8.). Cf. *Clus. hist.* 2, 49. . . *Capficum annuum* sine dubio est ea Piperitis, quam et

Siliquastrum vocat (20, 17.). Cf. *Dodon.* 716. . . *Rhamnus Alaternus* (16, 26.). . . *Rhamnus insectorius* est Calabrice (17, 8.). . . *Chenopodium Scoparia*, *Scopa regia* (21, 6.). . . *Atriplex hortensis*, *Chrysolachanum* (27, 8.). . . *Samolus Valerandi* eodem nomine generico occurrit (24, 12.). Sed *Anguillara* (179.) credit *Anemonen Pulfatillam*, quae a Bononiensibus sui temporis ita vocetur. . . *Plumbago europaea* eodem nomine (25, 13.) vocatur. Alio autem loco (26, 7.) *Tripolium* appellatur. . . *Thesium Linophyllum* eodem nomine (22, 22.). Cf. *Anguillara* 211. . . *Celosia cristata* est *Amarantus* (21, 8.). . . *Ribes nigrum* est sine dubio *Cynosbatos* (24, 13.). Idem vult piperis arborem italicam (16, 32.) *Dalechampius*, sed dubito. . . *Bupleurum baldense* intelligit *Anguillara* (169.) sub *Bupleuro* (22, 22.) capite *Anethi*, foliis longis multisque. . . *Sium Sisfarum* (19, 5.). *Sifer* et ipsum *Tiberius princeps* nobilitavit; flagitans omnibus annis e *Germania*. . . *Scandix Pecten* (24, 7.). . . *Peucedanum Silaus* (26, 8.). Cf. *Anguill.* 219. . . *Rhus Cotinus*, *Coccygiae* nomine (13, 22. 16, 18.). . . *Viburnum Tinus* (15, 30.). . . *Staphylea pinnata*, *Staphylodendron* (16, 16.). . . *Statice Armeria* (26, 8.).

*Lilium chalconicum*, rubens dicitur *lilium* (21, 5.). . . *Convallaria bifolia* bis occurrit, Cy-

claminos tertia dicta (25, 9.) et Ceratia uno folio (26, 8.). . . *Berberis vulgaris* (26, 13.). Spina, appendix appellata, quoniam baccae puniceo colore in ea appendices vocantur. . . *Iuncus maximus* est Combretum (21, 6.). Herba Luziolae Italica appellata (*Caesalp.* 4, 58. *Anguill.* 179.).

*Daphne Thymelaea* (12, 7.). . . *Acer platanoides*, laciniatum Ait. et maculatum describitur (16, 15.). . . *Polygonum Convolvulus* est Centunculus (24, 15.). Herba, quae, quia multa est, et ubique nascitur, *πολύγονον* appellatur. *Scribon. Larg.* 46.

*Cæsalphinia pulcherrima* est Nyctegretum, quam Democritus narraverit in Gedrosia crescere, colore hyssini, folio spinæ (*acaciae*): eam et nyctalopa vocari, quod e longinquo noctibus fulgeat. (21, 11.). . . *Saponaria Vaccaria*, est Condurdum (26, 5.). . . *Silena baccifera* est Cuculus (*Cucubalus*) 27, 8. Cf. *Clus. hist.* 2, 183. . . *Oxalis stricta*, Oxys (27, 12.). Cf. *Lobel. obs.* 495. . . *Lychnis sylvestris*, Malundrum f. Melandryon (26, 7.). Cf. *Clus.* 1, 394.

*Reseda alba*, nomine eo generico occurrit (27, 12.). Cf. *Lobel. advers.* 76.

*Pruni* plures species nominantur, maxime vero *Chamaecerasus* (15, 25.). *Mahaleb* etiam nomine *Vaccinii* (16, 18.). *Pyrus torminalis* (15, 21.). . . *Rosae* campana, praenestina et ala-



bandina (21, 4.). . . *Geum rivale* fere *Petilium* illud (21, 8.), quod circa vepres nascatur, inflexo floris cacumine, flore roseo: sed autumnno nasci dicit. . . *Geum urbanum* eo nomine (26, 7.) occurrit. *Fragaria vesca* (25, 9.) secundum codices antiquos est pentaphyllum illud fraga ferens, sed exstant aliae lectiones, ubi de *Trifolio fragifero* loqui videtur. Cf. *Leonicenum de Plinii error. f. 5. G.* Antiquius, quam Plinii, est *Ovidii* testimonium de fragis aureae aetatis (*metamorph. 1. v. 104.*)

„Arbuteos fructus montanaque fraga legebant.“

*Spiraea Ulmaria* est *Rhodora* (24, 17.). . .

*Actaea spicata* (21, 7.). Cf. *Lobel. obs. 389.* . . . *Caltha palustris*, *Chamaeleuce* 26, 6.). Cf. *Anguill. 212.* . . . *Ranunculus Thora*. *Limeum* (27, 10.). Cf. *Anguill. 213.* . . . *Ranunculus polyanthemus*, eodem nomine (27, 12.).

*Lamium maculatum*, *Leuce* (27, 11.). Cf. *Caesulpin. 11, 31.* . . . *Nepeta italica* (25, 15.). . . *Nepeta Scordotis* a Pompono Laeto, Pompeii liberti descripta (25, 6.). Bene delineavit Prosp. *Alpinus exot. 283.* . . *Teucrium Scordonia* est alterum *Scordium* (25, 6.). Cf. *Lobel. obs. 262.* . . *Vitex trifolia* est *Garyophyllon* (12, 7.) piperis grani simile: quod egregie describit *Rumphius (herb. ambain. p. 49. 50. t. 18. 19.)*. . . *Rhinanthus Crista galli* est *Alectorolophus*. (27, 5.).

*Anguill.* 219. . . *Euphrasia Odontites* eo nomine (27, 12.).

*Dentaria enneaphylla* (27, 9.). Cf. *Column. esphraf.* 1, 307. . . *Rafficae oleraceae* plures varietates recensentur, Sabellica, Pompeiana etc. (25, 8.).

*Ononis Natrix* eo nomine (27, 12.). Cf. *Lo-bel. obs.* 493. . . *Anthyllis Barba Iovis* eo nomine (16, 18.). . . *Cytisus Laburnum* (16, 18.) eodem nomine bene describitur. . . *Hedysarum Alhagi* forte Occhi illud Onesicriti est, e quo mel defluat, sed ficis similis frutex appellatur (12, 8.). . . *Trifolium italicum*, *Oxytriphyllum* (21, 9.). Cf. *Scribon. Larg.* 163.

*Carduus leucographus* (27, 11.). . . *Cnicus Erisithales* (26, 13.). Cf. *Dalechamp.* 1094. . . *Gnaphalium gallicum* est Impia (24, 17.). Cartafilago *Anguill.* 205. . . *Bellis perennis* eodem nomine (26, 5.). . . *Chrysanthemum segetum*, Bellium (21, 8.). . . *Inula Bubonium* forte Aster (27, 4.). Cf. *Clus. hist.* 2, 24. *Scopol. carnol.* t. 58. *Galenus* βουβώνιον dicit (*facult. simpl.* 6, 79.). . . *Centaurea nigra*, Hyosiris (27, 9.). Cf. *Anguill.* 216. . . *Calendula officinalis*, Caltha (21, 6.).

*Aristolochia Pistolochia* (25, 8.). Cf. *Clus. hist.* 4, 72.

*Ari* plures species recensentur (24, 16.).

*Arum Dracunculus, italicum, Arisarum et tenuifolium.* Cf. *Lobel. adv.* 260. . . *Pinus Pinaster*, *Tibulus* (16, 10.). . . *Pinus Cembra*, *Taeda* (16, 10.). . . *Fagus sylvatica* (16, 6.). . . *Acacia latronum* forte est spina lacrimarum pretiosa in gente Ariana (12, 8.). . . *Amarantus tricolor* est *Gromphaena* (26, 7.). . . *Ephedra distachya*, *Polygonum quartum* (27, 12.). Cf. *Clus. hist.* 1, 91. . . *Myrica Gale*, *Chamaeleagnus* (24, 11.). Cf. *Dodon.* 780. . . *Humulus Lupulus*, *Lupus salictarius* (21, 15.).

*Lycopodium Selago* (24, 12.) eodem nomine. . . *Conserva glomerata* in alpinis fluminibus (27, 8.). . . *Boletus suaveolens* (16, 8.). Ceterae omnes e Theophrasto, Dioscoride, Crateva aliisque saepe alijs nominibus excerptae.

#### G A L E N U S.

Vir, cuius summum ingenium, eruditio vastissima et uberrima fertilitas omnem antiquitatem maxima cepit admiratione, nec rem herbariam intactam reliquit. Patre natus Nicone, architecto Pergameno, a prima inde iuventute optimis praeceptoribus in literarum disciplinam traditus fuit: pater ipse *Φιλογεωργὴς* experimenta instituit, ut transmutationem frumentorum in lolium observaret. Ea omnino veritatem eius transmutationis confirmasse perhibet *Galenus*: triticum in lolium, hor-

deum in avenam sterilem abiisse (*facult. alm.* 1, 518.). Galenus Asiam minorem, Aegyptum, Graeciam totam Italiamque percurrrens, Palaestinam ipse adgressus est, ut balsami fruticem investigaret, quum balsamum illud frequenter adulterari comperisset (*antidot.* 1, 424. 433.). Imperatoris Marci Aurelii medicus per aliquod tempus, in patria Pergamo ultimam aetatem degit.

Ipsi tempore Imperatores romani in Creta plantarum utilium feracissima botanicos aluerunt, qui herbas radicesque sedulo lectas Romam transmitterent (*antidot.* 1, 424.). Neque tamen iis posse penitus confidere ipse fatetur, sed oportere medicum peregrinari, ut plantas officinales in locis natalibus observet, colligat et vere distinguere discat (*ib.* 428.). Taxat eos, qui medicamina omnia simplicia e Creta petant, ac respuant, quae a Cretensibus botanicis lecta non fuerint: crescere enim per Italiam aliasque regiones plurimas plantas, eademque virtute pollere, quam Cretenses, quod ἀμαράκτου et μάγου exemplis ostendit (*ib.* 431.).

Cinnamomum cum cassia satis congruere: semetipsum integram arborem Cinnamomi Romae vidisse, e qua Marco Aurelio antidotum paraverit (*ib.* 455.). Crocum in antro Corycio optime crescere, ut ipse expertus fuerit (*ib.*).

Carpasium praedicat Cinnamomo non multo in-

ferius, optimum crescere circa Sidam Pamphiliæ: cortex id vel radicis vel trunci esse debuit (*antidot.* 1, 434. *facult. simpl.* 7, 89.). Neque idem est cum Cubebis, ut *Amat. Lusit.* (*comm.* 13.) perhibet. Cf. *Clus. exot.* 185. Equidem, rite collatis omnibus, quæ veteres de carpesio traderunt, opinioni adfentior *Anguillaræ* (150.), qui radicem esse *Rusci Hypophylli* arbitratur. Ea enim amaro-aromatica est, et roborantium vice ab ipso demum *Riverio* (*obs. cent.* 3, 53.) adhibita fuit. Graeci feriorum saeculorum manifesto Cubebas intellexerunt (*Nic. Myrepsic. antid.* 1, 133.).

Secalen vidit *Galen.* (*fac. alim.* 1, 312.) in Thracia frequenter cultam, ubi *βρίζα* ab incolis vocabatur. Panem tamen esse inferioris indolis, meliorem, qui e Spelta in Phrygia paretur: hordeum nudum (*γυμνόνριθον*) in Cappadocia coli (*fac. alim.* 1, 313.). Alexandriae semet vidisse iuvenem, qui per plures annos solis phaseolis et ochris vixerit (*ib.* 316.).

*Ἐλυμον* vocat Panicum italicum, quod cum *μελίγη* f. Panico miliaceo componit (*fac. alim.* 1, 314. *fac. simpl.* 6, 83.). Cochleariam Drabam (*θλάσπι*) optimam in Cappadocia gigni (*antidot.* 1, 435.). Eodem loco Centauream Rhaponticam nomine *ἐΐου* praedicat (*fac. simpl.* 8, 106.). Boletos esculentos distinguit (*facult. alim.* 2, 335.). *Ὀποκάλασσαν* habet, substantiam Myrrhae ad-

mixtam venenatam, quæ euecaverit homines quosdam inscitia eam fumentes. (*antidot. i.*, 425. *de compos. medic. sec. loc. i.*, 154.). Idem videtur *Dioscorides* intelligere, dum ἐπὶ καρχησίου tanquam venenum soporiferum adfert (*alexipharm. c.* 13.). Et *Paullus Aegineta καρχησίας*, ὀπὸν dicit (*lib.* 5, 44.). Haec venenata substantia nec cum καρχησίῳ supra memorato, nec cum καρχησίῳ Byzantinorum confundenda est. Nobis ferè ignota est, nisi quandoque et nostrae myrrhae admixta quaedam substantia reperiatur, quam *Schulzius* sapore igneo et venenata indole observavit (*toxicol. veter. p.* 52.).

*Chrysobalanum*, aroma roborans (*de compos. med. sec. loc.* 8, 281.) commendat, cumque eo *Actuarius* et *Nic. Myrepsicus*, nomine ξανθεβαλάνου (349.). Non defuerunt, qui pro nuce moschata habuerint, refutati a *Clusio* (*exot.* 179.). Nonne potius nux est *Semecarpi Anacardil*, cuius descriptionem et usum vide apud *Roxburghium* (*coromand. i.*, p. 13. t. 12.)?

Neque tamen raro *Gal.* versatur in erroribus. *Styracem* in calamis gigni (*antid. i.*, 435.), *Aca-*ciam veram similem esse τῇ λευκῇ ἀκάνθῳ, quæ aut *Carduus* est *leucographus* aut *Oniscus Casabonæ* (*facult. simpl.* 5, 72.) perperam autumat.

Libellus περὶ ἀντιβαλλομένων, si modo genuinus, errorum plenus est. Ἐλάγιον e. g. σελίνον di-

210 LIB. II. CAP. III. GALENUS.

cit ἀρωματικὸν ac pro Gentiana sumi perhibet: pro Rheo Centaurium maius, quod et suadet Nic. Myrepsicus (*antidot.* 1, 1.) Rheum enim Rhaponticum serioribus temporibus fere ignotum fuit, ut Centauream Rhaponticam aut Centaurium ii substituerent. Cetera omnia e Dioscoride, quem ubique citat,

Optima operum editio, quam sequor, est basileensis 1538. vol. 1 — 5. fol.

---

## LIBER III. REI HERBARIAE DECREMENTUM.

---

### CAP. I.

#### ROMANA AC GRAECA BARBARIES.

Veterum Graecorum Romanorumque res herbaria 1200 circiter species complexa, in iis fere substat, quae vel in medicina aliisque artibus adhibentur, vel curiosa ac mirabilia videbantur. Unicus fere *Theophrastus* naturam vegetabilium vitaeque rationes paullo curatius investigans, haud tamen ultra prima rudimenta progressus fuit. Nomenclatura veterum vaga, nulli legi subiecta: descriptiones mancae, plurimae aliorum fide traditae, posteritatis studium insigniter impediverunt.

*Dioscoridis* tamen et *Plinii* auctoritas per saecula inconcussa fuit, temporum labe et hominum desideria potius stabilita, quam ipsarum rerum veritate.

Generis humani ruina saeculo tertio et quarto aerae nostrae e luxurie et mollitie incredibili, e tyrannide crudelissima imperatorum Romanorum, e



turpissima illa orientali pseudosophia totum terrarum orbem infestante, profecta praecipites secum traxit omnes scientias. A tertio inde saeculo per universum Romanorum imperium doctrina vera nulla, nulla ingenii libertas, nulla studiorum ingenuitas. Servilis hominum desidia, ab arbitrario tyrannorum imperio oppressa, in eo tota fuit, ut veteres transcriberet et in epitomen redigeret. Artes omnes atroci tyrannidi inservierunt: orientali superstitione seductum humanum genus eas duntaxat artes coluit, quae desidia, avaritiae, servili genio et luxuriei faverent.

Accessit infanus ille ac stupidus furor indignorum hominum, qui Christi nomen usurpabant, in omnes paganismi reliquias: bibliothecarum incendia et librorum cuiusvis generis dilapidatio: atrocissimae demum persecutiones eorum, qui ethnicorum cognitiones et eruditionem servare studerent.

Nota haec omnia ac centies repetita, uberius demum a me exposita sunt in *vol. 2. historiae medicae*. Ex iis vero misera rei herbariae fors per se iam patet. Per plurima enim saecula soli fere medici, ignarum illud et ignavum vulgus, fuerunt, qui suo, i. e. barbaro et rudi modo rem herbariam colerent. Simplicia sic dicta et antis petita, nominibus vagis saepiusque falsis aut barbaris saltem praedita, adhibuerunt, ac in levibus futilibusque libris consignarunt.

Tædet paene, pauca tantummodo e foeda illa farragine adducere.

SCRIBONIUS LARGUS, Claudii Caes. medicus, opusculum de compositione medicaminum satis barbare conscripsit, quod immenso Io. Rhodii studio Patavii 1655. 4. editum, pauca continet, quibus Plinii coevi scripta illustranda sunt. . . Herbam (12.) quam *πολύνευρον*, ipse *nervalem* appellat, aliam non arbitror, quam *Plantaginem maiorem*. . . Herba *urceolaris* (39.) quam *Plinius Valerianus* (2, 18.) *Vitraginem* dicit, est *Parietaria officinalis*. . . *Cotyledona Umbilicum* eo nomine vocat, folia habere cymbalis similia et in parietibus humidis crescere (55.). . . *Symphytum officinale* satis perversè et *Inulam rusticam* et gallice *Alum* nominari (83.) *Teucrium Polium*, nisi potius pro *πολύ* legendum sit *πολυγώνω*, *tinariam*. . . *Loniceram Periclymenum* vocat *Matrem sylvae* (129.) *Scolopendrium officinale*, *Calci-fragam* (150.). *Hypocistidem* male dicit succum *Rosae caninae* (85'). *Hyoscyamum album* *Apolinarem herbam* (90.) *Rhoëm coriariam*, *syriacam*.

MARCELLUS Burdigalensis, Theodosii I. archiater, incitiam, an superstitione maior nescio, compositorum immensam corrasit farraginem, ab *Henrico Stephano*, collectioni suae insertam, et a

Thoma *Reineſio* eruditiffimo in variis lectionibus paſſim illuſtratam.

Quum Burdigalenſis eſſet, gallica ſaepe nomina plantis ſuis adſcripſit: *Viſumarum* vocat Menyanthen trifoliatam (3.), *Burdunculum* Borraginem (5.), *Odocos* Sambucum Ebulum (7.), *Gilarum* Serpyllum (11.), *Tiniariam* Polygonum Convolvulum (17.), *Halum* Symphytum (31.), *Badl-tin* Nymphaeam (33.).

PALLADIUS *Rutillius Taurus Aemilianus*, ſaeculo, ut videtur, quinto florens: citatur enim ab *Iſidoro* (*orig.* 17, 1.) et *Caffiodoro* (*div. lect.* 28.): fundos in Sardinia et ad Neapolin poſſeſſiſſe ipſe teſtatur (4, 10.). Opus de re ruſtica ad menſes, e Graecorum ſcriptis potiſſimum, compoſuit, a doctiſſimo *Schneidero* nuper egregie editum ac illuſtratam.

Pauciſſima in eo tanguntur, quae ad rem ipſam herbariam pertinent. Triticum credit in loco ulgiſoſo transire in filiginem ſ. ſecale (1, 6.). Hordeum galaticum dicit (2, 4.); quod diſtichon *Iſidoro* (17, 3.) et cantherinum, quod huic hexaſtichon. Canneta colit (3, 23.) ex Arundine Donace. Satureiam colit (3, 24.), Cepullas (*Cepas*) Colocaſiae bulbos et Allium ulpicum (*fativi varietatem*) Cannabum (4, 5.), Armoraciam (4, 9.), Gith quod Nigella fativa (10, 13.) et Ciceram, quam a Cicerula (*Cicer arietinum*)

distinguit (4, 6.). Hypomelidas habet (13, 4.) poma sorbo similia, quae fructus sunt vel Unedonis vel Azaroli.

ISIDORUS Hispalensis, e stirpe Gothica, episcopus Hispalensis († 636.) in opere magno etymologico (*Origines*, ed. Vulcan. Basil. 1577. fol.) plantas et arbores varias ex Plinio potissimum recenset, nominibus fere inhaerens, pauca tamen memoratu digniora adlegans. Sic primus, ni fallor, *Rheum Rhabarbarum* (nomine *Rhei barbari*) habet (17, 9. col. 426.) licet et *Alexander Trallianus* (8, 3.) idem iam commendet. Posterius eam speciem, ab Arabibus praepreimis commendatam et Rheo Rhapontico sine dubio praefereendam, *Rhei indici* passim nomine citant (*Actuar. meth. med.* 515. *Nic. Myreps.* 1, 21. 209. 22, 5.).

*Mellam* dicit Isidorus lotum cyrenaicum (*Zizyphi speciem.*) (17, 7.). Fagum et esculum, utramque fructibus esculentis insignem credit, licet errore veteris *Φρυγῶν* seductus. Asplanium vocat Saxifragiam, Inulam rustico nomine *Alant*, Electrum in insulis Germaniae (*nonne Rugia?*) e pinibus stillare. *Melofon* vocat arborem, quae ammoniacam gummin largiatur.

---

Constantini VII. iussu veterum monumenta a variis scholasticis viris excerpta vestigia industriae saltem nobis fiunt Constantinopoli saeculo X. ad-

huc superstitis, Sicut *Theophanes Novus* epitomen medicam, alii hippiatricam, ita et *CASSIANUS BASSUS* Bithynus, compilationem edidit Geoponicorum veterum, e quibus pauca duntaxat huc pertinent.

In ipsis quidem Geoponicorum fragmentis, non semel sedulo a me perlectis, nihil fere ad rem herbariam inveni; superstitionibus et puerilibus consiliis omnia plena. Memoratu tamen dignum mihi visum fuit Cassiani Bassi ipsius consilium, quid Constantinopoli singulis mensibus serendum sit (12, 1). Ianuario ferit *θαλασσοκράμβην*, quae *Convolvulus* Imperati, Februario *κοδιμέντον* (*Petroselinum*), *τεντλόριζον* (*Betam Ciclam*), *θρύμβην* (*Satureiam capitatam*), *μαρούλια* (*Lactucæ sativæ* varietates: vox haec deflexa a *μακρύλω*, quod *Maior* vigeant. *Bochart. hieroz.* 1, 696.), *Φρυγαιτικόν* (?) *ἐργιτανόν*, *κωμωδιανόν* (quae forte varietates *Lactucæ*), Aprili *τεντλομέλοχον* (*Spinachia* forte oleracea, *Bod. a Stapel ad Theophr.* p. 778.),

Novas quasdam plantas ab Arabibus feriores Graeculi hanferunt, quod e *SYMEONIS SETHI*, opusculo de cibariis (*ed. Gyrالد, Basil: 1558.* 8.) elucet. Auctor *πρωτοβεστιάρχης* palatii Antiocheni, Michaële Ducā, Imperatore Constantinopolitano, fuit, excerpfit autem potius *Pselii* maioris

molis librum *περὶ ἐδεστώ.* Cucumeres dicit *αἰγούρια* aut *τετραγγοῦρια*, Ocimum primus *βασίλικόν*. Primus, ni fallor, calyces Eugeniae caryophyllatae, *καρυόφυλλα* nominat, primus etiam Myristicae moschatae fructum, *καρὶά ἀρωματικά* (Cf. et *Actuar. meth. med.* 5, 4.). *Καρνάβαδιν* Cuminum Cyminum est. (Cf. *Actuar. l. c. Nic. Myreps.* 1, 58a. 406.). *Ταρχόν* Artemisia Dracunculus.

Primus inter Graecos *Καφουράν* nominat, quam dicit gummi esse aut lacrimam arboris Indicae, quae tantae sit molis, ut centum homines eius umbra frui possint. Nasci in montibus maritimis, lignum esse leve et ferulaceum. *Xylaloën* dicit, quam veteres *Agallochum*, cuius plures differentias citat. *Μαζζάνιον* vocat Solanum Melongenam.

Ultimus fere Graecorum medicorum, *Nicolaus Myrepticus*, longe plura medicamina ex Arabibus potissimum corrasit, quam maiores ipsius cognoverant, barbaris ea nominibus passim conspurcata. Vixisse autem saeculo decimo tertio alibi (*hist. med.* 2, 521.) docui.

Salviam Horminum vocat *ζεντογάλην* (3, 62.): *ζάρεναβι* cum Actuario (*meth. med.* 5, 8.) Cyperum rotundum: Rorem marinum *δενδρολίσπανον* (1, 64.). Piper Malageta et Cubebam nominibus specificis commendat (1, 22.) *Phalarin* canarien-

218 LIB. III. CAP. I. ROM. AC GRAEC. BARB.

fem, ἀνεμοχόρτον dicit (3, 46.) quali nomine etiam hodie a Graecis insignitur (*Forsk. fl. constant. p. xix.*).

Primus ὄξυΦοίνικα *Tamarindum* (1, 24.); γλυ-  
κοκάλαμον *Cassiam Fistulam* (1, 449.); *Cassiam*  
*Sennam*, et fructus quidem (1, 465. 472.) cum  
*Actuario* (*meth. med.* 5, 8.); μυρσβαλάνους ἔμ-  
πλετς *Phyllanthum Emblicam* (1, 24.) cum eo-  
dem *Actuario* (*ib.*) vocat. Primus *Fraga vesca* Φρα-  
γούλι nomine (3, 46.) citat. *Erodium moscha-*  
*eum* nominat μοςχοβότανον (3, 46.), *Betoniam*  
*orientalem* δροσιοβότανον (1, 1.), *Centauream*  
*Benedictam* καρδιοβότανον (3, 60.), *Agrostem-*  
*ma Githaginem* κοκάλιδα τοῦ σίτου (4, 2.), *Bu-*  
*bou macedonicum* μακεδωνίσιον σπέρμα (1, 1.).  
*Asclepias Vincetoxicum* nomine specifico occurrit  
(89.), *Gossypii* femina nomine βαμβακίου (1,  
425.), *Artemisia camforata*, καΦουράς βοτα-  
νῆς. . . *Iridis tuberosae* usum a *Paullo Aegineta*  
primo memoratae nomine ἐρμοδακτύλου (*lib.* 7, p.  
236.) hi seniores Graeci ab Arabibus probabiliter  
acceperunt, licet iam *Theophrasto* cognita fuerit.

*Succinum*, quod ἡλεκτρον veteres nominant,  
noſter *βερονίκην* (*vernitem*) appellat (1, 327.) un-  
de deceptus *Fuchſius* credit eum de *Veronica* offi-  
cināli loqui. (Cf. *Gesner. epist.* 2. f. 61. a.)

## CAP. II.

## CAROLI MAGNI CAPITULARIA.

Summa medii aevi caligo fulgentissimo Caroli Magni splendori cessisset, nisi, qui eum sequuti sunt, imperatores ecclesiastico stupore ac aevi sui desidia iterum obdormuissent. Is enim, auctor immortalis dynastiae, quae imperio maximam Europae partem regere debebat, sapientissime omnibus prospexit, quae ad regendas imperii partes et administrandas pertinerent.

In *capitularibus de villis suis*, quae Eckhardus (*commentar. de reb. franc. orient. vol. 2.*) optime edidit, et Antonius (*hist. econom. germanic. vol. 1.*) praeclare interpretatus est, plura occurrunt, quae, non vulgarem fuisse ipsius cognitionem rei herbariae, ostendunt.

Quae in hortis villarum (§. 70.) coli iussit, digna iudico hic recenseantur. Sunt autem

Rosae,	Abrotanum,
Lilia,	Cucumeres ( <i>Melones</i> ),
Foenum graecum,	Pepones,
Costum ( <i>Balsamita vulgaris</i>	Cucurbitae,
Willd. Haec enim Costi	Phaseoli,
hortensis nomine in plerisque	Ciminum ( <i>Cuminum Cymim.</i>
botanicis operibus, e.g.	Dubito id hiemes
<i>Lobellii</i> ( <i>advers.</i> 136.), <i>Don-</i>	Aquisgrani perferre. Vi-
<i>donaei</i> (295.) etc. occur-	detur Imp. e Romanorum
rit.),	scriptorum libris eam plan-
Salvia,	tam sumfisse.),
Ruta,	Rosmarinus,



Careium ( <i>Carum Carvi</i> ),	Ibiscus Mismalva ( <i>Althaea</i> <i>off.</i> );
Cicera,	Carruca ( <i>Daucus Carota</i> ),
Squilla, (?)	Adripia ( <i>Atriplex hortensis</i> ),
Gladiolus,	Ravacaulus ( <i>Brassica Napo-</i> <i>brassica</i> ),
Dragontea ( <i>Artemisia Dra-</i> <i>unculus</i> : nulli veterum di-	Allium Porrum, var. margari-
cta: <i>Sethus</i> enim iunior est),	tacea ( <i>Uniones</i> ),
Coloquintida ( <i>Cucumeres</i> ),	Radix ( <i>Raphanus sativus</i> ),
Solsequia ( <i>Heliotropium eu-</i> <i>ropaeum</i> ),	Cepa,
Ameum ( <i>Ammi maius</i> ),	Warentia ( <i>Rubia tinctorum</i> ),
Silum ( <i>Sium angustifolium</i> , bonum iumentis pabulum),	Faba maior ( <i>Vicia Faba</i> ),
Lactuca,	Cerfolium,
Gith ( <i>Nigella sativa</i> ),	Sclarea ( <i>Salvia Sclarea</i> )
Eruca alba ( <i>Brassica Eruca</i> ),	Levisticum,
Nasturtium,	Anetum,
Parduna ( <i>Rumex acutus</i> ),	Intubus,
Olifatum ( <i>Smyrnium Olusa-</i> <i>trum</i> ),	Sinapi,
Petresilinum,	Satureia,
Apium,	Menta,
Savina,	Tanarita ( <i>Tanacetum vulga-</i> <i>re</i> ),
Feniculum,	Papaver,
Diptamnium (? <i>Origanum Dio-</i> <i>tamnus</i> ),	Vulgigina ( <i>Asarum europae-</i> <i>um</i> ),
Sisymbrium ( <i>Mentha sylve-</i> <i>stris</i> ),	Malva ( <i>Althaea rosea</i> ),
Mentastrium ( <i>Mentha aquati-</i> <i>ca</i> ),	Paltenaca,
Nepeta ( <i>Nepeta Cataria</i> ),	Blida ( <i>Amarantus Blitum</i> ),
Febrifugia ( <i>Chironia Centau-</i> <i>rium</i> ),	Caulus ( <i>Brassica oleracea</i> ),
Beta,	Britta ( <i>Allium Schoenopra-</i> <i>sum</i> ),
	Porrus ( <i>Allium Porrum</i> ),
	Ascalonitas ( <i>Allium ascaloni-</i> <i>cum</i> ),

## CAROLI MAGNI CAPITULARIA. 221

Allium,	Lactesidae ( <i>Euphorbia La-</i>
Cardones ( <i>Dipsacus fullo-</i>	thyris),
num),	Iovis barba ( <i>Sempervivum</i>
Pifus maurifcus ( <i>Pifum fas.</i> ),	tectorum).

*Specimen etiam brevialit rerum fiscalium Caroli M. ab Eckhardo primum publicatum, dein ab Antonio optimo versum et illustratum in horto villae cuiusdam Imperiali nominat Coliandrum (Coriandrum), Vittonicam (Betonicam), Acrimoniā (Agrimoniam).*

Varias arbores manfuetas iubet Imperator *per ariciis servatoria* coli aut saltem conservari, unde primus doctissimus et humanissimus *Brunfius* Helmstadiensis, coniectura probabili consequutus est, tepidaria hybernacula subintelligi, cui et *Antonius* (*hist. oeconom. germ.* 1, 445.) adfentitur. Melones saltem a Romanis iam in pulvillis vaporariis, quae lapide speculāri tegebantur, cultos fuisse, *Columella* (11, 3.) docet. Cf. *Vossium nostrum ad Virgil. georg.* 4, 122.

*Eckhardus* (*comment. rer. franc. or.* 2, 980.) edidit etiam farraginem compositam variis medicaminibus, tempore Caroli M. maxime commendatam, quae praeter adlegatas plantas sequentes continet:

Pipinellam ( <i>Pimpinella Sani-</i>	Centauriam ( <i>Centaurea Cen-</i>
fraga),	taurium),
Acer Gunderebam, ( <i>Acer cam-</i>	Camipiteum ( <i>Aiuga Chamae-</i>
pestre),	pitze),

## 222 LIB. III. CAP. II. CAR. MAGN. CAPITUL.

Frassifoliam Erebrama ( <i>Rubus</i>	Gariofilas ( <i>Caryophyllos are-</i>
<i>cacsius</i> ),	<i>mat.</i> ),
Cauli femi Cholsamo ( <i>Brassica</i>	Turnellam ( <i>Tormentilla</i> ),
<i>ca Napus</i> ),	Gamandream ( <i>Tencrium Cha-</i>
Bislinguam ( <i>Rafcus Hypo-</i>	<i>maedrys</i> ),
<i>glassum</i> ),	Centenodiam ( <i>Polygonum</i>
Aitiotidem Chraeunito ( <i>E-</i>	<i>aviculare</i> ),
<i>rodium maschatum</i> ),	Origanum vulgare,
Quinquefolium ( <i>Potentilla</i>	Iva ( <i>Aiuga Iva</i> ),
<i>reptans</i> ),	Plantaginem,
Vincatofficam ( <i>Asclepias Vin-</i>	Sparga ( <i>Sparganium ramosum</i>
<i>getoxicum</i> ),	<i>Anton.</i> ),
Benedictum ( <i>Geum rivale</i> ),	Saxifragam Steinpreha ( <i>Asple-</i>
Basiliscam ( <i>Ocimum Basili-</i>	<i>nium Trichomanes</i> )
<i>cum</i> ),	Canape ( <i>Cannabis sativa</i> ),
Reopontinum ( <i>Rheum Rha-</i>	Alleluia ( <i>Oxalis Acetosella</i> ),
<i>poncticum</i> ),	Ablinthium,
Artemisiā,	Millefolium,
Nymphaeam,	Gentianam,
	Marrubium.

### CAP. III.

#### MONASTICA RES HERBARIA.

Ut temporis sui ignorantiae succurreret et monachorum desiderium tolleret, sapientissimus Imp. Carolus scholas coenobiorum instituit, totumque scientiarum utilium orbem circumscripsit ita, ut *trivio* comprehenderet Grammaticam, Arithmeticam et Musicam, *quadrvio* vero Rhetoricam, Dialecticam, Geometriam et Physicam (*Launoy de scho-*

*lis celebr. a Carolo M. instaur. in Opp. tom. 4. P. 1. Ruhkopf. hist. scholarum p. 22 f.).* His addidit in capitulari ad Theotonam villam dato ann. 805. (*Baluz. capitul. reg. franc. 1, 295. ed. Venet. 1772.*) *artem medicinalem*, cuius cum praecipua pars herbarum cognitio putaretur, a monachis etiam herbae collectae fuerunt, quae usu medico inclauerunt.

Inscitia autem temporum, monachorum ignavia, linguarum cultus neglectus et servilis animus hominum eorum impedimenta innumera obtulerunt, quin ullo quidem modo augeri, ne servari quidem herbarum cognitiones possent. Plinii codices male transcripti, Caelius Aurelianus, Scribonius Largus et Marcellus Empiricus turbidi fontes fuerunt, e quibus et ii haurirent, qui conscribere quaedam de herbarum usu auderant.

Non defuerunt enim miserrimo illo aevo monachi, qui, celebria antiquitatis nomina adfectantes, corraderent opuscula de herbarum virtutibus. Eorum duo praeprimis dubiae aetatis sunt: *APULEII* et *PLINII VALERIANI* nominibus lata. Utrumque simul Argentor. 1533. fol. editum, Apuleii etiam cum commentario, Gabr. Humelberg 1537. Tigur. 4. Probabile saltem est, hoc Apuleii opusculum ante annum 1200. conscriptum fuisse, quum Isaac Vossius codicem figuris ornatum ante id saeculum se possidere testetur. (*Fabric. bibl. lat. 3,*

526.). Nihilominus monachi certe creduli et incii labor est: tot barbara nomina, tot superstitiones, tot lectionum Plinii senioris corruptarum vestigia occurrunt. Nomina inepta Prophetarum, Aegyptiorum, Dacorum, Gallorum ubique citat. Aristolochiam Graecos *Ararizam*, alios Ephasion, Dardanon, Picionien, Tauxinon, Lestitin, Opetin, Italos Malum terrae, Dacos Absinthium rusticum appellare. Betonicam a Prophetis Hierathiorinen, ab aliis Ruzsmarinam vocari: maleficiis eam resistere. Nymphaeam, thyrso nigro foliis cichoraceis, in Ompenico (*Orchomenio*) lacu crescere. Sed quorsum excipiam has ineptias? . .

Placidus *Actor*, qui citat Isidorum, citatur autem a Vincentio Bellovacensi, monachus sine dubio fuit. Compilavit materiam medicam, quae nunquam prodiit. (*Fabric. bibl. med. et infim. latin. I, p. 12.*).

Walafridus STRABUS, Suevus, primum Decanus Coenobii Sangallensis, dein Abbas Augiae divitis saeculo IX., ad Grimoaldum Abbatem Sangallensem scripsit poema, quod *Hortuli* nomine edito Io. Atrocianus Friburgi 1530. 8. Versus, pro ea saltem aetate satis boni: florum ipsa ac plantarum pauperrima messis. *Elelifagus* (*Salvia*), Ruta, Abrotanum, Cucurbitae, Pepones, Marrubium, Absinthium, Foeniculum, Gladiolus, Lybisticum, (*Li-*

*gusticum*), *Caerrefolium*, *Lilium*, *Papaver*, *Sclarea*, *Mentha*, *Pulegium*, *Apium*, *Bettonica*, *Agri-  
monia*, *Ambrosia* (nescit tamen, an vera sit vete-  
rum planta), *Nepeta*, *Raphanus*, *Rosa*. Descrip-  
tiones non malae, vires ubique fabulosae.

Hic citatur a miserrimo monacho, qui *Aemiliū  
MACRI*, *Plinio* et *Ovidio* aequalis, nomen affec-  
tavit. Poëma de *herbarum virtutibus* ab eodem  
*Io. Atrociano* cum *Strabo Friburg.* 1530. 8. edi-  
tum. Pessimi versus: e. g.

„Illius herbae vis frigida dicitur esse“,

et rursus:

„*Artemis* graece quae dicitur, indeque nomen.“

Ignorantia, in monacho saltem excusanda:

f. 24. „*Alteamque* vocant illam, quod crescat in altum“

f. 61. „*Caulis romana*, Graecorum *brassica* lingua“

„dicitur.“

f. 90. „*Fruementis* nocturnam *solium* graecus vocat herbam,“

„quam nostri dicunt vulgari modo *nigellam*.“

Barbaries nominum alemannicorum: *Isatin* (f. 86.)

*Gaisdam*, *lapathum* (f. 89.) *paratellam*, *chamae-*

*dryn* (f. 86.) *Gamandream* vocat. Auctores de-

nique, praeter *Strabum*, citat, quos nemo cog-

noscit, *Asclepium*, *Iustum*, *Melineum* et *Menla-*

*cum*, monachos sine dubio.

Cum *Straboni* citet, citetur ipse a *Vincentio  
Bellovacensi* (*spec. natur.* 1. lib. 9. c. 104. f. 104.

l.) aetas ipsius in saec. X—XII. cadit.

Saeculo X. vixisse *Alfredus*, *Episcopus Cridi-*  
Tom. I,

ensis in Westfexia Deuonia Angliae dicitur (*Aet. erud.* 1702. p. 282.). *De naturis rerum* scriptit libros, quos citat Bartholomaeus de Glanville (*propriët. rer.* 17, 1.) ubi physicam vegetabilium exponit. Nihil praeterea de Alfredo innotescit.

Supereft etiam *Hildegardis* abbatiffae Bingenfis, († 1180. *Trithem. annal. Hirsaug.* 1, 416.) sanctiffimae virginis, *physica*, feu collectiô medicaminum ad varios corporis adfectus, a Io. Schotto Argent. 1544. fol. edita.

Insignis plantarum utilium melfis, fed barbaris utplurimum nominibus vocatarum.

Vichbona ( <i>Phaseolus</i> 2, 9.)	solvens externe commendatur.
Wichim ( <i>Ervum Ervilia</i> 2, 12.)	Humela (2, 94.)? Humulus.
Liquiricium ( <i>Glycyrrhiza</i> 2, 22.)	Herba Aaron ( <i>Arum maculatum</i> 2, 96.)
Pfeffertruch ( <i>Lepidium latifolium</i> 2, 23.)	Cardus niger ( <i>Brotera corymbosa</i> 2, 98.). Bona Abbatiffa, quae nunquam plantam viderat, exfcribit alios transcriptores.
Bachminza ( <i>Mentha aquatica</i> 2, 41.)	Apiago (2, 104.)?
Wegras ( <i>Statice Armeria</i> 2, 52.)	Wehdystel (2, 106.). Centaurea Calcitrapa.
Borith (2, 72.) Borrago officinalis.	Venich ( <i>Panicum sanguineum</i> .)
Gerla (2, 62.) Sium Sifarum (Cf. <i>Trag.</i> p. 440.)	Zytver ( <i>Artemisia Santonica</i> 2, 18.)
Stur (2, 54.)	Chriftiana ( <i>Helleborus niger</i> 2, 26.)
Conium maculatum (2, 85.)	
iam ut medicamentum re-	

MONASTICA RES HERBARIA. · 227

- Brunnescrassum (*Sisymbrium Nasturtium* 2, 39.)  
 Römische Mentha (*Mentha crispata* 2, 44.)  
 Stutgras (*Triticum repens* 2, 53.)  
 Zizania (*Lolium temulentum* 2, 75.)  
 Lungwurtz (*Pulmonaria off.* 2, 80.)  
 Frasca (*Ranunculus Thora* 2, 89.)  
 Haselwurz (*Afarum* 2, 95.)  
 Stignus (*Solanum insanum* 2, 97.)  
 De Vurz (*Rheum Rhaiponticum* 2, 99.)  
 Winda (*Convovulus arvensis* 2, 103.)  
 Lylum (2, 106.)? *Lilium candidum*.  
 Menva (2, 113.) Menwel.  
*Rumex acutus*. Trag. 318.  
 Ringella (2, 130.). *Calendula officinalis*.  
 Blandonia (2, 131.)?  
 Alentidium (2, 132.)?  
 Pandonia (2, 135.). *Chelidonium maius*. Tabernaem. 1, 102.)  
 Basilisca (2, 138.). *Ocimum Basilicum*.  
 Acoleia (2, 140.). *Aquilegia vulgaris*.  
 Saxifrica (2, 143.). *Asplenium Trichomanes*.  
 Denemarcha (2, 148.). *Valeriana celtica* Trag. p. 63.  
 Gelifia (2, 153.). *Amarantus tricolor*. Est nomen *Celofiae* corruptum. Cf. Trag. 917.  
 Dornolla (2, 158.). *Dorella Caesalp.* *Alyssum sativum*.  
 Storckenschnabel (2, 160.). *Geranium Robertianum*.  
 Birchvurtz (2, 167.). *Tormentilla erecta*.  
 Erdpfefer (2, 168.) ? *Capsicum annuum*.  
 Plionia (2, 171.). *Polygonum officinalis*.  
 Scamphonia (2, 172.). *Convolvulus Scammonia*.  
 Hunesdarm (2, 173.). *Stellaria media*.  
 Razela (2, 174.). *Polygonum Persicaria*. Trag. p. 91.  
 Dorth (2, 175.). *Avena fatua*. Trag. 672.  
 Simez (2, 180.)?  
 Dactilosa (2, 184.). *Panicum Dactylon*.  
 Cittervurtz (2, 186.). *Zedaria*.  
 Citocatia (2, 141.). *Solanum Dulcamara*. (Cito et cae-



- re;) sed *Dodonaeus* p. 363.  
*Cneorum* tricocon ita vocat.  
*Bervurtz* (2, 142.). *Aethusa*  
*Meum*.  
*Ugera* (2, 144.). *Colchium*  
*autumnale*.  
*Kbach* (2, 146.). *Sambucus*  
*Ebulus*.  
*Kranchschnabel* (2, 150.).  
*Erodium moschatum*.  
*Megilana* (2, 157.). *Solanum*  
*Melongena*.  
*Cicula* (2, 159.). *Cicuta vi-*  
*rosa*.  
*Weich* (2, 165.). *Holcus*  
*lanatus*.  
*Himmelschluzela* (2, 166.)  
*Primula vulgaris*.  
*Huossäthleda maior* (2, 169.).  
*Tussilago Petasites*.  
*Huossäthleda minor* (2, 170.).  
*Tussilago Farfara*.  
*Herba Brambere* (2, 174.).  
*Rubus fruticosus*.  
*Herba in qua Walbere* (2,  
 179.). *Vaccinium Myrtillus*.

Arbores tertio libro recenset, inter quas plu-  
 res rariores et novae occurrunt:

- Arbor Camforae* (3, 9.). *Boncitherus* (3, 18.)?  
*Quotanus* (3, 22.). *Pyrus*  
*Cydonia*.  
*Vibex* (3, 42.). *Vicia Ag-*  
*nus*.  
*Meltsboum* (3, 49.). *Pyrus*  
*Aria*.  
*Yffa* (3, 50.). *Taxus baccata*.  
*Boncitherus* (3, 18.)?  
*Mulberboum* (3, 27.). *Mor-*  
*us nigra*.  
*Fusarius* (3, 43.). *Evonymus*  
*europaeus*.  
*Hartboum* (3, 51.). *Cornus*  
*mascula*.

Sed oblivioni tradenda est haec barbaries, cuius  
 nunquam meminisssem, nisi e collatis nominibus istis  
 cum Dodonaei, Tragi, Tabernaemontani et Bruns-  
 felsii appellationibus barbaris et originem et prima  
 herbarum quarundam vestigia divinare possemus.

## CAP. IV.

## ARABUM RES HERBARIA.

Populo bellicoso, qui furore quodam religioso cultum a Mohammede suo inventum orbi terrarum gladio igneque obtrudere satagebat, qui inscitiam ipsam et servile obsequium erga prophetæ praecepta omnibus huic cultui addictis iniungebat, tali populo scientiæ Graecorum et Romanorum placere per se non potuerunt. Neque iis unquam imbuti essent, ni providentiæ divinæ beneficio Nestoriani, tyrannide orthodoxa Theodosii II. et Zenonis Isaurii e byzantino imperio pulsi, ad Euphratem scholas instituissent, quibus præter dialecticam et rhetoricam et ars medica doceretur, dignitates academicæ distribuerentur, et veterum Graecorum libri dialectici et philosophici in Syriacum idioma vertentur (*Assemani bibl. orient. 4, 940 f.*).

Nestoriani medici, et eruditione et usu tantopere superiores rudibus Arabibus videbantur, ut ipsius prophetæ laudem mererentur (*Abulferag. hist. dynast. p. 158.*). Summus vero eorum fautor fuit Almanzor Califa, qui, protinus ut urbem pacis Bagdadum condidisset, pacis etiam artes populo suo amabiles reddere conatus est (*Elmacin. hist. Saracen. 2, 4.*). Qui Almanforem sequuti sunt, Harrum Arraschid et summus Almanun, eodem ardore scholas, imo Academias per totum

Arabum imperium instituerunt, advocatis Nestorianorum celeberrimis doctoribus, qui veterum libros e Syriaco in Arabicum idioma vertere iussi, novam plane faciem doctrinae ac scientiae populo literarum aliquin rudi accenderunt. Baktischwarum et Hhonnain familia inprimis inclaruit Plinii, Galeni, Dioscoridis aliorumque Graecorum interpretationibus (*Casiri bibl. escurial.* 1, 240.). Hinc etiam veteribus arabicis codicibus Dioscoridis notae marginales syriacae adscriptae inveniuntur.

Singulari studio agitare Nestoriani medicamentum compositionem consueverunt. In scholis suis, teste *Assemani*, primi officinas legibus et praeceptis subiectas collocarunt, quarum praefecti dispensatoria sequi debebant. Primum exemplum enim aromatarii quem **صنعة** appellarunt, fuit Gregorius, episcopus Nisibenus, saeculi septimi initio (*Assemani* 3, 472.). Sequenti saeculo nominatur *Abu Koreisch*, Isa dictus **صيد الإنبي** i. e. *seplafarius* (*Abulfurag. hist. dynast.* p. 228.). Sabor, Sahelis filius, nosodochii Nestorianorum Dschondilaborensis praefectus, saeculo nono, primum *dispensatorium*, **كتاب انقرايين** conscripsit. (*Abulfarag.* p. 269.). Laudabilis ille mos et ad Arabas transiit, ut a saeculo inde octavo seplafarios et dispensatoria in scholis eorum inveniamus (*Hist. mea med.* 2, 360 f.).

Accessit, quod ad nostram rem magnopere refert, Abbassidarum et Almoravidarum Califarum gloriosa cupido, orbis terrarum cognitionem promovendi et commercium populorum augendi ac amplificandi. Illustre exemplum Almamunis, qui latitudinis gradum in desertis Africae primus metiri iussit (*Abulfed. annal. moslem.* 2, 241.) sequebantur plures, qui itineribus in remotissimas terrae partes susceptis geographica opera superstruerent (*Sprengelii collegae olim meritissimi, histor. geograph.* 160 f.). His itineribus et commercio Arabum florentissimo plurima debemus nova simplicia, Graecis plane ignota, officinis autem scholarum Arabicarum usum eorum. Iure miramur inprimis Chinae geographiam optimam, quam *Bakui*, *Ibn Alvardi*, *Scherifus Edrisi*, alique scriptores Arabici produnt; assiduum enim erat et laetissimum commercium inter Bassoram et Cantonem Chinae, ubi ipsi Arabes iudicem alebant (*Anciennes relations des Indes et de la Chine*, p. 9. Paris 1718, 8.).

Quodsi paullo curatius in originem itinerum eorum ac navigationum, e quibus tot tantaque emolumenta in universam historiam naturalem manarunt, inquirimus, sola videtur imitatio Nestorianorum Arabas incitasse, ut simili ardore remotissimas adirent Orientis provincias. Certum enim habemus atque exploratum, Nestorianos iam

a septimo inde saeculo ecclesias et colonias in Chinae imperio stabilivisse. (*Assemani bibl. orient.* 3, 533.) quas in Mogolorum regionibus et in ipso Cathay, fratres Minoritae, Ioannes de *Plano Carpini* et Gulielmus *Rubruquis* saec. XIII. frequentissimas invenerunt (*Hakluyt voyages* 1, p. 28. 41. 84.). Quid quod Arabum Abuzaidi et Wahabi temporibus aderant iam Christiani in metropoli China (*Ancienn. relat. de la Chine*, p. 51. 68. 261. Cf. de Ioanne sacerdote earum regionum praecipue doctissimi *Hydii adnotationes ad Perizol.* p. 153 f. et *Marianum Sanutum* Torfellam in *Bongarsf. gesti. Dei per Francos* 2, 185.). Quum autem a Nestorianis totus cognitionum ambitus ad Arabas transierit, hoc etiam commercium cum Asia orientali, vel terrestri peregrinatione per regionem Transoxanam et desertum Kaptschaek instituta, vel navigationibus frequentioribus a Bassora ad Cantonem, immensas ipsis attulit Indiae ultra Gangem sitae et Chinae ipsius divitias.

Primi fere Arabes, qui haec Nestorianorum vestigia persequerentur, Wahabus et Abuzeidus saec. IX. fuerunt, quorum iter in orientales Asiae ditio- nes egregiam protulit historiam, a *Renaudotio* versam (*Anciennes relations des Indes et de la Chine*, 1718. Paris.) quam immerito nonnulli supposititiam habuerunt (*Deguignes in Notices et ex-*

*traits des manuscrits du Roi*, 1, 157.). Posterior his est Abu'l Hassan Aly-Massudi, saec. X. (*Herbelot, bibl. orient.* 564.) cuius aureum prae-  
 tum cosmographiam sistit, quam Deguignius in  
 epitomen redegit (*Notices et extraits* 1, 1 f.).  
 Tertius Arabum cosmographus est Scherifus Edrisi-  
 siensis Aegyptius, apud Rogerium, Normannorum  
 regem, Neapoli degens, saec. XII. (*Herbelot bibl.*  
*orient.* 786.). In opere suo cosmographico co-  
 piose de plantis egerat (*Casiri bibl. escurial.* 2,  
 12.); unde dolendum, quod epitomae, quae tum  
 arabice Romae 1592. tum latine a Maronitis, Ga-  
 briele Sionita et Ioanne Hefronita Paris. 1617. edi-  
 ta sunt, tam pauca de plantis contineat. Quartus  
 cosmographus Ebn Alvardi Halepensis saec. XIII.  
 operi suo cosmographico plantarum copiam uberri-  
 mam inferuit. Editum id fuit a Beronio Lunden-  
 nensi 1790 f., gallice autem versum a Deguignie  
 (*Notices et extraits* 2, 20 f.). Quintus cosmo-  
 graphus est celeberrimus Syriae princeps Abulfeda  
 saec. XIV. quem Reiskius latine interpretatus est  
 (*Büschings Magazin* 4, 121 f. 5, 301 f.). Sex-  
 tus Abdorraschid Bakui Persa, saec. XV., dedit  
 cosmographiam gallice versam (*Notices et extraits*  
 2, 388.), sed errorum et fabularum plenam; sic  
 Sanbul (*Nardum*) et Aoud (*Agallochum*) et Co-  
 stum in Andalusia crescere perhibet. Ultimus de-

nique est *Leo Africanus*, qui Romae 1526. Africae descriptionem edidit, impressam Lugduni Batavorum 1632. 16.

De re autem herbaria ipsa non pauci egerunt Arabes, plerique vero tanquam aliud agentes, ut, vel materiam medicam vel rem rusticam tractantes, obiter tamen descriptionem herbarum adderent. Eorum quidem primi et incertae aetatis et nationis, a posterioribus duntaxat citantur. Videntur autem plures eorum Nestoriani aut Persae fuisse.

*Cossaeus* primus est, quem interpretes latino-barbari *Alcuzi*, *Alcanzi* dicunt, a patria Cossaea (*Khufistan*) nominatus, quum a Rhazeo citetur et Serapione seniori, ante nonum saeculum vixisse videtur.

*Badigorius*, forte corruptum Pythagorae et supposititium nomen, ni fuerit Nestorianus, Rhazeo saepius dictus.

*Scharak Indus*, a Rhazeo citatus, plane ignotus.

*Abu Sahar* saec. VIII. de plantis scripsit, figuris additis iuxta Dioscoridem, peregrinator curiosus, qui plurimas orbis regiones vidisse dicitur (*Bibl. parisin. n. 968.*).

*Iahiah ebn Masawaih*, Mesues senior, Nestorii adsecla, Khalifae Harun-Arraschid (*saec. VIII.*) medicus (*Abulfarag hist. dynast. p. 237. 255. Affemani 2, 435.*). Rhazeo saepius dictus, a quo etiam solo fragmenta servata sunt,

*Hhonalihus*, Haaci filius, Nestorii sectam pariter amplexus, celeberrimus interpres, Khalifarum Bagdadensium saeculi IX. initio medicus (*Assemani* 4, 706. *Abulfarag.* 264. *Casiri* 1, 286 f.) in synonymis maxime plantarum graecis, syriacis et arabicis defudavit (*Rhaz. contin.* 21, 97.).

*Abu-Merig*, monachus dictus et *Isaac ebn Amram* plane ignoti auctores a Rhazeo laudati. *Masjeriawaihus* Iudaeus Bafforensis, interpres pandectarum Aharonis (*Abulfarag.* p. 158. 198.). *Hobaisch*, Hónáini e soro nepos (*Barhebr.* p. 170.). Rhazeo et Serapioni laudatus.

*Abu Hanifa* el Dainuri, Assyrius, de re rustica scripsit saec. X. ineunte, Serapioni saepius dictus (*Casiri* 1, 323.).

*Muhammed Abu Bekr Rhazeus*, e Rai Irakenfi urbe natus, nosocomii Bagdadensis director, ingens volumen reliquit, quod discipulorum auditiones, male saepius scriptas continet (*Barhebr. chron. syr.* 172.). Titulo El-Hhawi s. Continentis interpretatio latino-barbara prodit Boneto Locatello curante, Venetiis 1506. fol. Eius liber XXI. complectitur plantas officinales, plerasque e Dioscoride arabico, plusculis novis additis, quae melius explicari possent, ni nomina barbare scripta et nimia descriptionis brevitates obstarent. Pauca insunt botanica tractatui ceteroquin egregio *de vario-*



*lis et morbillis*, quem Io. Channing, arabice et latine Oxon. 1766. 8. edidit.

*Abu'l Fudli Schiierziita*, saec. X. scriptor utilissimus, cuius codicem manuscriptum de re herbaria et medica Ol. *Celsus* e Golii bibliotheca emtum egregie adhibuit ad plantas biblicas aliasque illustrandas.

*Ali Abbatis filius*, Persa, Emiri Bagdadensis medicus saec. X., ingens volumen, quod *regium* dicitur, reliquit, nonnisi latino-barbara interpretatione nobis notum, quam Bernardinus *Ricius de Novaria* Venetiis 1492. fol. edidit.

*Al-Huffalni Abu-Ali Ebn Sina*, vulgo *Avicenna*, Bokharensis, Emiri Raiensis medicus, dein Vefirus provinciae Hamdan, denique minister imperii Ispahanici, saec. XI. (*Abulfed. annal. moslem.* 3, 92 f. *Abulfarag.* 350. *Casiri* 1, 269.). Celebrerrimus ipse Canon arabico Romae 1593. fol. editus, libro 2. plantas medicas et notas Persisfere omnes continet. Editione hac praestantissima et nitidissima, quam iuvenis orientalium linguarum omnium peritissimus *Klaprothius* mihi dono dedit, frequenter usus sum. Differt tamen magnopere haec editio ab aliis codicibus, ab Hebraica versione, qua Plemplus usus fuit et ab interpretatione vulgari latino-barbara, quae plerumque ditior est. *Plemplus* edidit Lovanii 1658. fol. commentarium in librum 1. et 2., adhibitis codicibus plurimis.

*Ioannes Serapion*, incertae aetatis, egregium opus de materia medica reliquit, cuius interpretatione latino-barbara Gerardii Carmonensis Lugd. 1525. 4. uxor. Multo magis hic auctor ad historiam naturalem plantarum et patriam respicit, quam priores.

*Ioannes Mesuach* f. Mesue iunior, Kahirensis Khalifae medicus fuisse dicitur (*Leo Afric. p. 273.*). Pauperem reliquit de simplicibus tractatum, cuius interpretatione latino-barbara, quam *Marinus Vernet*. 1562. fol. edidit, uxor.

Migravit cum imperio Muhammedanorum scientiarum etiam ambitus ad Hispaniam, ubi sub mitissimo et saluberrimo Khalifarum Cordubensium regno quaevis scientia omnesque artes laetissime flourerunt.

De re rustica doctissimum opus conscripsit saec. XII. Abu Zachariah *Ebn Alvam* Hispalensis, cuius in bibliotheca Escurialensi latentis capita prima XVII. in Hispanum sermonem a Rodrigo *Campanes* versa Matriti 1751. edita sunt. Totius operis epitomen dedit *Casirius* (*bibl. escurial. i, 326 f.*).

Muhammed Abu'l Walid *Ebn Roschd*, vulgo *Averrhoës*. Cardubensis, iudex Andalusiae, ob contentam Muhammedis religionem acriter punitus, Marocci 1217 obiit (*Casiri i, 185.*). Opus ipsius medicum, titulo *Colliget*, latino-barbare ver-

sum a *Surjano* Venet. 1496. fól., pauca continet et parum utilia de herbis officinalibus.

Sed praestantissimus omnium auctórum Arabum est Abdallah ebn Achmed Dhiaëddiu *Ebn Beithar*, Malaga-Hispanus. Is ardore incredibili pulsus, totum orientem, herbarum colligendarum caussa, permigravit. Vésirus dein Kahirensis fuit saec. XIII. Opus ipsius, collectionem sistens amplissimam simplicium, latet etiamnum in bibl. Escorialensi (*Casiri* 1, 275.). Ipse quidem auctor nihil descripsit, nisi quod ipse viderit, ultra duo milia plantarum addidit iis, quas Dioscorides cognoverat, citatis tamen ubique maioribus et adiunctis nominibus hispanicis. Nihil magis doleo, quam quod haec rei herbariae historia conscribenda sit absque ullo Beitharidae adiumento.

Agmen claudat *Abdollarifus* Bagdadensis, cuius memorabilia Aegypti a *Whitio* arabice Oxon. 1788. et a *Wahlro* germanice 1790. edita, non paucas continent plantas egregie illustratas.

En totum fontium ambitum, e quibus sequens syllabus plantarum ab Arabibus inprimis aut primo memoratarum conscriptus est. Olim quidem credidi, *Forskalei* et *Niebuhrri* opera summum posse auxilium adferre, siquidem arabica nomina ipsa plantarum indici copioso addiderint. Curatius autem examen docuit, non magna inde speranda esse, quum nomina plantarum fere ubique alia sint, ac ab ara-

bicis scriptoribus usurpantur. Sic Forskoleus nomine *Benessedsch*, quod *Violam odoratum* apud Avicennam signat, quinque valde diversas plantas ornat: Ocimum Basilicum Forskoleo *Höbok*, Ebn Alvam, Serapioni et Avicennae est *Baderadsch*; Thymus Serpyllum *Satar* Forskoleo, Abu'l Fadli vero et Ebn Alvam ita Origanum vocat aegyptiacum: Punica Granatum *Kelkel* dicitur Rhazeo et Serapioni, *Megatsch* Ebn Alvardi, et *Rimon* Ebn Alvam ipique Forskoleo: *Kelkel* iterum *Cassia Tora* Avicennae.

Nec sola haec est aut unica difficultas. Gravior complectitur raritatem codicum Arabicorum, qui in bibliothecis maximis Parisiis, Escurialensi, Leideni, Oxoniensi latentes, a nobis nunquam ne visi quidem sunt. Serapionis itaque utilissimi, Mesuae et Rhazei libros legimus pessime et latino-barbare versos. Interpretes ii, vel malis codicibus usi, vel desidia aut negligentia aut ipsa ignorantia ducti, longe aliud saepe dicunt, quam quod auctor. Id quaevis fere pagina Avicennae luculenter docet. Unde felices saepe praedicavimus *Bochartum*, *Plempium*, *Celsium*, *Hydium*, *Casirium*, quibus usus codicum Arabicorum concessus erat.

Accedit tamen et codicum mira varietas. Quos *Plempius* comparavit, eam differentiam habuerunt: et ipse noster Avicenna Romae impressus in-

numeris scatet locis, quae nec ab interpretibus medii aevi, nec ab aliis lecta fuerunt.

Ipsi Arabes, solo fere Beitharide excepto, *αβανολόγητοι*, praeceptoribus suis, Nestorianis, confidentes, Graecorum descriptiones, nonnunquam ita perverterunt, ut Oedipo opus sit, dum, quid intellexerint, scire voluerimus. Unicam huius rei exemplum adferam. Dioscorides (3, 58.) *Λγυστικόν* suum crescere in Apennino, montē Alpi- bus confini, perhibet. *Avicenna* (lib. 2. p. 169. Rom.) de *زوفرا* loquens, addit, iuxta Dioscoridis sententiam crescere in monte Acabis (*اقابيس*), qui conterminus sit provinciae Aegypti. Acabis illud sine dubio corruptum est ex *افنين* (*Apenin*).

Nihilominus audaces fortuna iuvat! Nos quidem, difficultate laborum tantum abest, ut unquam deterriti ut potius et iam magis adlecti ac excitati fuerimus. Tamdiu enim ac toties desudavimus in hoc studiorum genere, ut longe plura maioribus nostris clara ac perspicua, videamus. Audacter itaque adgrediamur

#### FLORAM ARABUM.

Omittenda autem sunt, quae nimis nota Graecis, ab Arabibus haud amplius illustrata fuerunt, adductis duntaxat iis, quae Arabum studio uberius patefacta sunt.

*Anomum Zingiber* *زنجبيل* *Avic.* 166. e. *Dio-*

scoride plura adducit, quam noster continet, totumque caput sequens de Hydropipere huc trahit, quod alio loco rursus occurrit. In Hispania videntur Arabes id coluisse, namque *Ebn Alvam* culturam tangit (*Casiri* 1, 336.). Culturam, qualem in Calicut viderit, bene describit Lud. *Barthema* (*Ramusio*, 1, f. 174. b.). . . *Am. Zerumbet* زرنبد *Masferdschawaiho* et *Mesui* seniori iam dictum (*Rhaz. contin.* 22, c. 362.). *Avicenna* 166. radicem plantae dicit, similem cypero, sed maiorem, et minus aromaticam, colore pulveraceo, adferri autem e Sin, quae peninsula est ultra Gangem et ipsa China. Apud Scorpionem (c. 172.) Isaac ebn Amram radicem hanc cum Aristolochia rotunda comparat, sed colorem et saporem esse Zingiberis. *Garcias* (*Clus. exot.* 215.) in Malabaria primus eam speciem invenit, et sylvestris Zingiberis nomine notam esse incolis perhibet. Folia latiora esse foliis Zingiberis bene *Murrayus* (*nov. comm. gött.* 6, 26.) animadvertit. . . *Am. Zedoaria* جدوار. *Masferdschawaihus* virtutem debiliorem Doronico iudicaverat, quem refutat *Avicenna* 155. eo potissimum argumento, quod Zedoaria prope a Napello (پیش) crescere soleat, et ipsius antidotum sit. Haec vero fidem superant, ni پیش illud indica fuerit planta venenata, quam commutarunt Arabes cum Aconito veterum. Cf. *Angelum de S. Iosepho ad Pharmacop. pers.* p. 369.

Fructus huius speciei *Cardamomum* fistunt, قاتلط *Avic.* 243., cuius maiorem et minorem varietatem cognorunt, priorem Isaac ebn Amram (*Serap.* c. 64.) praefert. Locum natalem Scherifus *Edrisi* (*geogr. nub.* 65.) indicat, nempe Fandarinam Indiae: similem autem esse fructum semini cannabis. . . *Alpinia Galanga* خولجان *Avic.* 270. f. خالونجان 272. et diverso capite خسروداروا 270. quam iuxta *Masferdschawaihum* habet speciem vi-  
liorem. Primam deferri e Sina, manifesto Isaac ebn Amram perhibet (*Serap.* c. 352.). Haec est minor odorata, quam egregie *Garcias* (*Clus. exot.* 211.) illustravit. Altera maior, e Iava et Sumatra proveniens, erit *Kämpfera Galanga*. . . *Curcuma rotunda* خاليدونون *Avic.* 275. Sed duas simul appellationes habet مزرجوش et مزعيران. E priore Khalidumenun fecerunt latinobarbari *Che-  
lidonium*. Inveniri autem in Malabarica *Garcias* (*Clus. exot.* 210.) in regno Conchae *Marcus Pau-  
lus* (*Ramusio* 2. f. 48. b.). . . *Iasminum Sambac* زنبق *Abulfadli* apud *Cels. hierob.* 1, 384. Ne-  
que tamen alii flores odorati ab hac denominatione excluduntur. . . *Iasmin. fruticans* يسمين *Ebn Alvam* apud *Castr.* 1, 329., ubi et aliae species intelliguntur. Citrinos enim (*Iasminum humile*) ut et *Mesue* se-  
nior (*Rhaz. contin.* 22. c. 838.) ab aliis floribus distinguit. Isaac ebn Amram (*Serap.* c. 176.) manifesto etiam distinguit albos a citrinis et hos a

coelestibus floribus: idem autem esse Sambac et lasminum. Et hodie in Arabia colitur I. Sambac (nomine **فل**) et *I. officinale*, Forskoleus adfirmat (*flor. arab. p. 56. 102.*). . . *Salvia haematodes* forte est Behen rubrum **بهمن الأحمر** *Abulfadli* apud *Hyde (relig. vet. Pers. p. 510.)* Folium enim latum, sicut folium **خبازي** *Malvaceae*, in quo reperiuntur maculae fuscae, radicem longam et crassam. Breviter eam cum albo Behen tangit *Avic. 141.* Ex Armenia provenire Mesue apud *Serap. c. 223.* *Rautwolfius it. 288.* de solo albo loquitur, quod Centaurea Behen est. . . *Fraxinus Ornus* **لسان العصائير** *Avic. 200. Serap. 226.* Lingua avis omnibus fere Arabistis dicta. Cf. *Matth. Sylvat. c. 511.* . . *Piper Betle* **تنبل** *Avic. 265.* Prima certe et optima descriptio. Esse folium simile Limonio (**ليمون**) ab Indis masticatum cum calce et nuce Arecae (*Fausel*) unde dentes rubrum adsumant colorem, odoris autem optimi esse. Bene id illustravit *Garcias (Clus. exot. 175.)*, uberius etiam *Angelus de S. Iosepho (Pharmacop. pers. p. 368.)*. Tembul nomine describit ipse *Marcus Paulus saec. XIII. (Ramusio 2. f. 56. a.)*. . . *Pip. Cubeba* **كبابه** *Avic. 191.* E Sin apportari, quod *Garcias (Clus. exot. 184.)* ita explicat, ut e Sumatra et Iava, ubi frequenter nascatur, in Sinam apportari dicat. *Serapion* quidem (*c. 288.*) *Dioscoridis* Ruscum aculeatum huc trahit, ipse tamen



ad finem capitis fatetur, hanc descriptionem satis male quadrare. . . *Pip. nigrum* فلفل *Serap. c. 367. Avic. 236. Bakui (Notices et extraits 2, 418.)* in Malabaria crescere in locis humidis, fructus a foliis obumbrari, alioquin enim a solis calore corrumpi. *Abulfeda (Büschings Mag. 4, 270.)* ibidem arbores scandere ait. . . *Pip. longum* نار فلفل *Avic. 159. Cf. Garc. apud Clus. exot. 182.*

*Iris tuberosa* سوم نجان *Avic. 220.* Ferre flores albos et citrinos, folia terrae proxima, crescere ad montes. Distinxerunt Arabes rubram ab alba radice, illam esse venenatam, hanc calidam et siccam. Sed Serapion applicat ad hanc herbam, quae de Colchico dixerat Dioscorides (*Serap. c. 194.*). Hinc *Hermodactylorum* non una species: nostra venenata, fusco colore florum distinguitur; alba et citrina videtur cum Iride florentina quadrare. Cf. *Io. Bauhin. hist. 2, 750. 731. . . Ficus Beniamina* Nux Mechel f. Rachaba *Serap. c. 164.* Arbo-rem esse ficui simillimam, fructus parvos ferre pendulos ad basin foliorum, comedi etiam a pastoribus. Varingae parvifoliae nomine *Rumphius amboin. 3, 139.* hanc speciem illustravit. . . *Fic. Sycomorus* جبین. Optima descriptio apud *Abdolla-tifum p. 11.* Fructus uberrimos ferre, ut per quatuor menses iis Aegyptii nutriantur, sed prius incidi debere, ut acre lac effluat. Cf. *Abulfadli apud Cels. hierob. L, 511. . . ficus religiosa* est ea spe-

cies, quam *Abu Hanifa* apud *Abdollahifum* p. 13. describit, fructibus sessilibus. Ex India in Arabiam et Aegyptum migravit. . . *Fic. bengulensis* فك *Avic.* 158. Cf. *Forsk.* p. 179. Sed *Avic.* commutat cum Platano Graecorum. . . *Saccharum officinarum* سكر. Prima certe huius graminis mentio fit in itinerario *Abusaidi*, quod *Renaudotius* vertit (*Anciennes relat.* p. 101.) ubi id ad Siraf crescere perhibet. In Almanfura Indiae (urbs ab Almanfore condita, *Bakui notices* 2, 419.) sponte provenire *Abulfeda* (*Büschings Mag.* 4, 269.), ad Gondisaporam prope Euphratem *Moses Chorenensis* (*geogr.* p. 364.). Coli autem in Andalusia *Scherifus Edrifi* (*Geogr. nub.* 149.). Unde et *Ebn Alwam* modum colendi et succum eliciendi describit (*Casiri* 1, 330.). Culturam in Aegypto docet *Schemsedin* (*Notices et extraits* 1, 266.) optimum crescere ad Asjut docet *Abu Obeid* Cordubensis (*Casir.* 2, 2.). Bene distinguitur hoc saccharum a melle banibusae: huius optima et purissima species vocatur سليمانى f. regia, vilior, quam saccharum farinae appellamus فنيذ (fenid). Cf. *Rhaz.* c. 393. *Serap.* c. 50. Durum saccharum candum securi percutiendum, vocabatur طبرزد. De Fenid loquitur *Avic.* 235. in provincia Mekhran, quam Indus perfluit, e coctis arundinibus elici eum succum, e quo paretur id grossum saccharum. Ab Arabibus sine dubio sac-

charum per plures regiones propagatum, Christianis tandem occidentalibus innotuit. *Albertus Aquensis* (*Bongars gesta Dei per Francos*, 1, 270.) in agro tripolitano zucram coli, calamellum (cannamelum); *Fulcherus Carnotensis* a. 1099. circa Laodiceam *cannamellos* hps invenit (*Bongars*, 1, 401.) *Gulielmus Tyrius* in Idumaea (*ib.* 835.). *Marinus Sanutus* 1306. in Cypro summa quantitate: „et in Sicilia nasceretur si hoc procuraretur“ (*Bongars* 2, 24.). . . *Andropogon Nardus* سنبل *Abulfadli* apud *Cels. hier.* 2, 2. manifesto dicit idem esse سنبل cum Graecorum *νάρις*. E Java praeprimis provenire testatur *Bakui* (*Notices et extr.* 2, 397.). Bene distinguit *Avicenna* (225.) romanam ab indica et syriaca. Illam multo viliorē esse: est enim Valeriana celtica. Cf. *Serap.* c. 52, *Clas. exot.* p. 201. 202. . . *Androp. Schoenanthus* أبخر *Avic.* 127. Duas species facit, arabicam et أجامي, quae Nabataea forte est: namque Adscham est mons in Hedschas (*Bakui* l. c. 409.). Optime spicas describit Abu Hanifa apud *Serap.* c. 19. . . *Sorghum vulgare* ذرة, دحن vel etiam *bicolor*, a pristinis inde temporibus per totum Orientem cultum, a *Forskoleo* sub nomine *Holci Durrae* et *Dochnae* (*flor. arab.* 174.) describitur. *Niebuhrus* (*Beschreib. von Arabien* 154.) tres per annua menses praebere et quadringenties multiplicari adserit. *Ebn Alvam* (*Casiri* 1, 552.) etiam in Hispania ab

Arabibus cultum fuisse, Scherifus *Eddrisi* (*geogr. nub.* 9.) vinum etiam, seu potius cerevisiam inde confici testatur.

*Fagara Avicenna* Juss. *Lam. encycl.* 2, 445. *فافة* *Avic.* 236. breviter tantummodo tangit, femina cum cannabis feminibus comparat, apportari autem e Sofala. Similia habet *Serapion* (*c.* 200.) e Mesue et ebn Amram. Bene illustravit et delineavit fructum *Clusius* (*exot.* 185.). Ex India transgangetica et Sina sine dubio Arabibus apportabatur: e Sina quoque Inearvillius Jussieu misit. . . *Cissus vitiginea* *حبالا* (*ἀμωμον* veterum). Supra iam probabili coniectura adsequutus sum, Amomum veterum huc pertinere. Id vero nunc ad certitudinis speciem quamdam evehendum est, quum Arabes uberius suum Hamama describant quam Graeci *ἀμωμον*, Incipiam autem ab *Avicenna*, qui *p.* 173. fruticem nominat, vitis modo arboribus circumplicatum, foliis Bryoniae, floribus Cheiranthi colore, ligno odorato hyacinthino (*يقوت*). Optimam speciem esse, quae fulvo colore sit, e montibus Armeniae veniat et odore suavi polleat: peiorem viridem, odore rutaceo, e locis humidis proveniente. His addit *Honainus* apud *Serap.* *c.* 279. ingredi et lignum et baccas medicamenta odorifera atque adeo inebriare. Rubellum autem florem indicat *Davides Antiochenus* apud *Hydium* (*ad Periscol.* *p.* 103.) alique, quos idem citat, acrem arquat-

cum saporem baccharum praedicant. Summa confusio orta fuit medio aevo ex incuria eius, qui Serapionem interpretatus erat. Vertit enim *Hammama* pedem columbinum, unde seplasiarii fere omnes *Geranium columbinum* aut molle pro eo habuerunt. Primus fere refutavit eum errorem *Ruellius* (*nat. stirp.* 1, 232.). His omnibus rite perpenſis, Anguillaraeque supra citato loco adſumto, non poſſum quin huic ſpeciei adiudicem, quidquid Arabes de *حبال* ſuo perhibuerunt. Folia enim cordato-subrotunda lobata utrinque villoſa, ſemper fulva, flores pallidi, baccae acri aromate praegnantες coeruleſcentes, lignum odoratum ſubrubens in hac planta conviniunt. *Rauwolfius* p. 128. ipſe ex Armenia acceperat. Primus delineavit *Pluknetius* (*mantiff.* t. 337. f. 4.) uberius deſcripſerunt *Lamarkius* (*encycl.* 1, 30.) et *Vahlus* (*ſymbol.* 3, 18.). . . *Ciſſus rotundifolia* *ريحان السليم* *Avic.* 252. Fruticem deſcribit arbores ſcandentem, umbellis flavidis, quale *Ane-thum* habeat, floribus exiguis, folio, quali gaudeant *Malvaceae* (*الخطبي*) forte *Sida cordifolia*, quae per Arabiam creſcit). Hanc ſpeciem primus *Forskoleus* *Saelanthi* nomine p. 35. deſcripſit et *tab.* 4. delineavit: uberius illuſtravit ſummus *Vahlus* (*ſymbol.* 3, 19.). . . *Santalum album* *صندل* *Avic.* 241. Ubi *Santalum rubrum* citat, album etiam adducit, *Macaffarenſe* vocari, e *Sin* autem

(*India transgangetica*) advehi et praestantissimam speciem esse. Cf. *Serap. c.* 346. In ea Indiae parte, maxime vero in Timor insula quoque invenerunt *Garcias* (*Clus. exot.* 173.) et Ant. *Pigafetta* (*Ramusio* 1, f. 396. a.): mirum, quod, quid sibi velit Macassar, *Garcias* nesciverit. Est autem Celebis insulae synonymon (*Barros decada* 4. *da Asia*, p. 628.).

*Cyclamen persicum* قنبلاشوس *Avic.* 240. Esse speciem persicam Arthanitae. . . *Convolvulus Turpethum* قنبط *Avic.* 264. Ex India adferri. *Mesue* (*Rhaz. c.* 173.) primus fere est, qui id drastrictum purgans adhibuerit. Cf. *Serap. c.* 330. *Mesue iun. f.* 67. commutat cum planta ferulacea, quam Linnaeus dixit *Seseli Turbith*. Egregie *Garcias* (*Clus. exot.* 206.) historiam verae speciei illustrat, qualem in India cisgangetica invenit. Figuram dat *Hermannus lugdb. t.* 178. 179. . . *Coffea arabica*. Primum ac optimum huius potus vestigium reperisse mihi videor apud *Avicennam p.* 261. titulo شراب, ubi قهوة manifesto dicitur. Nominem enim بن, quali nunc insigniunt Arabes arborem, haudquaquam occurrit. . . *Mussaenda frondosa* لاجبة *Avic.* 199. Arbor apibus gratissima, folio colorato, flore rubro in paniculam disposito. . . *Ophiorrhiza Mungos* لحيمة *Avic.* 199. Bona descriptio apud *Kämpfer amoen. exot.* 577. . . *Datura Metel* جاونر مائل *Avic.* 156. Esse venenum

narcoticum in capsulis spinosis. Cf. *Serap.* c. 575. . .  
*Hyoscyamus pufillus*, *muticus* et *reticulatus* بنج  
*Avic.* 145. Primus flavo, secundus albo, tertius  
 purpureo (امر جوان) colore. Cf. *Serap.* c. 340. . .  
*Atropa Mandragora* لوفحا *Avic.* 198. et يبروح  
 187. Fabulas multas de hac planta superstitiosa  
 circumtulerunt Arabes et Persae, praesertim *Luth-*  
*fallah*, auctor lexici perfici (*Casiri* 2, 351.) quas  
 citat *Herbelot (bibl. orient. p. 17.)* et repetit *Iac.*  
*de Vitriaco (Bongars gesta Dei per Francos, 1,*  
*1099.)*. In vetusto codice Dioscoridis Cantacuze-  
 no icon est Dioscoridis et εὐφροσύνης, ut feminae.  
 Canis interest, a Mandragora ἀνδρωπομέγεθος, quam  
 femina tenet, enectus (*Lambec. bibl. vindob. lib. 2.*  
*p. 566.)*. . . *Solanum* forte *aethiopicum* مريص,  
 quod *Serapion* c. 343. ut speciem *Atropae* descri-  
 bit. . . *Sol. Melongena* بادنجان *Avic.* 144. . .  
*Sol. insanum* حدق *Abulfadli* apud *Celf. hie-*  
*rob.* 2, 44. . . *Strychnos Nux vomica* جالوز  
 القبي *Serap.* c. 164. *Hobeischus* primus commen-  
 dasse id remedium, ut vomitus cieatur, descrip-  
 sisse etiam videtur. Non in India sola, sed in Persia  
 etiam crescit (*Chiardin' voy. en Perse* 3, 14. . .  
*Strychnos colubrinus* دند الصينى *Avic.* 2, 125.  
 ob venenatam ligni qualitatem memorabilis. Ad  
 purgandum tamen usurpant *Abugerig* et alii apud  
*Serap.* c. 358. Cf. *Garc.* apud *Clus. exot.* 215.  
 Nescio fitne aliud lignum colubrinum, quod *Ibn*

*Alvardi* (notices 2, 37.) in Karkar ad ripas Nili indicat. Videtur faltem, quum Scherifus Eddrifi (geogr. nub. 14.) nigrum colorem ipsi tribuat. . . ?*Ignatia amara* نارمشكى Avic. 1, 215. Conveniunt faltem patria (insulae maximae orientales) flores odorati, femina angulata aromatica acria. . . *Ardisia humilis* مورنفرم Avic. 1, 211. Comparatio cum Rusco et patria (Sina) me induxit ut huc traherem: sed de viribus roborantibus, quas Arabes praedicant, nil innotescit. . . *Cordia Myxa* نخ Avic. 156. *Abdollar.* 9—11, qui praefertim amplam descriptionem, partim ex Abu-Hanifa et Dañnari adfert; edulem esse fructum, in Persia autem venenatum, nucleum valde amarum. Cf. *Alpin. aegypt.* 30. . . *Cordia Sebestena* غبريا et سبستان Ebn Alvam apud *Casir.* 1, 329. 337. Colebatur in Hispania arabica: drupae edules. Bona descriptio Isaaci *ebn Amram* apud *Serap.* c. 8. . . *Zizyphus Lotus* سلم Avic. 220. et fructus نبق. Hunc adeo gratissimum Arabes fere omnes invenerunt, maxime eam varietatem, quae in provincia Adel crescat, cuius drupae incredibili gaudeant suavitate et odore gratissimo, ut et regibus offeratur, et in paradiso a feminis coelicolis, quas Hury vocant, defunctis tradantur (*Serap.* c. 120. *Herbelot bibl. orient.* p. 796.). In Hispania colebatur, teste Ebn Alvam (*Casiri* 1, 328.). Patriam peculiarem tamen habet Tunetanum regnum Scherifus



Edrisi (*geogr. nub.* 77.). Dici etiam سلم testatur *Abulfadli* (*Celf. hierob.* 2, 191.). Cf. *Shaws travels*, app. p. 47. n. 632. . . *Zizyphus vulgaris* ضل *Abulfadli* l. c. . . *Ziz. Paliurus* مېش Ebn Alvam apud Casir. 1, 330. *Abulfadli* apud *Celf. hierob.*, 20. male Lotum graece nominari dicit. . . *Ziz. Spina Christi* عوسج *Avic.* 232. Cf. *Alpin. aegypt.* 43. *Rauwolf* 381. qui manifesto adfirmat, coronam Christi servatoris e spinis huius arboris plexam fuisse, quippe quae circa Hierosolymas satis frequens sit. . . ? *Cerbera manghas* جلاهنك *Avic.* 152. Arbor venenata lactescens indica, flore luteo: cuius succus inspissatus cum Turbith congruat. . . *Gardenia gum-mifera* Thunb. *diff.* 2, 16. 20. Gummi praebet cum Elemi Indiae occidentalis satis congruum. Describunt autem Arabes قنقهلم suum (καρχαμον Graecorum) ita, ut ad Elemi hoc, quod vel ex Amyride zeylanica vel e *Gardenia* nostra elicitur, trans-eant. Cf. *Antiqu. bot.* p. 84 f. . . *Nerium Oleander* دغلي Manifesto Beitharides hanc intelligit (*Bochart. hieroz.* 1, 699.). Sed *Avic.* p. 158. distinguit duas species, quarum fluviatilis est nostra, sed sylvestris est spinosa, foliis salicinis, forte *N. salicinum* Vahl. . . *Cynanchum viminale* صرخ *Hyde relig. Perf.* 335. Est fomes ad excipiendum ignem. *Forskoleus* p. 53. peculiarem habet speciem, sed immerito. . . *Asclepias gigantea* f. *procera* Ait. عشي *Avic.* 233. Venenatissimam lacte-

scentem habet, in Arabia yemenica crescentem. Sed saccharum tamen in Yemen et Hedschas, velut salis frusta, in eius foliis produci, quod nigrum et vilioris indolis sit. Abu Hanifa apud *Serap.* c. 50. et lac et saccharum ipsum laudat adversus hydropes. Esse autem id saccharum amaricans simul et acre, vocari arborem etiam *Scherzehre*. Hanc Persarum *Scherzehre* illustravit et icone e Thevenoto *Hydus (relig. vet. Pers. 335.)*. Aliam iconem habet *Alpinus aegypt.* p. 86. qui Beidalosar vocat. Optime describit, qualem arborem hanc ad oras Persici sinus saepe viderit, *Angelus de S. Josepho (ad Pharmac. pers. p. 361.)*. Letiferum esse succum lacteum adfirmat et ipsam umbram pecoribus: quod confirmat *Chardinus (voy. en Perse 3, 13.)*. Cf. et *Niebuhr ii Arabiam 150.* et *Salmas. hyl. iatr.* p. 109. Est ceteroquin saccharum illud productum vegeto-animale ex aphidibus et cynipum genere, quod nidulans in foliis ea contrahit atqueglomera haec saccharina aut mellea efficit. . . *Atriplex hortensis* سمرق Ebn Alvam apud *Casir.* 1, 333. . . *Atriplex Halimus* ملوخ *Avic.* 211. Manifesto enim *Beitharides (Bochart hieroz. 2, 225.)* ad hanc speciem trahit. . . *Salsola fruticosa* f. *Anabufis aphylla* قلي vel etiam اننان *Avic.* 248. *Setap.* c. 257. *Rauwolf.* 37. . . *Ferula persica* et *Asa foetida* انجدان *Avic.* 150. succus حلتيت et radix محروث *ib.* p. 211. *Serap.* c. 251. Cf.

*Hyde ad Perizol. p. 163.* In Segestana Persiae praeprimis copiosam esse hanc ferulam *Abulfed.* (*Büschings Mag. 4, 263.*). E Corasan Indiam advehi, *Garcias* apud *Clus. exot. 152*, prae omnibus autem *Kämpfer amoen. exot. 540 — 552.* . . *Daucus lucidus* intelligi videtur, ubi Arabes (*Avic. 206.*) de bdellio ficulo loquuntur, aut ubi storacem liquidam in Calabria reperiri aiunt (*Plateur. circa instans, f. 248 c.*). Namque gummi emanat odoriferum (*Boccone mus. 1, 30.* . . *Pastinaca Secacul Russel Alepp. p. 157.* *Tordylium Secacul Mill. dict. ic. t. 268.* شقائق *Avic. 257.* Radix saccharo condita aphrodisiaca putatur. *Rauwolf p. 74.* cum ic. *Averrhoës* tamen (*Coll. lib. 5. f. 85 a.*) Hispanorum Panical (*Panicaut Gallorum*) *Eryngium* huc trahit. . . *Semecarpus Anacardium* بلاندر *Avic. 141.* Fructum cum nucleo dactylorum, *Serap. c. 356.* cum corde avis conferunt, rubro colore praeditum esse, adferri e Sin, sed etiam ex ignivomo monte Siciliae, in quo bonus Arabs vehementer fallitur. In Cavanor et Calicut Indiae invenit *Garcias* (*Clus. exot. 198.*). . . *Tamarix orientalis f. articulata* كشت *Avic. 192.* vel قسط 2, 212. Melleus humor in foliis redundat, de quo *Angelus a S. Iosepho ad pharmac. pers. p. 360.* *Beitharides* apud Channing ad *Rhaz. de variol. p. 179.* vocat شیرخشک. Cf. *Garc.* apud *Clus. exot. 164.* . . *Musa paradisiaca* هون, quam Graeci obiter tantum

et per traditionem cognoverant, Arabes, ex India transplantatam adeo adamarunt, ut *Abdellatifus* p. 20 f. eximiam et graphicam omnino descriptionem dederit. Credidit autem cum Colocasia et Phoenice aequae cognatam esse; radicis propaginibus multiplicari, folia elegantissima et amplissima, florem spathaceum, plerumque albidum: fructus continere femininum rudimenta abortientia. Apud eundem *Abu Hanifa*: patriam esse Oman Arabiae felicitis, ubi duorum duntaxat mensium opus sit, ut planta fructum ferat: e foliis etiam elegantissimos parari tapetes. Scherifus Edrifi (*geogr. nub.* p. 28.) quinque habet varietates, quae in terra Zingitana crescunt. Hunc esse fructum, quem primis parentibus interdixit Deus, narrat *Leo Africanus* (p. 771.) unde et Jac. de *Vitriaco* arborem paradisi vocat (*Bongars gesta Dei per Francos*, 1, 1099.).

*Narcissus orientalis* نرجس et *Ionquilla* قسرين  
*Avic.* 214. Ex utroque oleum parabatur, ex hac specie debilius. Colebatur utraque in Hispania. Ebn Alvam apud *Casir.* 1, 334. Hic credit Nefrin esse Rosam moschatam, sed *Avic.* manifesto dicit, 242. Narcissi speciem esse. . . *Aloë perfoliata* صبر  
*Avic.* Multo melius eam cognoscere debuerunt Arabes, quum in patria cresceret. Distinguunt autem tres varietates, *succotrinam* optimam, *arabicam* et *semandschanaeam*. Cf. *Geogr. nub.* p. 23. Succotoram insulam fabulantur Aristotelem discipulo

Alexandro praeprimis commendasse, ut pretiosum id medicamentum inde obtineret (*Ancienn. relat. p. 113.*). . . *Lilium candidum* سوسن *Avic. 220.* Sed plura notat, quae et in *Iridem* forte *susianam* quadrant. E bulbis parantur faeculae, quae fucum candidissimum praebent, كتم forte, quo cum Henna usus fuit Mohammedes (*Abulfed. vit. Muham. p. 65.*). Cf. *Murhard. in elegant. Zeit. 1807. N. 31.* . . . *Bambusa arundinacea* قصب, unde *mel arundinis* عسل القصب *Avic. 225.* Id in Khesran, urbe persica, maxime parabatur (*Bakui in Notices, 2, 452.*) et apud Mandurkham Indiae e sacco sacchari *Tebaschir* dictum (*ib. 419.*) طباشير *Avic. 189.* Classicus est locus Beitharidis apud *Channing. in edit. Rhazei de variol. p. 63 f.* Cf. *Salmas. hyl. iatr. p. 255.* *Ruffel. et Macie in philof. transact. vol. 80, 273. 81, 368.* *Ludgers diff. de Tabaschir, Gott. 1791. 8.* *Humboldtius (plant. aequinoct. p. 70.)* similem concretionem et in nodis *Bambusae Guaduae*, quae in monte *Quindiu* *Americae meridionalis* crescit, observavit. . . *Calamus rudentum* est forte كبرن illud, quod in India vulgare dicitur (*Bakui in Notices 2, 416.* *Abulfed. Büschings Magaz. 4, 272.*). Cf. *Salmas. l. c.* . . . *Calamus Zalacca* ديوناك *Avic. 159.* forte etiam بل 144. Sed dubius haereo. *I. Bauhinus* saltem (*hist. 1, 403.*) huc trahit. . . *Calamus Rotung*, unde *Sanguis draconis* دم الثعبان

aut حرنغ pers. (*Hyde ad Perizol. p. 111. Kämpfer. amoen. exot. 552.*). *Avicenna* dicit دم الاخوين sanguinem duorum fratrum, p. 160. Vehementer fallitur *Serapion* c. 331. dum descriptionem *Phellandrii Mutellinae* apud *Dioscor.* 4, 35. huc trahit.

*Amyris gileadensis* بلسان *Avic.* 140. Hunc fruticem licet Graeci et Romani iam cognoverint, Arabes tamen multo frequentius coluerunt. *Avicenna* aegyptiacum habet fruticem, staturae *Lycii europaei*, odore *Rutae*. Crescere autem praecipue ad *Heliopolin* (عين شمس) quod confirmat *Abdollarifus* p. 13. Is addit etiam, e radicum propaginibus spurium oriri in aliis regionibus fruticem, qui oleum non largiatur, vocari المشم, et provenire per Arabiam et Persiam. In sola *Heliopoli* coli, *Ebn Alvardi*, *Bakui* (*Notices et extraits* 2, 29. 445.), *Marianus Sanutus* Torfella (*Bongars gesta Dei per Francos*, 2, 260.) et *Iacobus de Vitriaco* (ib. 1, 1128.) adfirmant. . . *Amyris Opopobalsamum* sine dubio est illud المشم, de quo *Abdollarifus* loquitur, vocatur enim haec species ita in Arabia (*Forskol. p. 79, 80.*). *Abulfadli* tamen nomine بكا etiam hanc distinguit. Ferre enim folia longiora quam *Bascham* et fructus maiores (*Cels. hierob. 1, 339.*). Cf. *Alpin. aegypt.* 60. . . *Amyris Kataf* *Forsk.*, ut supra iam monuimus, arbor esse turifera videtur, quam Arabes كندر et لبن vocant. *Abulfadli* apud *Cels.* 1, 231.

*Avic.* 132. *Egallochum secundarium* maculis et venis variis, odoratum, cuius optima varietas ad Tschampacam crescit. Cf. *Rumph. amboin.* 2, 54. 35. *Cavan. diff.* 7, 377. . . *Terminalia Chebula* بلح *Avic.* 144. Alterum nomen هلج, non huic foli speciei, sed et Phyllantho Emblicae et ipsi Meliae Azedarach convenit: hinc vagum est. Sed distinxerunt cum Avicenna Arabes fere omnes citrinum fructum a kebalenfi, subnigro hoc et subrubro. Esse autem utrumque eiusdem arboris, primam enim messim illum, secundam hunc largiri. Confuerunt medio aevo quinque species numerare, ad versum illum:

„Myrobalanorum species sunt quinque bonorum:  
„Citrus, Chebulus, Belliricus, Emblicus, Indus.“

(*Mus. Brasav. exam. simpl.* p. 222. Vox kebalensis, quae a Latinobarbaris in *Belliricos kebuli* mutata fuit, originem habet ab urbe Kabol in Zablestan, non, quod ibi proveniant, sed quod mercatores eo deferant (*Abulfed. Büschings Mag.* 5, 352.). Ab eadem arbore varios hos fructus venire, *Adansonius* etiam nuperis temporibus testatus est (*Famill. des plantes* 2, 447.). Qui Myrobalanorum species illustrarunt, *Garcias* et *Costa*, in solo fere Phyllantho substituerunt, *Terminaliam* nostram nemo ante *Königium* (*Retz. observ.* 5, 31.) cognovit. In Calicut et Cananor praecipue invenit my-

robalanos kebalenses Odoard: *Barbessa* (*Ramusio* 1, 359. a.) *Gärtnerus* (*de fruct. et sem.* 2, 90. 91.) optime kebulos et citrinos myrobalanos ad eandem speciem pertinere, belliricos autem specie differre. Cf. *antiquit. bot.* 100. . . *Peganum Harmala* حرمج Avic. 174. *Serap. c.* 285. Bona descriptio apud hunc, ad capsulam usque trivalvem. Adhibebatur ut purgans. Sed male interpret *Averrhoës* (*lib.* 5. f. 87. b.) *Cicutam* reddit. . . ? *Aegle Marmelos* Correæ de Serra (*Crataeva* Linn.) سبب *Serap. c.* 261. Fructus est Indicus cydoniæ similis aureus et calefaciens. Cf. *Rumph. amboin.* 1, t. 81. . . *Garcinia Mangostana* جاكوز حندم Avic. 152. Est fructus mellei saporis, magnopere delectans. In Malacca praeprimis frequens *Rumph. amboin.* 1, t. 43. *Le Gentil* (*itiner.* 1, 608.). Hicne est fructus, quem *Philostratus* (*vit. Apollon.* 3, 6.) describit? . . *Euphorbia nereifolia* مهونا Avic. 210. Lactescentem et subvenenosam esse plantam, cuius folia rariora Nerio similia sint.

*Eugenia caryophyllea* قرنفل Avic. 243. *Serap. c.* 319. Caryophylli aromatici ab Arabibus primis ex India advecti fuerunt. Bakui patriam Sandabil appellat (*Notices* 2, 401.). *Marcus Paulus* regnum Caindu tibetanum (*Ramusio* 2, 35. a.) ubi egregie describit arborem; Ant. *Pigafetta* bene delineat, ut viderit frequentissime in insula Gilolo (*Ramusio* 1, 394. a.). . . *Prunus Maha-*



*leb* ملح *Avic.* 210. *Serap.* c. 44. Ex Hispania  
 adferebatur. . . *Corchorus olitorius* ملوخيبة *Avic.*  
 212. *Abdollar.* 8. Planta edulis, sed stomacho  
 nocens. *Moses Maimonides* etiam speciem cogno-  
 verat, quae forte est *C. aestuans* (Cf. *Wahl. ad*  
*Abdollar.* p. 40.). . . *Glaucium luteum* ملحيثا  
*Avic.* 210. *Beitharides* apud *Channing.* ad *Rhaz.*  
*de variol.* 110. Succus defaecatus in globulos for-  
 matus ad collyria adhibebatur. . . *Thea viridis*  
 ثي (Tfah.). Prima eius mentio occurrit in itine-  
 rario Arabum saeculi IX., quod *Renaudotius* edi-  
 dit (*Ancienn. relat.* p. 31.) ubi frutex appellatur,  
 foliis punicae sed suaveolentibus; haec infundia qua  
 bulliente et remedium adversus omnes morbos pu-  
 tari. . . ? *Aconitum album* f. *ochroleucum* بيش  
*Avic.* 147. Recens radix venenata, ficcata inno-  
 cua. *Angelus* a S. Iosepho (*ad pharmac. pers.* p.  
 359.) adserit, a Persis hanc radicem obsoniis mis-  
 ceri. Credebatur olim; ipsi Napelli toxico eodem  
 modo obfata ac *Aconitum Anthorae*. Sed hario-  
 lantur Arabes etiam circa nostrum Napellum, quem  
 بيش موش بوجا vocant (*Avic.* 150.), ignotum  
 ipsis, quum in Arabia et Persia crescere non videat-  
 ur. Fallitur *Avicenna*, dum ad Napellum histo-  
 riam *Cicutae* apud *Galen. facult. simpl.* 3, 38. tra-  
 ducit. Nonne itaque cum *Fuchsio* (*paradox. f.* 17.  
 a.) contendamus, Arabibus ignotum fuisse *Aco-*  
*nitum*? Defendere studet *Matthiolus* (*comm.* p.

769.) Avicennam, dum sibi missam fuisse ex Oriente radicem Anthorae, Zedoariae nomine, quae cum Napello Moyfi Avic. (*Bisch musch*) congruat, testatur. Sed fateor, me haec omnia clare non perspicere.

*Ocimum monachorum* فلنجشكى Avic. 236.  
*Serap. c. 156. . . Oc. basilicum* بادرج Avic. 146.  
*Serap. c. 157. . . Thymbra spicata* زروفا Avic.  
 166. Isaac ebn Amram apud Bochart. hieroz. 1,  
 674. *Cels. hierob. 1, 421. . . Thymbra verticil-*  
*lata* سراج القطرب Avic. 200. . . *Cakile mariti-*  
*ma* قنالة Avic. 243. *Serap. c. 65.* Esse plantam  
 falsuginosam velut Kali, sed comedi, folia esse Na-  
 sturtii similia. Bochart. hieroz. 2, 224.

*Tamarindus indica* تمر هندي Avic. 262. *Ser-*  
*rap. c. 348.* Deferri e Khaifaran, Yemen et In-  
 dia: pulpam leguminum recentem esse optimam. . .  
*Bombax gossypinum* كمفس Abulfarag. hist.  
 dyn. 433. *Serap. c. 66.* alio nomine Horon. Cf.  
*Tavernier itin. p. 21. . . Gossypium herbaceum*  
 قطن Ebn Alvam apud Casir. 1, 332. Satis fre-  
 quenter cultum in Hispania. . . *Malva rotundifo-*  
*lia* خبان Abdollat. p. 8. Avic. 274. . . *Althaea*  
*scifolia* حظي Avic. l. c. Abdoll. l. c. Ebn Al-  
 vam apud Casir. 1, 335. Hinc nomen Ketmiae. . .  
*Hibiscus ficulneus* باميد Abdoll. p. 7. *Alpin. aeg.*  
 p. 91. *Forsk. p. 70. 125.* Huc et *H. esculentus.*

*Spartium spinosum* نار شیشغان Avic. 157. . .  
*Spart. iunceum* بادشغان Avic. 150., alio loco  
 کشت بر کشت 192., e quo paretur  
*texoilia monilia*. Cf. Matth. Sylvat. c. 182. Cot. . .  
*Pterocarpus Santalinus* صندل Avic. 241. Serap.  
 c. 346. Ebn Alvardi, Abulfadli et Scherifus Ed-  
 drisi patriam habent insulas Indiae orientales (*Geogr.*  
*nub.* 35. *Celf. hierob.* 1, 180 — 182.). In insu-  
 lis Noceris (Nicobarensis) invenit Marcus Pau-  
 lus (*Ramusio* 2, f. 52. b.). . . *Phaseolus vulga-*  
*ris et multiflorus* لوبية Avic. 201. Serap. c. 81. . .  
*Phas. Mungo* مانس Avic. 212. Abdollat. 32.  
 Decoctum febricitantibus propinabatur. In Guzu-  
 rate et Decan provenit. *Garc.* apud *Clus. exot.*  
 256. . . *Dolichos Lablab* لبلب Avic. 202. Serap.  
 c. 41. Sed confunditur cum Hedera aut Cisso. Cf.  
*Alpin. aeg.* 75. . . *Indigofera tinctoria* نيل Avic.  
 214. Serap. c. 47. Sed vereor, utrumque com-  
 mutasse cum Isatide aliisque plantis. . . *Hedysarum*  
*Alhagi* الحاح Avic. 262. Frutex in Khorasan et  
 regione ماوراء النهر (transoxana; inter Oxum  
 et Iaxarten) frequens, in quo mellea substantia  
 ترنجبین (Terendschabin) inveniatur. Id Hedysa-  
 rum etiam vocari عاقول *Rauwolf.* 89. *Tournef.*  
 1, 125. *Kämpfer amoen.* 725. *Fabret de manna*  
*Ebr. in Reiske opusc. med. arab.* p. 121. Notatu  
 dignum est, quod, cum *Diosc.* 1, 83. mannam etiam  
 memoret, sed turis micas, *Mesfuen* hallucinati,

dum hanc mannam Arabum cum illa Graecorum confundat. . . *Astragalus emarginatus* سوقوطون Avic. 223. . . *Trifolium indicum* اكليل الملك Avic. 124. Serap. c. 18. Ebn Alvam apud Casr. 1, 336. *Alpin. aeg.* 124. حندقوق etiam dictum: *Antiqu. bot.* p. 62. Hyde *de relig. vet. Pers.* p. 492.

*Artemisia iudaica* شبح Avic. 256. Serap. c. 14. *Rauwolf.* p. 456. *Abulfadli* apud *Cels.* 1, 456. . . *Artem.* forte *indica* est, quam *Honainus* primus apud Avic. 125. laudat. Ex hac enim specie *Moxa* Chinesium paratur (*Kämpf. amoen.* 897. *Rumph. amboin.* 5, t. 91. f. 2.). . . *Centaurea Behen* بهن الابيض Avic. 141. Behen album. Cf. *Hyde de relig. vet. Pers.* 510. *Rauwolf.* p. 288. . . *Echinops spinosus* بادور Avic. 140. . . *Orchis Morio*: Vana Bakui, quod in Schirwan crescat (*Natives* 2, 518.) بوزيدان *Buzeidan* Avic. 144. Cf. *Matth. Sylvat. h. v.*

*Phyllanthus Emblica* اصلج Avic. 128. Parari docet e fructibus edulium, quod *Such* سكي appellatur (p. 219.). Serap. c. 95. *Garc.* apud *Clus.* exot. 197. Cf. *Antiquit. bot.* p. 98. . . *Quercus Ballota* بلوط Avic. 148. Edulis enim glans, cum saccharo bonum nutrimentum praebebat. . . *Iuglans regia* جوز et خسف *Abulfadli* apud *Cels.* 1, 82. Sponte crescere in Diarbekr et Kom et Zablestan (*Abulfed. Büschings Mag.* 4, 257. 5, 326. 350.). . . *Pinus Cedrus* شربين *Cels. hie-*

rob. 1, 80. Cf. Niebuhr. Arab. 149. . . *Pin. Cembra* صنوبر صغار Avic. 179. nucibus duris subtriquetris cuneiformibus. . . *Pin. halepensis* صنوبر الكبار Avic. 152., cuius strobilus جلونز appellebatur. . . *Pin. orientalis* قنوب Avic. 262., quae picem liquida[m] dat; strobilus قريش dicatur. . . *Pin. Pineae* صنوبر Avic. 242., cuius nux edulis حب dicatur (p. 179.). . . *Altingia excelsa* Noronna in Annal. bot. angl. n. 5. p. 325. Haec arbor altissima Iavae, Cochinchinae et insularum maris rubri indigena, Pinui maxime adfinis, distinguitur solo numero binario seminum sub quavis squama strobili latentium. Haec est arbor *Rasamala*, quae storacem liquidam largitur, e rimis corticis emanantem. Cognoverunt autem eam Arabes nomine مبهة Miah Avic. 211. Serap. c. 46. Hanc iam Hobeischus e cortice arboris excelsae effluere, et ex insulis Indiae orientalibus advehi bene scivit. . . *Stillingia sebifera* اوملي Avic. 131. Esse oleum spissum, quod fructum arboris ambeat et e Sin australi advehatur. Cf. Lamarck. encycl. 2, 290. *Tomex sebifera* vix huc pertinet. . . *Croton Tiglium* قن Serap. c. 261. Cum pineae nucleis comparatur: unde nomen pineorum nucleorum *Acoftae* (Clus. exot. p. 292.). . . *Cocos nucifera* نرجيل (Nerdschil). Primum testimonium occurrit in itineralio Abuzedi et Wahebi (*Ancienn. relat.* p. 2, 111.) et praecipue de usus mira varietate, quem haec palma

praebeat. *Avicenna* de fructu, titulo **الهندي** (*nucis indicæ*) p. 153. loquitur. Cf. Lud. *Barthema* (*Ramusio* 1, f. 175. a. b.). . . *Areca Catechu* **معدة** et **فوفل** *Avio.* 236. *Serap.* c. 345. Arborem esse Coco similem, nucem deferri e Sin. Cf. *Garc.* apud *Clus. exot.* 187. . . *Aleurites molluccana* **دند** *Avic.* 160. Comparat cum Ricini seminibus, praedicat virtutem emeticam. . . *Momordica Elaterium* vel *Cucumis prophetarum* **حنظل** *Avic.* 175. *Alvardaeus* apud *Celf.* 1, 368. Cucumerum et Cucurbitarum plurimae species Arabibus gratae, frequenter ab iisdem cultae et fatis accurate distinctae fuerunt. *Cucumeres* primum generico nomine **جبار** veniunt (*Abdollarif.* p. 30.). *Cucumis Melo* est **بطيخ** (*ib. Avic.* 241.) et perfice **خرنبه** (*Celf.* 1, 374). Huius varietas est **النفاج** (*Ebn Alvam* apud *Casir.* 1, 333.) cortice tenero striato. *Cuc. Chate* est **عبدلوي** (*Abdollarif.* l. c.) cortice hirsuto, pomo fusiformi. *Cuc. sativus* **فتوص** (*Abdollarif.* l. c.) *C. Dudaim* **ضغبوش** *Abdollarif.* l. c. *Cuc. anguinus* forte **دبا** *Abdollarif.* longissimus. Namque *Cucurbita lagenaria* ex America venit. . . *Cucurb. Pepo* **قتا** *Avic.* 249. . . *Cucurb. Citrullus* **قتا الحبار** *ib.* **بطيخ مرقي** et **زيش** *Abulfadli* apud *Celf.* 1, 371. . . *Cucurb. Melopepo* **شلنق** *Abdollarif.* l. c. et *Abulfadli* apud *Celf.* 1, 365. (Distinctiones et nomina Forskolei neglexi, utpote parum certa.). . . *Aca-*

*cia vera* قرظ et سنط *Abdollar.* 28. Optima descriptio. . . *Ac. gummifera* Broussonet apud Willd. طلح *Abdollar.* p. 29. *Leo Afric.* p. 773. Mastichis simile gummi largiri. Bene describit *Höstius* (*Marocc.* 396.).

*Pandanus odoratissimus* كانبي *Serap.* c. 40. Ex Arabia felici adferri flores odoratissimos, cum quibus oleum paretur. Cf. *Forsk.* p. 172. . . *Salix aegyptiaca* زرنب *Avic.* 168. صمصم *Abulfadli* apud *Cels.* 2, 108. حلاف *Alpin. aegypt.* 62. *Rauwolf.* 111. 112. Destillari e gemmis aquam odoratissimam. . . *Sal. babylonica* غرب *Avic.* 279. *Rauwolf.* 160. A florum odore vocatur in Persia بید مشک *Hyde relig. vet. pers.* p. 336. A gelus a S. Iosepho ad *pharmac. pers.* p. 360. . . *Canarium commune* ميسم *Avic.* 217. Fructum esse nucem trigonam, patriam Macassarum (Celebes), panem inde confici. Delicatum Amboinensium panem ex his fructibus parari, testatur *Rumph. amboin.* 2, 148. . . *Spinacia oleracea* اسفانج *Ebn Alvam* apud *Casir.* 1, 332. *Avic.* 131. A Mesues inde temporibus nota. *Rhaz.* c. 52. . . *Cannabis sativa* قنب *Ebn Alvam* apud *Casir.* 1, 332. *Avic.* 248. Semen شهدنج *Avic.* 256. Paratur substantia inebrians حبشيش e contusis foliis. Cf. *Alpin. de medic. aegypt.* f. 121. b. *Kämpfer amoen.* 645., qui etiam e farina seminum pulvem parari imbrantem tradit. *Chardin. in.*

4, 207. et *Falk. tanogr. Kenntn. des russ. Reichs*, 2, 265. per totum Orientem dominari hunc usum testantur. . . *Menispermum Cocculus* **ملحرج** *Avic.* 211. *Serap. c.* 365. E lactescentibus esse, feminibus pisces inebriari. . . *Cycas circinalis* est sine dubio ea arbor, quae farinam praebere in insulis orientalibus dicitur (*Ancienn. relat. p.* 17.). Optimum et fere primum testimonium Christianum reperies apud *Marcum Paulum* (*Ramusio* 2, f. 52. b.). Ipso Sagu nomine citat *Pigafetta* (*Ramusio* 1, 394.). . . *Excoecuria Agallocha*. Praestantissimum lignum *agallochon*, quod toties ab Arabibus celebratur. **عوج** *Avic.* 251. Afferri e Sin et India et Arabia per Sofalam: optimas species esse Mondeliam et Kakeliam et Kadimurinum et Semandurinam. Alio nomine **اغالوخي** 132. Cf. commentarium doctissimum *Cels. hierob.* 1, 140—150. Fructus dicitur **هرنوه** (*Avic.* 163.) similis piperi, sed colore subflavo et odore praestantissimo. E Comaria, insula Iavae propinqua, praecipue venire id lignum, peregrinatores pristini arabes (*Ancienn. relat. p.* 78.). Scherifus Eddrisi (*geogr. nub.* 72.), Abulfeda (*Büchings Mag.* 4, 277.) et Ebn Alvardi (apud *Cels.* 1, 148.) e Iava autem Bakui (*Notices* 2, 397.) et Ebn Alvardi (*Cels.* 1, 153.) testantur. E Sumatra optimam Agallochi speciem, Calampat dictam, evehi, vendi autem omnem fere Chinen-



bus, utpote ditioribus auro, refert Ludov. *Barshema* (*Ramufio* 1, 181. a.) viliores species Bochor appellat et Loban. Cf. *Garc.* apud *Clus. exot.* 175. . . *Myristica moschata*. Fructus satis cognitus Arabibus nomine *بساليس* *Avic.* 148. et calix s. Macis, nomine *طالسفر* *Avic.* 183. *Serap.* c. 2. E Iava advehi Bakui (*Notices* 2, 397.) testatur. Bene describit *αὐρέωνης* Ludov. *Barshema* (*Ramufio* 1. f. 181. b.), ut viderit arborem in insula Banda; ut in insula Gilolo, Ant. *Pigafetta* (*Ramufio* 1, 394.). . . *Borassus flabelliformis* s. Lontarus domestica Juss. et Gärtn. Avicennae 206. dicitur *بوم*, quod nomen etiam hodie servatur teste *Forskoleo* 126. Ex hac palma paratur, testibus *Kämpfere* (*amoen.* 668.) et *Rumphio* (*amboin.* 1, 50.), Bdellium, quod *بؤ* *Avic.* dicit. Distinguit autem in mechense et iudaicum. Rumphius *Punatam* dicit id suffumigium et totam parandi rationem indicat. Accedit, quod probabilitatem auget, *Abulfedam* (*Büschings Mag.* 4, 203.) *بؤ* palmam dicere humilem Tuneti frequentem: quo sine dubio *Chamaerops humilis* intelligitur, cum *Borasso flabelliformi* facillime confundenda. Ipse *Matthiolus* p. 92. testatur se Neapoli palmam hanc humilem bdelliferam vidisse. . . *Clusia lanceolata* *بؤ* Planta harranica, contra serpentum morsus commendata (*geogr. nub.* 81.). Cf. *Forsk.* p. 122.

---

## ARABUM RES HERBARIA. 273

Superfunt Gastromycoetes duo, quorum Avicenna meminit: alter *كسنج* (p. 194.) dictus. *Tuber* certe est, sub terra proveniens, magnum, reniforme, edule, album, cortice inciso, quod in patria, regione transoxana, et in Khorasan observavit. . . Alter est *Cyathus غوشنه* Avic. 279. tuber cartilagineum, figura cyathi, exilis, epiphragmate tectus. Estne *Cyathus Olla* Pers.?

\* \* \*

Neque absolutus hic index neque certissimus manifesto tamen docet, haud parvam plantarum utilium, aut persicarum aut indicarum ac chinesisum suppellectilem, Graecis Romanisque haud cognitaram, ab Arabibus introductam fuisse. Centum et quinquaginta fere plantas numeravi, quarum cognitionem Arabibus debemus, quae si prius notis HCC. adduntur, numerus fere MCD. eruitur plantarum, quas media aetas e fontibus cognoscere potuit: quinquaginta enim fere ab ipsis monachis aut medicis medii aevi, ceu spontaneae per Galliam et Germaniam inventae fuerunt. Unde, quantopere aberret Halleri iudicium a veritate patet, qui ante C. Gesnerum (1550.) octingentas tantummodo species notas fuisse perhibet (*Bibl. bot.* 1, 285.).

## CAP. V.

## LATINOBARBARA AETAS.

Qui medio aevo rem herbariam attigerunt, Arabes fere solos (eosque pessime verfos), aut Plinii farraginem aut Dioscoridis miserrimam interpretationem sequuti fuerunt. Naturalium rerum descriptores antiqui quum nusquam fere clare satis et distincte semet exprefferint, neque nisi obiter duntaxat plantarum formas et colores indicaverint, Latinobarbarorum desidia exemplaribus etiam caruit, quorum vestigia sequeretur. Nullus ordo, nisi alphabeticus; nulla veritas, quum male intellecta Arabum et Graecorum loca solummodo transcribere confuescerent; nulla doctrinae ratio, quum haud nova docere, sed, quae centies dicta essent, iterum repetere sui ducerent officij.

## SAECULUM XII.

Arabum florentissimum et mitissimum in Hispania imperium, scholarum arabicarum celebritas et doctrinae gloria, ab undecimo inde saeculo plures adlexit Christianos e Germania, Italia, Gallia ipsaque Anglia, qui, liberaliter excepti a scholarum arabicarum praefectis, totum doctrinarum ambitum cum linguarum orientalium cognitione in patriam retulerunt. Interpretati sunt hi Arabum discipuli eorum libros, ut *Hermannus Comes Veringensis* (*Trithem. annal. hirsaug.* 1, 148.), *Ge-*

*rardus Cremonensis (Pipin. in Muratori script. rer. ital. 9, 587.), Daniel Morlaeus Oxoniensis (Wood. antiqu. oxon. 1, 56.) et, qui ceteros omnes eruditione antecelluit, CONSTANTINUS AFRICANUS, Carthagenensis. Is, postquam quadraginta fere annos in scholis Arabum degisset, in Montis tandem Cassini coenobium recessit, ubi et Arabum scripta latine interpretabatur et totum eruditionis arabicae cyclum in compendium redigebat (Leo Ostiens. in Muratori script. rer. ital. 4, 455.).*

Constantini opera (*ed. Basil. 1536. fol.*) et librum amplectuntur *de gradibus*, in quo medicamenta omnia, ab Arabibus adhibita, licet fatis negligenter, tractantur. Myrobalanos credit indos et eitritos ex eadem arbore venire, illos esse maturos fructus, hos immaturos: emblicos cum prunis componit (*p. 345.*). Pastinacam Secacul; *Oculceam* dictam, cum Carduo mariano confundit (*p. 352.*).

Saeculo sequente; duodecimo nimirum, monachi Salernitani, tum regione herbarum utilium feracissima, tum exemplo Arabum moti, qui Siciliae et Calabriae potiti erant, superstitioni antiquae doctrinam, sanctaeque ruditati Arabum eruditionem substituere coeperunt (*Orderic. Vital. in Duchesne script. normann. 477.*).

Supereff *regimen sanitatis Salerni*, quod fauicio regis Angliae filio Roberto versibus leoninis di-

carunt monachi (ed. *Ackerm. Stendal* 1790. 8.). Id praeter vulgatissimas Italiae plantas nil fere continet, quod paullo interiorem rei herbariae cognitionem proderat. *Escula* (c. 44.) *Ackermannus* legit, quae melius *mespila* sunt: namque esculus nusquam in Italia crescit. *Athanosia* (c. 66.) est Tanacetum vulgare: *Enula campana* (c. 68.) toties praedicata, Inula Helenium.

Idem scholae Salernitanae adhaesit Io. f. Matth. *Platearius senior*, a iuniori Pisano, saeculi XV. scriptore, bene distinguendus: quem saeculo XII. vixisse e manifesto Aegidii Corboliensis testimonio efficitur, qui ab ore huius doctoris Salernitani se se pendisse adfirmat (*Leyffer. hist. poet. med. aev. p. 499.*). Frequenter etiam noster citatur a scriptoribus saeculi XIII., Vincentio Bellovacensi, Alberto Magno et Petro de Crescentiis: ipse autem tanquam recentem memoria adlegat Constantinum Afrum.

Liber Platearii, qui superest, *Circa instans* dictus (ed. *Lugd.* 1525. 4.), saeculum sapit: alphabetico ordine medicamina cuiusvis generis nominat, additis paucissimis novis. *Acaciam* habet succum prunellarum (*Pruni spinosae*): *Bauciam* dicit Pastinacam (f. 228. d.). *Cretanum*, Crithmum maritimum (f. 253. b.). Storacem liquidam credit in Calabria reperiri (f. 248. c.), quo sine dubio Dauci lucidi succus suaveolens resinoso-

gummosus intelligitur. Pro Spica celtica *Salicorniam* nonnunquam poni (f. 248. b.).

Primus ceteroquin *Spiraeam Filipendulam* (f. 237. a.), *Clematida Flammulam* (f. 236. d.) et *Galeopsis Tetrahit* (f. 251. c.) nominat.

Huius aevi sine dubio HERBARIUS esse videtur, cuius nusquam mentionem invenio, nisi apud Vincentium Bellovacensem. Arbitror autem, monachum quemdam compilasse ex Arabum scriptis et Plinio, quidquid de plantis innotesceret. Huic autem operi eadem fere autoritas, quam Plateario et Constantino, tributa fuisse videtur.

#### SAECULUM XIII.

Melioris paullo conditionis spes adfulsit, quum civitatum italicarum, Amalfi, Genuae, Venetiarum, Pisae et Florentiae commercium adeo augetur ac extenderetur, ut et rerum naturalium cognitioni vim et imperium prosperare videretur, et superstitionis dominium et antiquorum praeiudiciorum labefactari. Memorabilem locum invenio apud *Petrum Aponensem*, celeberrimum vergentis saeculi auctorem. Is (diff. 67. *Concil. different.* Venet. 1520. fol.) de habitabili aequatoris zona disceptans, refert, semet novisse hominem, qui in regione Cingorum (Zanguebar) viderit sacrum loco stellae polaris australis: de ipsa sibi quoque retulisse Marcum Venetum (Paulum), omnium, quorum

meminerit orbis, maximum circuitorem et diligentissimum indagatorem, et inde apportari Venetianis lignum aloës et camforam et verci (indigoferam). Fratris etiam Cordelarii e Malabaria testimonium adducit, quod sol bis transeat verticem, ut nusquam umbram videre possis, neque stellam polarem borealem, nisi in ipso horizonte.

Tantum itaque efficere ea itinera, commercii causa suscepta, potuerunt, ut pristina praeiudicia de terrae forma abrogarentur, meliores autem opiniones divulgarentur. Quae quidem emolumenta nescio an ex alio quodam itinere tam copiose manifestoque redundaverint, quam e longissima *Marci Paulli* peregrinatione. Totam enim fere Asiam, Tatariam et Chinam et insulas Oceani indici ab anno 1270 — 1295. pervagatus, carceri tandem a Genuensibus traditus, memoriae tradidit totam itineris longissimi historiam (*Ramusii coll. 2. Purchasii coll. 3.*). De Curcuma, Pipere Betle, arbore turifera, camforifera, Rheo palmato, Caesalpinia Sappan, Eugenia caryophyllata, Pterocarpo santalino aliisque plantis primam reliquit et optimam inter Christianos relationem.

Praecesserant eum iam ordinis Minorum fratres Ioannes de *Plano Carpini* et *Gulielmus Rubruquis*, qui per borealem maris caspii regionem Tatariam ipsamque Chinam tetenderunt (*Ramusio coll. 2. Purchasii coll. 3. Hakluyt coll. 1.*). Eam

Itineris orientalis viam, quam primi muniverant Nestoriani, legerunt mercatores plerique Europae borealis (*Sartoris histor. civit. hanseat.* 198. *Sprengelii hist. invent. geograph.* 252.). Ipsae autem merces hac via apportatae melioris indolis iudicabantur quam quae navigiis Alexandriam adferrentur (*Sanut. Torsella in Bongars gesti. Desper Francos*, 2, 24.).

Sequuti sunt Odericus de Porta Naonis et Ioannes Mandevillius saeculo XIV. (*Ramusio coll.* 2. *Hakluyt.* 2. *Reisen und Wanderschaften des hocherfahrenen Ioh. v. Montavilla*, Frkf. 1580. 8.); qui pauca tamen historiam naturalem illustrantia reportarunt. Mandevillius tamen balsami fruticem describit et modum, quo verum a spurio distinguitur, admittis ubique fabulis absurdis. Praestinxit enim animum miraculorum amor, inscitia eius aevi nutritus, ut, qui redirent a peregrinatione, *mirabilia mundi* recitare cogerentur, in coenobiis legunda et scholis (*Sprengelii hist. geograph.* 219.). His mundi mirabilibus adnumerandae *oves vegetabiles*, quarum Odericus et Mandevillius primi meminerunt (*Ramusio* 2, 251. b.) quaeque ab herbariorum conscriptoribus indubitate repetuntur. Esse autem, referunt Odericus et Mandevillius, in regione *Chadissa* fructum ingentem, quem maturum si discideris, agnum intus inveniri sine lana, eum una cum fructu comedi. Eam



plantam, *Barometz* dictam, in Savolzenfi regione, inter Volgam et Iaik, inveniri, fabulatur Hieron. *Cardanus* (*variet. rer. lib. 6. c. 22. p. 63.*).

Mirabilia ea plantarum fabulosa maxime invenies in ALBERTI Magni, Lauingenfis, post episcopi Ratisbonensis, libello de virtutibus herbarum, animalium et lapidum (*Opp. ed. Jammy, Lugd. 1651. vol. 5.*). Adiungam optimi Contr. *Gesneri* (*praef. ad Trag.*) iudicium: „In libro de mirabilibus mundi diversa herbarum vocabula nominantur, sed corruptissima. Haec legat, qui bonas horas male collocare volet.“ Quam aequum sit id iudicium, ex initio statim libelli elucet. Ibi enim de *Élitropia* praecipiens, sic nungatur auctor: „Apud Chaldaeos vocatur *Ireos*, „apud Graecos *Mantuchiol*, apud Latinos *Élitropia*. Huius autem virtus mirabilis est, quod, „si colligatur sole existente in leone in Augusto, et involvatur in lauri folio. et simul addatur dens lupi, nullus poterit contra ferentem habere vocem loquendi, nisi verba pacifica.“ Et paulo post: „*Calidonia* vocatur a Chaldaeis *Aquilarris*, a Graecis *Valis*. *Provincia* a Latinis provençalibus dicta, vocatur a Chaldaeis *Iterifi*, a Graecis *Vorax*. *Nepta* Latinis, *Greith* Chaldaeis, „Graecis *Retus*.“ Citat ineptus homo solum *Macrocrum* et Alexandrum Imperatorem (?) de influentia planetarum in herbas. „*Affodillus* herba Sa-

„turni; Poligonia herba Solis; Chynoffates (?) Lu-  
 „nae; Arnoglossa Martis; Pentaphilon mercurii;  
 „Acharonia, quae et Jusquiamus, Iovis; Pisterion  
 „(περιστέρων) Veneris.

Credidit *Lambecius* (*bibl. Vindob.* 6, 844.) antiquum librum: *Puch der Natur*, dictum nil esse nisi germanice redditum Albertum, sed fallitur. Manifesta enim adfunt indicia, eum librum anno 1349. Ratisbonae scriptum esse (*Panzeri annales german. typogr.* 83.). Albertus autem iam 1280 vivere desiit (*Martene collect. ampliff.* 5, 128.).

Eodem saeculo vixit *Alfredus*, Philosophus dictus, qui commentaria scripsit in Aristotelem (*Fabric. bibl. med. et inf. lat.* 1, 180.) a Bartholomaeo *Glanville* (*propr. rer.* 17, 1.) ita citata, ut haeream, huncne velit, an seniore Alfredu, quem supra citavimus.

Paullo melioris indolis est liber ruralis, quem fenator bononienfis, PETRUS DE CAESCENTIIS, vergente ad finem hoc saeculo, reliquit (*Opus ruralium commodorum.* Basil. 1548. fol.). Versione utor, quam frater Franciscus Argentinensis 1495. edidit, iconibus deturpatam adeo foedis adspectuque horrendis, ut artis progressus nullibi luculentius sub sensu cadere possint, quam comparatis his figuris cum iis, quas *Humboldtius*, *Ventenatius* et *Roxburghius* nobis largiuntur.

Ceteroquin auctor non maiores solos legerat,

sed usu ipso et experientia doctus fuit. Semetipsum mense Augusto inseruisse ransules mali eiusdem anni prosperrime, testatur. Toto libro secundo leges vegetationis pro more saeculi, at non male, exponit. Necessariam esse certam quamdam adfinitatem inter arbores inferendas et eas, quibus inferitur: miras tamen infitionis et fabulosas recenset artes. E praefectis quercubus oriri salices aut populos. Bene autem de absorbtione plantarum, quae per poros fit, de necessitate gemmae ad multiplicandam aut propagandam speciem. Libro tertio enumerat plantas utiles, inter quas quaedam obscurae, e. g. *Verfig*, quae Berberis *Tabernaemontano* 3, 471. dicitur, potest etiam Crataegus Azarolus esse. *Avornus* est sine dubio Cytisus Laburnum (Io. *Bauhin. hist.* 1, 2. 562. . . *Zizulus* (Giuggiole Ital.) *Zizyphus vulgaris*. . . *Sicomorus*, quae in Germaniae montibus crescat. . . *Muniacus*, pruno adfinis, quae Io. *Bauhino* 1, 169. *Armeniaea* esse videtur. Aliae plurimae notatu dignae: Spinachiam, ab Arabibus introductam, noster primus inter Christianos occident. Memorat: sic *Fraxinellam* (Dictamnium album), *Flammulam* (Clematida), *Tetrahit* (Galeopsin), *Zuberum* (Quercum Suber), *Sanguinum* (Cornum sanguineum), *Acer Opalum*, *Rincum marinum* (Crithmum). Glycyrrhizae cultum et Pineae uberrime et bene describit.

VINCENTIUS BELLOVACENSIS, medii aevi Plinius, amplissimi operis, *Speculi quadripartiti* (ed. Lugd. 1494. fol.) tomo secundo historiam naturae universam complectitur; sed scholaasticus vir et ἐν βιβλίων κυβερνήτης nihil agit nisi Aristotelem, Dioscoridem (sic) Gallienum, Yfidorum, Macrum, Plinium, Avicennam, Platearium, Actorem, Cassium Felicem (qualis fuerit, nescio) citare et de oppositis argutissime disceptare. Paucissima, aut nulla fere, notatu digna occurrunt. De *Bernice* arbore (*Terminalia Vernice*) primus fere loquitur, sequens peregrinatores sui aevi (*lib. 13. c. 85. f. 166. d.*) Myrobalanos tamen Graecorum (*Hyperantheram Moringam*) cum myrobalanis Arabum confundit (*lib. 12. c. 79. f. 154. d.*).

## SAECULUM XIV. ET XV.

Commercium Italarum florentissimum et itinera frequentia in remotissimas regiones simplicium cognitionem augere et amplificare debuerunt: sed impeditum etiamnum id studium fuit incitiam vulgari linguarum. Paucissimi docti Arabicam linguam coluerunt, nulli fere Graecam, ut et ipse Franc. *Petrarcha*, decus sui aevi, queri consuecisset, se, licet in Barlaami Graeci disciplinam semet tradiderit, a lingua tamen antiquorum Graecorum rudem esse (*Mém. sur la vie de Pétrarque*, 1, 670.). Maius obstaculum fuit servile doctorum ingenium,

quod, exhaustos esse ab Arabibus thesauros, neque novi quidquam inveniri posse autumaret. Arabum imperia, quam noxia sint humano ingenio, quam turpe sit, coecis oculis eos sequi, qui ipsi nil sciverint, nisi a Graecis male accepta, nemo luculentius monstravit, fortius contendit conviciisque ipsis defendit, quam *Petrarcha* (*rer. senil.* 12, 910. 913.). Qui, doctissimus sui aevi, quum ipse Graecarum literarum rudis fuerit, facile inde efficitur, quanta fontium Graecorum fuerit infcitia. Nihilominus quivis scriptorum adeo adfectavit hanc eruditionis partem, ut risui etiam se exponeret. Eius rei innumera paene testimonia celeberrimus *Matthaeus* sistit *Sylvaticus*. Sic (c. 300.) *Guadam* vel *Fabuciam* graece appellari millepedes: (c. 42.) *Amarisinam* (*Aneuryfma*). interpretatur Matrem sanguinis etc. Sic *Vincentius Bellovacensis* (f. 93. b.) *aroma* ab aris vel ab aëre derivat.

Ipsi enim fontes Graeci, Nestorianorum et Arabum interpretationibus mutati, monachorum denique infcitia contaminati, longe alii legebantur ab eius aevi hominibus, quam veri, textu restituto, ad nos pervenerunt. *Bartholomaeus Glanville* Anglicus alium habuit Dioscoridem ac nos, siquidem Cassiae Fistulae descriptionem ex eo petiit (c. 28.), quam haudquaquam Anazarbeus cognovit. Adscriptum erat Dioscoridi medii aevi integrum caput de *Jasmino*, quod deesse in codice Cantacuzeno demum

vidit Matthiolus. Aristotelis scripta a Ioanne Damasceno exposita, in epitomen redacta, quam *summæ* nomine citare solebant, longe aliena fuerunt a veris Stagiritæ libris.

Pseudonymos multos citare consueverunt, *Cassium Felicem* et *Possidonium* Matthæus Sylvaticus, *Democritum* et *Æsculapium* alii. Nomina autem hæc illustria a monachis sine dubio adfectata, inscitiae eorum sæculorum adeo imposuerunt, ut oraculorum vice eorum auctoritas haberetur.

Ad hanc ævi illius labem accessit scholastica inquirendi, disferendi, scribendi ratio. In contrarias semper partes disputaturi, nullum finem alium cognoverunt illorum sæculorum homines, quam ingenii vim, ratiociniorum aciem et dialecticæ exercitium ostentare: auctoritate sola celeberrimorum nominum vincti ac detenti, veritatem minus quam gloriam quaesiverunt. De plantarum anima, de rationibus earum feminalibus, et sensualitate disputantes, neglexerunt omnino naturæ observationem. Hinc iure *Leonicens* (*de Plinii error. lib. 2. f. 16. a.*) taxat *Petrum Aponensem*, quod, qui centaurii maioris radice continuo usus fuerit, ignorare se id tamen fateretur (*concil. differ. 100.*).

SIMON DE CORDO lanuensis et MATTHÆUS SYLVATICUS celeberrimi sine dubio sunt scriptores huius sæculi. Ille, medicus Papæ Nicolai IV. et sacerdos palatinus Bonifacii VIII., gloriatur, se

peregrinatum esse per orientem, ut plantas in loco natali observaret, quas veteres descripserint. Ea autem iactatio adeo communis est omnibus fere scriptoribus barbarorum saeculorum, ut fidere iis nullo modo possimus. Conatus est nomina plantarum et medicaminum graeca, arabica et latina cum vulgaribus comparare eoque modo exponere. Male vero id tentamen plerumque cessit, cum expertus literarum, rudis etiam a rerum ipsarum cognitione esset. Edidit „*clavem sanationis*, simplicia medicinalia, latina, graeca et arabica, alphabetico ordine elucidata. Venet. 1514. fol.“ cuius praecipua pars rediit cum Matthaei Sylvatici opere.

Is (*Matthaeus Sylvaticus*) Mantuanus, Salerni commoratus erat, ubi „Colocasiā colere in viridario suo fecus spectabilem fontem“ adfirmat (c. 197.). Ipse etiam semina *Cantalidis* (? *Athamantae cretensis*) e Graecia adferri curavit et in horto suo coluit (c. 133.). Sardiniam etiam viderat et Montem pessulanum (c. 181. 528.). Dein Milani artem medicam exercuisse dicitur, anno autem 1317 conscripsit opus „Pandectarum medicinalium Lugd. 1534. fol.“ in quo explicantur nomina graeca, arabica et latina plantarum aliorumque simplicium, quae tunc temporis adhiberentur. Id opus licet *Reinesius* laudibus immeritis extollat (*var. leot.* 3, 18.), equidem nil nisi incertam auctoris paucissimasque coniecturas video, quibus ad expli-

canda arabica plantarum nomina uti possimus. Simon Ianuensis Algam palustrem vocat Nenufar (*Nymphaeam*) et alio nomine Caccabum Veneris et Papaver palustre. Noster ingenue fatetur, „Ara-  
bes non multum curare in omnibus istis herbis,  
„unumque pro alio ponere, si easdem virtutes ha-  
„bere credant“ (c. 122.). Ipse tamen omnem operam impendit, ut confusionem vitaret perniciosam. Quaesivit ab Hispanis, Arabibus et Graecis, quaenam intelligerentur plantae sub receptis nominibus (c. 186. 521.). Neque tamen, qui ipse careret rerum et linguarum cognitione, finem suum attingere potuit.

*Agri-folium* (c. 21.) commutat cum Loto Graecorum, latine vero dici *Cicera*so. *Thoram* habere flores violaceos et *Anthoram* subrubeos (c. 45.). *Apii* duodecim species numerat, inter quas et *Rannunculus* sardous (*hirsutus* c. 48.). Caballum marinum (c. 117.) inveniri nugatur in Ypotamo, fluvio Mesopotamiae, quae media regio fit inter Scirtim et Euphratem. Tormentillam differre arbitrat *Simon* a Quinquefolio, quod illa habeat folia septena, intelligit itaque *Potentillam rectam*. Mi-re confundit (c. 167. 168.) Cistum, Hederam et Lablab: Caprifolium, Oxyacanthum et Lycium (c. 259.): Isatidem et Rubiam tinctorum (c. 366.): Inulam et Laspitium Chironium (c. 375.).

Meliora paucissima sunt. Ad Amali oppidum



sophisticari Agallochum radice Chamaeleae, quae vero laxet, cum Agallochum adstringat (c. 30.). Bacham Arabum (*Caesalpiniam Sappan*) manifesto *Prefillum* lignum, longe ante detectam Americam vocat (c. 82.) Buzeidem esse Satyrii bulbum (c. 116.) Saliuncam non raro pro Spica celtica poni (c. 616.). Bene Simon saccharum Arabum a Graecorum simili substantia differre arbitratur, immerito ob id taxatus a *Leonice* (*de Plinii error. lib. 4. f. 55. a.*).

Editor Baptista *Sardus*, Papienfis, addidit nonnulla nova. Sic de Fragariae usu (f. 170. d.) loquitur: Carduum stellatum, *Lyfimachiam Nummulariam* (*Grassula lunaria*), *Gratiolam officinalem*, *Thapsiam garganicam* describit.

BARTHOLOMAEUS GLANVILLE, comes Suffolciae, ordinis Minorum monachus, de proprietatibus rerum volumen conscripsit (Argent. 1491. fol.), quod Caroli V., Galliarum regis, iussu sacerdos ipse palatinus Io. *Corbichon* gallice interpretatus est (Lyon 1482. fol.). Hinc, quam immerito compilator quidam (*Mélanges, tirés d'une grande biblioth. 10, 202.*), *Corbichonem* ipsum faciat auctorem, patet.

Noster totum librum XVII. plantis dicavit, iis autem folis, quae vel in sacra scriptura vel in glossis occurrunt, non neglectis tamen alijs vulgaribus. Auctores citat Aristotelem, Dioscoridem, Pli-

nium, Isidorum, Alfredum, Platearium et Albertum: illos vero alios, ac nunc leguntur. „Calami „scripturales“ ex Arundine Donace iam tum diu obsoleverant (17, 31. Cf. *Beckmanni hist. invent.* 3, 56. 4, 297.). Sexuum coniunctionem in plantis haud agnoscit, cum rationem in se feminalem contineant, per quam ex se producendi speciem suam habeant potentiam. Allium bene a cepa et a liliis bulbis discriminat: bene cyprum Cant. 1, 14. describit. Dudaim Leae fuisse Mandragoram. Prinum (Quercum Ilicem), prunum et lentiscum confundit.

Iacobus DE DONDIS, Ioannis, Petrarchae amici (*rer. senil.* 6, 897. 15, 1053.) filius, Patavinus, *aggregator* dictus, librum de simplicibus conscripsit, quod sine loco et anno editum habuit *Trewius* (*praef. ad Blackwell. herb.* §. 16, 7.).

Coram est editio Veneta 1499. 4., quae foliis CL et aliquot non numeratis constat. In praefatione dicitur ipse liber: *Aggregator practicus de simplicibus*, ad finem vero: *Herbolarium de virtutibus herbarum*. Alphabetico ordine plantae nominantur, adiunctis virtutibus medicis, ex Arabibus et Plateario etc. Adfunt icones, rudes eae quidem et ligno incisae, sed praestantiores omnibus illis, quae in aliis herbariis occurrunt. Pro Acoro est *Iris Pseudacorus*, quae repetitur etiam sub Ireos. Aristolochiae longa et rotunda sunt ve-

Tom. I.

rae, nec quas Germanici habent herbarii, Fumaria. Branca ursina est Heracleum Sphondylium. Capillus Veneris est Asplenium Ruta muraria. Coriandrum, Cyperus, Lavandula, Siler montanum (*Laserpitium silaifolium* f. 124.), Serpentaria (*Arum Dracunculus* f. 127.) ostendunt, auctorem fuisse Italum et plantas vivas delineasse. Optimae etiam figurae Fragariae et Gentianae luteae. Hedera terrestres forte Veronica est hederaefolia: Hermodactylus, Colchicum: Nasturtium aquaticum, Sium angustifolium. Pessimae tamen figurae Dauci cretici, Menthae, Granorum Solis, Mandragorae (tamen non fabulosa, ut in herbarijs aliis), Paeoniae, Sinapis, Spicae celticae et nardi. Adiecta est enumeratio laxantium, ubi Bartholomaeus Anglicus saepius citatur.

Alia editio multo vetustior f. l. et a. exstat in bibl. Göttingensi, ubi et titulus et praefatio deest, icones etiam multo peiores.

In eadem etiam bibliotheca servatur belgica interpretatio sine titulo, anno 1484 impressa, multo absolutior aliis, quas vidi editionibus. Continet enim praeter laxantium etiam aliorum simplicium enumerationem. Icones fere eadem sunt, quas antiqua latina continet, pauculis aliis adiectis.

Solent nonnulli (ut *Mittarelli Biblioth. cod. ec. p. 28.*) Arnaldo Villanovano tribuere, cum prooemium eius nomen ferat. Sed citata Arnaldi

verba sequuntur. Plures editiones, 1520. 4. 1522. 4. italice mihi in literis humanissimis indicavit CL. collega Patavinus, Iof. Ant. *Bonatus*.

Amicitiae humanissimi *Schrankii*, collegae Lands-  
hutensis, acceptam refero editionem fere antiquis-  
simam: „Aggregator compilatione clarissimi phi-  
„fici Iacobi de Dondis divis.“ Venet. 1481. fol.  
In praefatione ipse fatetur, se anno 1555 hunc li-  
brum conscripsisse. Alphabetico ordine persequi-  
tur simplicia, sine ulla descriptione: vires et usus  
ex Arabibus et Latinobarbaris, ad ipsum usque Si-  
monem Ianuensem exscribit, nullo adiecto iudicio:  
dispositio operis secundum usus medicos.

Alium longe tenorem habet, quam e Trewiana  
bibliotheca mecum benigne communicavit Vogelius  
Altorfius, editio Veneta 1543. fol. Ad solas qua-  
litates primarias et secundarias et ad virtutes con-  
tra morbos index medicaminum secundum Arabas  
et Arabistas institutus est.

Eodem saeculo Conradus quidam *de Megen-  
berg*, Canonicus Ratisbonensis, interpretatus est li-  
brum naturae (*Puch der Natur*), quem eundem  
esse cum Alberti Magni tractatu supra citato, *Lam-  
becius* falso autumat (*bibl. Vindob.* 6, 844. Cf.  
*Panzer. Annal. der deutsch. Liter.* 1, 83.). Editi  
autem est haec interpretatio 1475. Augustae Vin-  
delicorum et 1482. bis eodem anno.

Initio saeculi XV. vixisse videtur *Christoph. de Honestis*, Florentinus, prof. Bononienſis; cum (*expos. in Mesuen, f. 98. a.*) Thomam de Garbo praecceptorem suum vocet, qui obiit 1370 (*Petrarch. senil. 12, 2. p. 1007.*). Commentaria Christophori in antidotarium Mesues cum Marini editione Venet. 1562. fol. impressa pauca continent notatu digna. Loco Secacul Arabum fumebant aevi eius officinae Sigillum Salomonis.

Huius libri ad exemplar conscriptae sunt numerosae editiones *horti sanitatis*, quae saeculo XV. prodierunt. Editionem latinam Moguntinam, a Iac. *Meydenbach* curatam 1491. fol., aliam vulgari sermone Saxoniae inferioris conscriptam Lübec. 1492. fol., tertiam teutonicam, Io. *Schönspergeri* opera Augsburgi 1488. 4. typis impressam, coram habeo. Alphabetico ordine plantas recenset, in praefatione peregrinationes iactantur, per Graeciam et Orientem, socio pictore, susceptas, quas de se ipso gloriatur auctor Lübecensis, Magister Io. *van Cube* (c. 568.), de alio quodam „domino nobili“ Moguntina editio. Ioannem *Cubam* autem medicum Francofurtanum fuisse, editio Francofurtana Egenolfii 1535. testatur. *Arndes*, civis Lübecensis impulsu editionem nostram factam esse, ipse auctor fatetur. Icones ligno incisae pleraeque eadem, nonnullae tamen penitus diversae, passim meliores Lübecenses. Ipse textus nonnunquam pe-

nitus alienus, quod ut luculentius pateat, figillatim perlustranda est utraque priori loco citata editio,

**Moguntina.**

**Lübecnensis.**

- |                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| c. 14. De Allio citatur Vincent. Bellovac.                                                 | c. 4. nil de eo.                                                              |
| c. 34. Apium sylvestre esse Hipposelinum (Smyrnium O-lus atrum, ),                         | c. 7. confunditur cum Ranunculo hirsuto.                                      |
| c. 36. Apium haemorrhoidarum videtur Ranunc. Ficaria.                                      | c. 9. idem.                                                                   |
| c. 40. Aristolochia rotunda est Fumaria bulbosa.                                           | c. 10. idem.                                                                  |
| c. 7. Affodillus est Iris florentina, citantur Dioscorides et Isidorus: septem facultates. | c. 20. Citatur Avicenna et 19 facultates,                                     |
| c. 6. Acorus, figura mala.                                                                 | c. 21. figura melior,                                                         |
| c. 21. Ambrosia, descriptio et icon mediocres.                                             | c. 22. figura pessima.                                                        |
| c. 4. Acacia est Prunus spinosa, cum icona mediocri.                                       | c. 26. figura pessima.                                                        |
| c. 26. Anacardus, figura imaginaria.                                                       | c. 33. idem.                                                                  |
| c. 18. Aloë, icon corolla tetrapetala, foliis integerrimis. Isidorus citatur.              | c. 35. eadem icon, Isidorus fere nusquam citatur, sed Bartholomaeus Anglicus. |
| c. 22. Amomum est Geranium robertianum,                                                    | c. 51. figura alia, sed mere arbitraria.                                      |
| c. 132. 434. Consolida maior s. Symphytum pessime delineatur,                              | c. 107. multo melius,                                                         |

## Moguntina.

## Lübecnensis.

- c. 133. *Consolida regalis* f. *Delphinium pessime*.  
 c. 89. *Cardus* est *Dipsacus ful-*  
*lonum*.  
 c. 450. *Caulis Spinachia*: *pessime*.  
 c. 157. *Diptamnus* est *Conval-*  
*laria multiflora*.  
 c. 188. *Fraga*, non male.  
 c. 222. *Hermodactylus* est *Le-*  
*ontodon Taraxacum*.  
 c. 247. *Laureola*, *Daphne* non  
 male,  
 c. 276. 277. *Mandragora*, cum  
 radice virum et mulierem  
 referente. \*),  
 c. 338. *Paeonia*, pessima fi-  
 gura.  
 c. 392. *Ribes* (*Arabum* dici-  
 tur) sed nostrum est; fi-  
 gura mala.  
 c. 395. *Rododendron* est *Rosa*.  
 c. 458. *Scolopendria*, figura  
 mala.  
 c. 486. *Verbena* pessima.
- c. 108. optime.  
 c. 110. Idem tamen c. 288. sub  
*Labro veneris* et 519. no-  
 mine *Virgae pastoris* oc-  
 currit.  
 c. 161. 471. *Heydensch kol*  
 bis, melius.  
 c. 169.  
 c. 213.  
 c. 248.  
 c. 286. *Laurea*, fig. arbitraria.  
 c. 306. 307-  
 c. 364. non mala.  
 c. 427. figura melior.  
 c. 432.  
 c. 445. figura melior.  
 c. 514. non male.

\*) Insignis monachorum *Φεναισμός*, quo e radice homu-  
 cionem aut femellam sculpsierint, relicto capillamento ra-  
 dicularum, talemque radicem velut naturalem, vendide-  
 rint saepe 30 aureis nummis, exponitur ab *Amato Lusit-*  
*tano* (in *Diosc.* p. 432.).

Utraque ceteroquin editio exterarum plantas fere omnes imaginarias arbitrariis iconibus exprimit, Afam foetidam, Balaustiam, Myrobalanos, ipsum Napellum, Piper, Rhabarbarum, Oryzam (*Rizum*) Scammoneum, Schoenanthum, Tamarindum, Thapsiam, Zedoariam, Saccharum. Lübeckensis editio pauca habet, quibus caret Moguntina: e. g. Flores frumentorum (*Centauream Cyanum*), Cubebas et Diapensiam (*Saniculum.*). Augustana editio minorem habet utraque numerum (434.).

Aliam editionem, *Herbarii* nomine Moguntiae 1485. officina Faustii Schoyfferique editam recenset *Trewius* (*praef. ad Blackwell. herbar. §. IV. n. 1.*). Ea nonnihil differre a nostra utraque videtur. Namque Tamarindi loco, ubi nostrae habent Umbelliferam, Herbarius habet Tanacetum; Apollinariae nomine, quae Scribonio Largo hyoscyamus est, et hic et in nostris Conium maculatum dicitur, Herbarius habet Tussilaginem. Hunc Herbarium vocat Brunfelsius Hieronymum continuo ab ipso citatum. Est sine dubio

Hieronymus *Brunsvicensis*, chirurgus Argentinenfis, cuius *liber de arte destillandi* easdem fere plantas ipsasque icones continet, quas in Orto sanitatis videmus. Eundem itaque librum esse recte indicant C. *Gesnerus* (*praef. ad Trag.*) et *Trewius* (*praef. ad Blackwell.*). Prima editio Brunsvicensis libri est Argent. 1500. fol. Invenio in an-



tiquitatibus botanicis non parum defudasse. Namque Gentianam Cruciatam primum a se delineatam, credit *Borith* esse Ebraeorum. Eam vocem Io. Mich. *Langius* Altorf. 1705. et Ol. *Rudbek* Upf. 1722. uberius illustrarunt. Herba non est, sed vel sapo, vel purpura.

Ridiculum plane errorem committit Hieronymus, ubi de *Sambuco* loquitur. Eum enim esse triplicis coloris, albi, lutei et rubri perhibet. Legebat autem literarum rudis homo *Sambacum* (*Jasminum*) Arabum, ab Arabum commentatoribus cum *Leucoio* commutari. *Leucoia* autem dividebat id aevum in alba (*Leucoium* L.), lutea (*Cheiranthus Cheiri*) et rubra (*Cheiranthus annuus*).

Numerosas editiones, titulo parum mutato, variis linguis, omitto, quippe quae a *Trewio*, *Halbero* et *Panzero* uberrime recensentur.

Novas tamen figuras, naturae magis congruas, novam etiam praefationem continet, quam *Eucharis Rhodion* cum *Christ. Egenolfio* Francofurti ad Moenum 1533. molitus est. Icones has seorsim etiam edidit bibliopola, titulo; *Herbarum imagines vivae* 1535. et 1536. 4. In easdem commentatus est *Theod. Dorstenius*, medicus Cassellanus, in *Botanico* Erfc. 1540. fol., sed nulla fere augmenta scientiae, quae id tempus iam attulerat, conspicua sunt.

Insunt eadem figurae *Egenolfianae*, additis

Brunfelsianis, Tragianis et Fuchsiis, etiam Dioscoridi, qui ex interpretatione Ruellii a Ryffio 1543. editus est. Transierunt denique etiam in Adami Loniceri, qui Egenolſii gener fuit, opera, de quibus infra.

ORTOLFUM DE BAVARIA HEYDENBERGER pariter huc refero, quum liber eius de medicinis simplicibus „*Arzneybuch*“ Aug. Vind. 1488. 4. sine figuris nomina plantarum officinalia sola et vires e Plateario et Alberto contineat (*Trew. ad Blackw.* §. 11. *Panzer Ann. d. deutsch. Lit.* p. 98.).

Huc et Johannes Tollat von Vochenberg, prof. Viennensis saeculo XV., cuius „Meisterlich Büchlin „der Arzney und Krütter“ Schrickius quidam 1497. f. l. forma quarta minore edidit. (*Panzer Annal. der deutsch. Liter.* p. 228.). Alphabetico ordine plantas latino pariter et vernaculo sermone recenset, nil nisi vires medicas, fabulosas eas plerumque et absonas, addens. Ortus fere est sanitatis in compendium redactus. *Ambrosia* dicitur Hyrswurz oder lange Garben oder wilde Salven, *Anthera* das gel Sämlein in den Rosen. *Berberis* est Pfefferich (Perfica.) *Quititana*, Sunnenglanz, quae in Sicilia crescat, ignota, *Ribes Ioannis* (rubrum) primo hic occurrit.

Huius aevi est Matth. Platearius, cuius commentaria in Nicolai Praepositi Antidotarium cum Mesue Venet. 1562, fol. impressa sunt. Aevi in-

scitia ubique patet. Saliuncam arbitratur semen herbae esse, lignum aloës a Nilo deferri in Indiam. Matthaeum Sylvaticum et Simeonem Ianuensē ubique citat. Saccharum ipsius aetate in Sicilia et Hispania colebatur (*f. 374. c.*).

*Manfredus de Monte Imperiali* librum scripsit de *simplicibus*, qui in bibl. Parisina latet (*Fabric. bibl. med. et inf. lat. lib. 12, 38.*). Eum vidit Iacobus *de Manliis*, picturis ornatum. *Tunici* nomine primum auctor mentionem fecerat, *Dianthi* nostri Caryophylli (*app. ad Brunfelsf. herb. p. 167.*). Qua aetate Manfredus vixerit, non patet.

Ipse Ioann. Iacob. *de Manliis*, Alexandrinus (Italiae) saeculi XV. scriptor sine dubio est, neque Anton. Guainerio, Ticinensi (1440.) multo iunior. Edidit explanationes difficiliorum herbarum, quae in officinis exstant, in appendice ad *Brunfelsium* (*ed. Argent. 1532.*) impressas. Idem sine dubio *luminare maius*, Lugd. 1536. 4. Ticini omnino vixit, et ipsos Caryophyllos (*Dianthum*) in Lombardia sponte crescentes bene illustrat. Ridet iure suo herbarios officinarum, quos lumina apothecariorum male lucentia appellat. Spectat sine dubio *Quirici de Augustis Torfonae* lumen apothecariorum, quod denuo prodiit Venet. 1549. fol. Scabiosam quoque delineat Succisam (*p. 175.*) veteribus ignotam. Herbam Paralyfis minorem Margaritae vocat, quae Bellis est perennis (*p. 171.*). An

gelicam etiam Archangelicam primus videtur observasse et Gratiolam officinalem, quam bene describit. De filicum feminibus, quae sagae investigent, nil addit, nisi ingenue fatis: „Deum meliora scire.“ *Filium ante Patrem* dicit *Inulam*, cuius rami inferiores floriferi altiores sint, vel *dysentericam*, vel *salicinam*, vel etiam *britannicam*. Bonus homo oleum perdit et operam, dum Matthaeum Sylvaticum et Simonem Genuensem (Pandectarios) cum veteribus conciliare studet. Meruit tamen laudem Euricii Cordi (*botanol. p. 18.*).

---

---

LIBER IV.  
REI HERBARIAE POST RENATAS  
LITERAS INSTAURATIO.

---

## CAP. I.

## VETERUM FONTIUM EXAMEN.

Duabus potissimum causis tribuenda est nova vita, quae, post tot saeculorum altissimum somnum, omnem excitavit scientiarum ambitum fructusque tulit laetissimos; fontium nimirum, e quibus melior studiorum ratio fluit, examen et novarum orbis terrae regionum inventio. Barbara enim aetas, Arabum unice sequax, nil unquam adfectavit, nil cupivit, nisi quae Arabes dixerint, in epitomen redigere, commentariis illustrare, quae vero nunquam res ipsas exponerent, sed nomina tantummodo, absque ipsius linguae cognitione, interpretarentur. Accessit ad hanc incitiam egestas ipsa rei herbariae, ex Arabicis scriptoribus hauriendae. Ecquis enim negabit, quas ipsi haud cognorunt, etiam aliis patefacere eos non potuisse! Namque duplici

## VETERUM FONTIUM EXAMEN. 301

interpretatione, syriaca ac arabica, acceptis plan-  
tis, quae aliud agnoscerent clima, fieri aliter non  
potuit, quam quod Arabum scriptores, a naturae  
studio plane alieni, in summa ubique versarentur  
caligine.

Labem totius rei herbariae, quae inde necessa-  
rio sequebatur, eo desperatiorem invenimus, quo  
graviora saluti humanae damna contraheret. Ex-  
emplo fit arsenici cum cinnamomo commutatio.  
Hoc enim ab Arabibus nomine *Dar-sini* praedica-  
tum, a *Niculao Myrepsico* (sect. 32. c. 21.) *ἀρ-  
σενικόν* redditur, unde plerique seriores pernicio-  
sum venenum habent aroma pretiosum. Sic etiam  
Averrhois interpres *Harmel* Arabum, quae *Pe-  
gunum* est, Cicutam reddiderat, noxio insigniter  
errore.

Tot tamque periculosi errores dilucidari non  
potuerunt priusquam ipsi antiqui fontes examini  
subiicerentur. E Theophrasto et Dioscoride om-  
nes seriores hauserant, illorum textus, latentes  
vel corruptissimi, protinus inquirendi, restituendi  
erant, ut, quaenam verae sint plantae antiquitatis,  
clare pateret. Quo facto demum erui poterat,  
quid adiiciendum sit veterum cognitioni, quaeve  
partes scientiae inprimis excolendae.

Civitates Italiae, opibus et copiis affluentissimae,  
florentissimo commercio celebres, suorum civium  
opulentissimorum moderamine rectae, scientiarum

quod vero pariter mediocrem rerum cognitionem prodit ac Theodori Gazae interpretationes.

Nihilominus novi conatus non sine usu fuerunt. Horum enim virorum vestigia presserunt alii, qui errores eorum detexerunt, emendarunt, veteresque puriori sermone restituerunt.

Primus inter eos fere fuit *Hermolaus Barbarus*, e nobilissima Veneta stirpe, reipublicae patriae orator apud Imperatorem et papam, dein Patriarcha Aquilegensis, invita patria, fuit († 1493). Plinium is sibi castigandum elegit, animadversiones autem criticas edidit (*Castigationes Plinianas* 1492. fol.), parum maturum opus, quum viginti tantummodo mensibus id conscripisse fateatur; gloriatur tamen, se plus quam 5000 errores Plinii emendasse. Inficiari quidem nequimus, manifestas Plinii hallucinationes Hermolao suboluisse: manifestos herbariorum errores non paucos correxisse, sedulo comparasse fontes, e quibus hauserat Plinius: neque tamen herbarum cognitione adeo polluit, ut illustrare omnes tenebras, difficultates omnes remove potuerit.

Recte quidem vidit, Plinium confudisse *Betonica* cum *Britannica*, *περσικόν* (*Porrum*) cum *μαρρυβίον* (*Marrubio*). Aequae tamen ac Plinius hallucinatur in *Xanthio* et *Aparine*, quas distinguere non audet; in *Coronopo*, ad quem herbam *sardoam* (*Ranunculi* speciem) refert; in *Empetro* s. *Saxi-*

## VETERUM FONTIUM EXAMEN. 305

fraga. Bene ceteroquin describit herbam Paralyfis (Primulam veris), Margaritum (Bellim perennem) et Rosam moscheuton (Althaeam roseam).

Minoris etiamnum momenti instar habent Explicationes difficilium Plinii, quas *Robertus de Valle* Rothomagensis 1500. 4. Parisiis edidit. Corruptae voces, ex herbariis potius sumtae, aut e Matthaeo Sylvatico, docent, Plinium, quem legit, non nostrum castigatum esse, sed monachorum mala industria contaminatum.

In Dioscoride primus operam collocavit *Marcellus Vergilius* Florentinus, reipublicae patriae ab epistolis († 1521.). Is ope codicum antiquorum, quos Laurentius Medices collegerat, omnia capita Dioscoridis, innumeraque loca, quae antiqui miscuerant et pessime reddiderant interpretes, emendare inque pristinam puritatem restituere satagit. Commentaria ipsius in Dioscoridem Florentiae edita 1518. fol. taxantur quidem a *Manardo* (*epist.* 8, 3.) quod verborum potius contineant correctiones quam rerum illustrationes. Marcellum enim nostrum Manardus dicit hominem, in poetarum libris et oratorum magis versatum quam in medicis. Merito etiam Marcello obicitur, quod ubique Hermolaum reprehendat, et saepius iniuria (*Manard. epist.* 10, 1.). Negari nequit, confundi a nostro nonnunquam vulgares Italiae plantas, ut Cunilae, Conyzae et Origani species; ignorari *Erodium ci-*



cutarium, frequentissimam herbam; disensum veterum de Malva et Althaea haudquaquam componi; Lavandulam nostram pro Nardo celtica haberi. Neque tamen eo minus Helli ininiurium est iudicium, Marcelli commentaria stirpibus minus cognitis exponendis non inservire. Sedulo certe noster plantas haud paucas ipse examinavit et cum veterum descriptione comparavit. Quum Arum vulgare maculatum priores herbarii plerumque cum Dracunculo confudissent, hunc noster primus verum vidit et egregie descripsit. Primus risit fabulas de radice ἀνδροπορόννης Mandragorae. In violis veterum dilucidandis magnopere desudavit. Vaga nomina et harum et narcissorum esse bene cognovit: invenit duas Narcissi species in Apennino, *N. biflorum* et *calathinum*. Xanthium, Agrimoniam Eupatoriam et Vineam, cum Chamaedaphne a maioribus commutatam, optime illustravit. Defenditur a Fuchsio in *epist. nuncupatoria ad hist. stirp.*

In horum virorum numero fulget praeprimis ac splendet eximium NICOLAI LEONICENI ingenium, viri et doctrinae copia et acumine ingenii et linguarum veterum usu excellentis. Vicentinus is, Ferrariae per longam annorum seriem sapientiam professus, donec centesimum fere annum agens e vivis secessit. Felicissimus senex, post aliorum certamina, adiit etiam veteres, Plinium-

que et Arabes, ut compilatores, quibus rerum defuerit cognitio, repraesentare studuit (*Opuscula Venet. 1530. fol.*). Maxime Serapionem adgressus est, utpote cuius erroribus tot tamque insignia damna in salutem humanam manent: passim tamen etiam Plinium adgreditur. Aristolochiae rotundae radicem cum Cyclamine commutari, hoc enim ad pisces enecandos adhiberi. Fraga trifoliata male confundi cum Trifolio fragifero. Bene vidit errores Arabistarum miscentium Isatida cum Indigofera et Dolicho Lablab. Carpesium Galeni alienum esse a Cubebis. Lolium tritico noxium eodem modo perperam Plinius dixerat, quo Cuscutam aliis plantis, circumligando nempe, quod noster taxat: licet Hermolaus Plinium excusare conetur. Hederam et Cistum male confundi a Plinio. Cassiam Fistulam veteribus incognitam fuisse, male pro ea haberi Siliquam dulcem (Ceratoniā.)

Saepe ceteroquin bonus fenex repetit, quae semel dixerat; taxat etiam Arabes, absque ulla linguae notitia. Sic Avicennae obiicit Chamaelaëum cum Chamaeleonte commutasse; Serapioni, Turbith suum (Seseli) idem fecisse cum Tripolio Dioscoridis (Plumbagine.). Male saccharum Arabum Graecis iam fuisse notum. Saliuncam et Nardum bellicam; quam optime Plinius distinxerat, eandem esse plantam.

His quidem audacibus eo aëvo sententiis factum

est, ut multae acerrimaeque lites fuscitarentur. Cum Hermolao quidem Barbaro amice actum est, confabulari uterque confuerat in palatio Herculis Estensis Ferrariensis, liberalissimi principis, et ipse fatetur Leonicenus, adeo se cum Hermolao sentire, ut Barbarus vel leonizare vel Leonicenus barbarizare sibi videatur. E vita etiam discessit Hermolaus, priusquam Nicolaus opere suo perfunctus esset.

At *Pandolphus Collenutius*, Pefarenfis, orator eiusdem ducis Estensis, occisus a Storza 1504., indignus certe adversarius, arma cepit contra Leonicenum, nec plantas satis nec historiam artis cognoscens (*Plinii adversus Leonicenum defensio in append. Brunfels.*). Plinium a Dioscoride non haussisse temere audet praecipere, quod veritati satis contrarium est. Neque tamen reticendum est, pauculas notatu dignas animadversiones ab ipso proferri. „Qui de herbis dicturus est, eum ego non „tam librorum quam telluris, non tam literarum „quam agrorum studiosum esse oportere censeo. „Nec satis esse ad herbariam perdiscendam tradendamque, herbarios scriptores legere, plantarum videre picturas, graeca vocabula inspicere, „magistri unius verbis addictum esse, sed rusticos montanosque homines interrogare oportet“ (p. 111.). Saliuncam bene a Nardo celtica distinguit. Bene animadvertit in codice Pliniano, a

Guarino Veronenſi caſtigato, Hypociftidem dici non ad Hederae ſed ad Ciſti radicem creſcere. Saniculam pictam vidit in Herbario Veneto, ſed male eam cum Pentaphyllo coniungit. De eo loquens *Amatus Luſitanus* (in *Dioſcor. p. 106.*) relegandum putat ad ſuos iuris conſultos.

His tempore fere aequalis fuit *Ioannes MANARDUS*, Ferrarienſis, Pici Mirandulani principis, Ladislai Pannoniae regis et Lodovici archia-ter (*nat. 1462. † 1536.*), doctiſſimus certe vir, qui tum Meſues ſcripta ſuis commentariis illuſtravit, tum Marcelli Vergilii verſionem Dioſcoridis ſigillatim correxit (*Epistolae medicales*, Baſil. 1540. fol.).

Acriter in Arabas invehitur, quorum res herbaria maxime egena et a Graecis mutuo accepta ne intelligi quidem ob linguae inſcitiam poſſit. Liberaliter ceteroquin et humaniter Hermolai Barbari partes contra Marcellum Vergilium tuetur, ipſe etiam plantas examinavit. Sic Halixon vidit in maritimis Umbriae (9, 3.) monſtrante Ulyſſe Lanziano, rei herbariae perito. Centauream Rhaponticam et Rheum Rhaponticum ipſe acceperat et probe diſtinguit (5, 5.). Panax tantum Heracleum vidit in horto monachorum et Ieſuatorum Ferrariae (9, 3.). Liliū convallium bene deſcribit, quod ſaepe commutatum ſit cum Hemerocalli Dioſcoridis: fallitur tamen, dum hanc cum Fraxinella

### 316 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

(*Dictamno*), Polygonato (*Convallaria*) et Secacul (*Pastinaca*) iungit (9, 4.). Azarolum late-  
re sub Mespilo antiquorum: ortum esse nomen ex  
Arabico زعرور (*Zarur*): *Hermodactylum* credit  
esse Colehicum, quod frequens in Pannonia obser-  
vaverat. Turbith Mesues quam longe differat a syn-  
onyma planta ceterorum Arabum, bene sensit.

Antherae iam vera significatio apud eum occur-  
rit (4, 3.). Insidere capillis seu filamentis floris.  
In Mes Arabum (*Phaseolus Mungo*) magnopere  
laboravit: alii id *Erviliam* esse, noster *Erviliam*  
male cum *Dolicho* veterum iungit. Est autem ea  
potius *εραβος* (1, 3. 9, 3.). Miror, Manar-  
dum Paliurum non cognovisse, nec Lotum in Ita-  
lia vidisse, commutasse etiam *Acauthum* veterum  
cum *Acantha* et *Branca* urfina (*Heracleo Sphon-  
dylia*), *Typham* denique ignorasse.

Prima haec sunt rudimenta liberioris et melio-  
ris studii, in quo plerique et optimi scriptores sae-  
culorum XVI et XVII perrexerunt, qui vero cum  
aliis potissimum nominibus insignia acquisiverint  
merita; sequentibus redibunt capitibus.

---

#### CAP. II.

#### PATRIARUM HERBARUM EXAMEN.

Non paucas Germaniae et Italiae plantas herba-  
rii barbarae aetatis, obiter licet et pristinis nomi-

bus insignitas prodiderunt. Quibus accessit studium criticorum in veterum monumentis. Hoc enim eo valuit, ut discerent medici, haud omnem omnino ambitum rerum naturalium vel Arabum vel Graecorum etiam scriptis exhauriri, latuisse eos profecto vegetabilia climatum frigidiorum, quae novo examini submittenda, pariter forte efficacia esse possint ac arabica remedia. Cautissime tamen, imo nimis caute egerunt servilia fere ingenia, dum nomina nova invenire non auderent, sed pristina, Graecorum, Romanorum Arabumque nomina traducerent ad plantas Germanicas Gallicasque, quibus parum saepe similes essent novae.

Primus fere ausus est ad patriae divitias consilia transferre SYMPHORIANUS CAMPEGIUS, Lugdunensis, ducis Lotharingiae medicus, paradoxus saltem homo, ni quandoque ineptus dici possit. In *campo elysio Galliae*, Lugd. 1538. 8. p. 16. *Rosas* describit *damaſcenas*, ubique reiicit exotica remedia et patria commendat. Lavandulam Nardo, Coluteam Sennae, Mercurialem Cassiae, Agaricum Rheo, Aloë Ebulum substituit. Galenum prohibuisse Gallis venam secari, ob lacteum sanguinem (γάλα) sed *μωρίαν* esse *Montis pedentium*, *μώρους* (Mauros) sequi. Ex his quidem facetiis ingenium Symphoriani divinaveris.

Multo maiora, imo nova plane molitus est *Otha* BRUNFELS Moguntinus, primum ludimagister

## 312 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

Argentorati, dein medicus Bernensis † 1554. Patrias plantas bene delineavit figuris ligno incis, collegit iudicia maiorum, abstinuit tamen fere ab exoticis. Liber ipsius *Herbarum vivae eicones* tomis duobus 1532. fol. et tribus 1537. editus est.

Confusionem totius rei herbariae, quae tunc temporis regnabat, his verbis exponit: „Multam „gratiam veteribus debemus, qui herbarum vires „et nomina primi nobis prodiderunt; multam etiam „ignominiam et perpetuam contumeliam iis, qui „posterioribus saeculis mire et portentose omnia „depravarunt et confuderunt. Inprimis Pandectario scriptori (*Matthaeo Sylvatico*) et Simoni „lanuensi, qui praeterquam quod omnia miscuerunt, in hoc tantum sudasse videntur, quomodo „ingentia volumina comportarent, non quomodo „utilem posteris operam locarent vel rerum potius „cognitionem indagarent. Quodsi eorum opera „factum est, praestitisset nunquam adhibuisse manum. Quando non est cuiusvis, rerum vocabula „scribere, sed hominis prorsus in linguis et literis „omnibus exercitatissimi. Si et illorum libri corrupti sunt, quod mihi vero simile non est, cum sint „recentissimi, perpetuis tenebris digni essent tam „perfidissimi corruptores. Inde etiam hoc malum „maximum, quod tam paucas herbas novimus. Inde tot myriades barbarorum, obsoletorum et ineptissimorum nominum, dum et omnia illi vetera

„corruperunt vel neglexerunt, et quaelibet hodie  
 „anus nomina imponit, quilibet quoque indoctus  
 „seplafarius, et qui artis magistri haberi debebant,  
 „nihil magis postremum habent, quam in herbis  
 „et cognitione rerum philosophari.“

Plantas autem Brunfelsius sine ordine tradit, saepiuscule etiam confundens, quae quamdam habent adfinitatem. Sic Ungulam caballinam (*Tussilaginem Petasitem*) cum Arctio Lappa iungit: Helleborum nigrum delineat, et orientalem describit. Sub Aristolochiae rotundae nomine habet Fumariam bulbosam et Halleri. Arum maculatum pingit, ubi *A. italicum* esse debebat. Ad Arum Dracunculum recenset Chenopodium Bonum Henricum et Polygonum Bistortam. Consolidam mediam dicit Teucrium Chamaedryn. Crus galli, seu Coronopoda habet Ranunculum bulbosum. Scrofularia maior est nodosa, media Sedum Telephium, minor Ranunculus Ficaria.

Novae autem aut melius observatae haud paucae sunt:

*Veronica serpyllifolia* (*Ex fragia nobilis* 220.)...  
*Salvia Verbenaca* (2, 26.)... *Iris Pseudacorus*  
 (2, 47.).

*Scabiosa Columbaria* (2, 24.)... *Asperula*  
*odorata* (2, 11.)... *Alchemilla vulgaris* (2, 53.).

*Viola tricolor* (*Herba Trinitatis* 2, 69.).  
*Viola odorata* et *palustris distinctae* (1, 137.).



### 314 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

*Asclepias Vincetoxicum* (*Hyrundinaria* 2, 36.).  
*Sanicula europaea* (*Diapensia* 1, 81.).

*Narcissus Pseudonarcissus*, *Galanthus nivalis* et  
*Leucoium vernum* (1, 129.). . . *Convallaria ma-*  
*ialis* (1, 211.).

*Polygonum Perficaria* (*Pulicaria* 2, 14.). . .  
*Dianthus Carthusianorum* (2, 58.). . . *Saxifraga*  
*granulata* (1, 185.).

*Potentilla recta* (*Pentaphyllum maius* 2,  
 53.). . . *Anemone Nemorosa* (2, 80.). . .  
*Anemone Pulsatilla* (1, 217.).

*Leonurus Cardiaca* (1, 160.). . . *Lamium laevi-*  
*gatum* (*Urtica labeo foemina* t. 3. p. 12.). . .  
*Mentha rubra Smith* (76.). . . *Euphrasia offi-*  
*cinalis* (1, 169.). . . *Antirrhinum Linaria* (2,  
 39.). . . *Draba verna* (2, 34.). . . *Cardamine pra-*  
*tensis* (1, 218.). . . *Malva alcea* (2, 72.). . . *Ge-*  
*ranium Robertianum* (2, 37.). . . *Senecio vul-*  
*garis* (*Verbena femina* 1, 120.). . . *Anthemis*  
*Cotula* (1, 255.).

*Neottia spiralis* (*Satyrium odoriferum* 1,  
 105.). . . *Asplenium Ruta muraria* 1, 219.).

Satis aequum *Fuchii de Brunfelsio* iudicium  
 (*in epist. nuncupator. ad hist. stirp.*) adiungam:  
 „Quamvis multa in illius scriptis desiderentur, ut  
 „pote quod descriptiones picturis passim non re-  
 „spondeant et quod paucas admodum et vulgares  
 „tantum stirpes protulerit, quod saepe non suis et

## RBARUM EXAMEN. TRAGUS. 315

ais nominibus appellaverit herbas: nihilomi-  
amen, ut hunc omnes certatim laudibus ef-  
ciat, vel unica hac de causa meritus est, quod  
primus omnium rectam pingendarum stirpium  
nem in Germaniam nostram invexerit, aliis  
hanc imitandi occasionem praeberit. . . Συγ-  
κη τῶ πρώτοπερσ.

Iam a Brunfelsio munitam feliciter ingressus  
nicus ipsius *Hieronymus* TRAGUS, Heydes-  
1498 natus, ludimagister primum Biponti,  
etiam principis hortum plantis instruxit, dein  
praeco Hornbaci et medicus in amoenissima  
one plantarumque feracissima. Saraeponti ali-  
antum moratus apud comitem Nassoviensem, re-  
tandem Hornbacum, ubi sexdecim annos tabe-  
fectus 1554. diem obiit.

Vir, ad amplificandam ac reformandam rem  
rbariam natus, indefessa industria tantaque fuit,  
filicum semina indagaturus, duobus aut tribus co-  
itibus stipatus, integram noctem, igne accenso,  
in sylvis degeret (p. 544.), ut hortum ipse, plan-  
tis indigenis rarioribus satis locupletem coleret,  
victorem aleret bonum, Danielelem Kandeliam Ar-  
gentinensem, veteresque auctores simul diurna ver-  
saret manu ac nocturna.

Librum *de stirpium historia* primum germani-  
ce editum Conr. *Gesnerus* dein auctum edidit Ar-  
gentorati 1532. 4. Ordo plantarum haud alpha-

beticus, sed is, qui ex adfinitate quadam proficisci videretur. Agmen Urticae ducunt, quod figillum Tragi urticae folia habebat. Componuntur labiatae, cruciferae pleraeque et compositae: at insigniter saepe aberrat, dum e. g. (p. 219.) cum Verbascis iungit Centauream montanā (p. 93. 99.): Ranunculos cum Apio (p. 166. 167.): Erigeron acre cum Plantagine Psyllio (p. 226.): Alisma cum Plantagine (p. 679.): Cyperum flavescens cum Triglochine (p. 528.): Polytrichum cum Drosera.

Indigenarum plantarum studiosissimus neglexit fere exoticas, nisi quas a Conr. Gesnero acceperat. „Multi“ (inquit p. 165.) „ex nostris scriptoribus „ingentia volumina de Balsamo, ligno Paradisi, „Amomo, Nardis aliisque peregrinis ac exteris radicibus herbisque, quas vix unquam ficcatas in „officinis videre, conscripserunt. Sed qui nobis „lissimarum stirpium, quae in Germania nostra „facile proveniunt, quaeque ita passim obviae sunt, „ut pedibus illas conculcemus, illarum inquam historia, qui describendam fusciperet, nemo est; „scilicet officio suo probe se functos existimant magni doctores, si in scholis et scriptis suis, quo nomine quoque herba apud hunc et illum auctorem „ex veteribus, qui et ipsi nonnunquam dormitant, appellata sit, investigerunt. Hinc vero, „quam peregrinarum rerum, quarum nec notitiam

„nec copiam habemus, omnes studiosi sumus, liqui-  
 „do apparet. Qui fit, ut praestantissimas Dei op-  
 „timi maximi creaturas, quae affatim apud nos, o  
 „singulari Dei benevolentia luxuriant, tanquam fu-  
 „perfluas et inutiles contemnamus.“

Optimus vero Tragus, quum et ipse in synonymis, ipsorum etiam Ebraeorum, colligendis studium summum collocaret, plantas autem paucas, extra Germaniam provenientes, cognosceret, alienus haudquaquam est ab erroribus gravioribus. Sati-  
 tius fuisset, abstinere penitus a doctrina veterum, plantasque indigenas, sua quamque appellatione describere. At voluit aliter aetatis imperium. Hind  
 factum est, ut Rutam sylvestrem veterum (Peg-  
 num Harmalam) eandem crederet cum R. mon-  
 tana (p. 69.): ut Inulam Helenium arbitraretur es-  
 se Moly Homericum (p. 171.): Aristolochiam Cle-  
 matitida diceret longam (p. 178.): Adonida verna-  
 lem Elleborum nigrum verum (p. 406.): ut Her-  
 niariam glabram pro Empetro (p. 527.): Gom-  
 phrenam globosam pro Circaea (p. 579.): Trifo-  
 lium medium pro Cytiso (p. 601.): Genistam tinc-  
 toriam pro Ferula (p. 604.): Polygonum Fagopy-  
 rum pro Ocimo (p. 648.): Alyssum sativum pro  
 Sesamo (p. 655.): Brizam mediam pro Aegilope  
 (p. 670.): Eriophorum pro Gnaphalio (p. 683.):  
 Lilium Martagon pro Hyacintho poetarum (p. 787.):  
 Cuscutam pro Androsace (p. 810.): Cassiam Sen-

518 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

nam pro Colutea Theophrasti (p. 964.): Crataegum Oxyacantham pro Cynosbato (p. 984.) haberet.

Perpaucas descriptiones et icones a Brunfelsio amico mutuo acceptas habet.

Novae aut melius observatae sunt sequentes:

Lycopus europaeus (p. 9.). . . Salvia Sclarea (*Gallitricum* p. 49.). . . Veronica Beccabunga (*Sion non odoratum* p. 138.). . . Veronica Chamædrys (203.).

Briza media (*Aegilops* 670.).

Galium sylvaticum (*Matrifylva secunda*). . . Potamogeton crispus (*Alga ranarum*.).

Myosotis Lappula (*Elatine* 196.). . . Anchusa angustifolia (*Buglossa minor* 232.). . . Verbascum phlomoides. . . Gentiana cruciata (254.). . . Impatiens Noli tangere (*Efula sylvestris* 295.). . . Chenopodium hybridum (*Solanum* 4, 304.). . . Veratrum album (409.). . . Astringentia maior (*Ostentium montanum* 200.). . . Imperatoria Ostruthium (*Smyrnum* 453.). . . Bupleurum perfoliatum (482.). . . Bupleurum falcatum (*Herba vulneraria* 500.). . . Caulis grandiflora (*Lappa agrestis* 311.). . . Selinum Carvifolia (*Cuminum equinum* 500.). . . Laserpitium Siler (*Siler montanum* 175.). . . Aethusa Cynapium (*Petroselinum* 100.). . . Aegopodium Podagraria (*Vitium Angelicae* III, 211.). . . Herniaria glabra

## HERBARUM EXAMEN. TRAGUS. 319

(*Empetrum* 527.). . . *Gomphrena globosa* (*Circaea* 579.). . . *Solanum Dulcamara* (816.). . . *Sium Sifarum* (912.). . . *Sium Falcaria* (*Critamus agrestis* 215.). . . *Sambucus racemosa* (*sylvestris* 406.). . . *Myosurus minimus* (*Coronopus sylvestris* 211.). . . *Staphylaea pinnata* (1098.).

*Convallaria verticillata* (*Sigillum Salomonis angustifolium* 400.). . . *Scilla amoena* (*Narcissus cberuleus* 756.). . . *Iuncus effusus* (*vulgaris alter* 800.). . . *Colchicum autumnale* (*Hermodactylus* 759.). . . *Hyacinthus botryoides et comosus* (772.). . . *Rumex patientia* (*Rhortensis* 530.). *Triglochia palustre* (*Calamagrostis* 2.). . . *Paris quadrifolia* (*Aster, non atticus* 503.).

*Stellera Pallerina* (533.). . . *Cardiospermum Halicacabum* (*Vesicaria peregrina* 597.).

*Dictamnus albus* (26.). . . *Lychnis flos Culculi* (403.). . . *Dianthus superbus* (*Superba* 575.). . . *Pyrola rotundifolia* (*Limonium sylvestre* 707.).

*Potentilla alba* (*Quinquefolium* 4, 501.).

*Capparis spinosa* (967.). . . *Caltha palustris* (142.). . . *Aconitum Lycoctonum* (*Luparia* 247; sed male pictum.). . . *Anemone pratensis* (*Herba Venti* 413.).

*Teucrium Botrys* (79.). . . *Teucrium Chamaedrys* (204.). . . *Pedicularis sylvatica* (250.). . .

320 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

*Digitalis purpurea* (*Campanula sylvestris* 889.)...  
*Digitalis ambigua* (*ead. fl. luteo*).

*Lepidium ruderales* (*Thlaspidium* 83.) . .  
*Thlaspi campestre* (87.) . . *Cardamina pratensis*  
 (83.) . . *Erysimum Alliaria* (86.) . . *Erysimum*  
*Barbarea* (101.) . . *Sisymbrium Sophia* (*Ser-*  
*phium germanicum* 338.).

*Hibiscus Trionum* (*Alcea veneta* 921.).

*Polygala vulgaris* (531.) . . *Vicia dumeto-*  
*rum* (*Osmunda latinorum* 176.).

*Hypericum hirsutum et montanum* (73.) . .  
*Hypericum ? pulcrum* (74.) . . *Picris licheracioides*  
 (*Cichorea* 3.).

*Pyrethrum corymbosum* (*Bupththalmus* 152.).

. . *Inula germanica* (*Solidago sarracenica* 3.) . .

*Achillea Ptarmica* (*Tanacetum album* 159.) . .

*Balsamita vulgaris* (*Alisma* 163.) . . *Erigeron*

*acre* (166.) . . *Centaurea montana* (219.) . .

*Gnaphalium arenarium* (*Amarantus* 330.) . . *Gna-*

*phalium montanum et germanicum* (331.) . . *Gna-*

*phalium dioicum* (*Lagopus* 332.) . . *Chrysocoma*

*Linofyris* (*Linariae tertium genus* 358.) . .

*Achillea Ageratum* (*Eupatorium Mesues* 515.) . .

*Centaurea Cyanus* (*Baptifecula* 566.) . . *Tagetes*

*patula* (*Garyophylli indi* 923.).

*Epipactis Nidus avis* (*Satyrion* 9, 785.).

*Zea Mays* (651.) . . *Urtica balearia* (3.)

*Smilax aspera* (814.) . . *Rhodiola rosea* (913.).

Asplenium septentrionale (*Filix arborea* 537.)  
 . . Osmunda regalis (*Filicis maioris alterum ge-  
 nus* 543.) . . Blechnum boreale (*Asplenon syl-  
 vestre* 550.) . . Asplenium Ceterach (*Scolopen-  
 dra vera* 551.) . . Botrychium Lunaria (914.) . .  
 Lycopodium clavatum (*Muscus terrestris* 555.) . .  
 Lycop. complanatum (*Saccina sylvestris* 556.) . .  
 Marchantia polymorpha (*Iecoraria* f. *Hepatica fon-  
 tana* 523.).

\* \* \*

Quodsi Brunfelsius et Tragus veterum plantas  
 in patria frigidiore invenisse sibi viderentur, multo  
 maior fuit temeritas Cornelli PETRI, Leidenfis  
 medici, cuius *adnotatiunculae* in Dioscoridem  
 Antverp. 1533. 8. prodierunt. Arundinem enim  
 arenariam pro Cypero Papyro, Ilicem aquifolium  
 pro Myrto, Arctium Lappam pro Atractylide,  
 Sambucum pro Arabi, Geranium rotundifolium  
 (*Pes columbinus* Dodon.) pro Amomo habuit.  
 Non omisit tamen plantas indigenas, quas veteres  
 ipsi videbantur neglexisse, ut Veronicam longifo-  
 liam et officinalem, Chenopodium olidum, Sani-  
 culam europaeam, Droseram, Ribes nigrum, Epi-  
 lobium angustifolium, hirsutum et tetragonum, Py-  
 rolam rotundifoliam, Spergulam arvensem, Ra-  
 nunculum Thoram, Ajugam reptantem, Scutella-  
 riam galericulatam, Asplenium Ceterach.

Hand plane alienus ab aevi sui vitio fuit Eur-  
 TOM. I.



322 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

cus CORDUS, eximius aliquin auctor. E Simmesusia Hassiae natus, Brunfelsii et Tragi more, ludum literarium Erfordiae aperuit, dein semet ad medicam artem contulit. A Ferrariensi universitate adeptus summos honores, primum docuit Erfordiae, dein Marpurgi, denique artem Breae exercuit, denatus 1535.

Edidit doctum opusculum, *botanologicon* Colon. 1534. 12., festivis refertum exercitationibus et ludicris, utilibus tamen, quum in horto suo pariter ac in campis et sylvis plantas sedulo observare consuefceret. Quantopere vero hallucinetur in plantis veterum definiendis, vel inde patet, quod Amomum veterum putet Anastaticam esse hierochunticam. In filicibus toties vexatis exponendis mirifice se torquet. Helichrysum Dioscoridis recte putat idem esse cum Gnaphalio Stoechade (fueritne suum arenarium?). Bene illustrat praeterea Antirrhinum Orontium et Linariam. Libanotida Dioscoridis bene distinguit, alteram Roremmarinum; alteram Cachryn, nusquam in Germania visam. Lavandulam Spicam nescit, quo nomine appellet Dioscorides: deest omnino in codicibus: magnopere autem falli, qui celticam nardum cum hac spica commutent. Aethusam Meum eandem putat cum Damo cretico.

Qui Graece se doctum non esse ipse fatetur (p. 55.) hisce libris componendis certe par non erat;

ubique praeceptores Nic. *Leonicenum* et Io. *Manardum* testatur, qui cum dissentiant, ipse etiam ambigit. Hinc non mirum *Ligustrum* cum *Cypro* (*Lawsonia*) *Chamaeleonta nigrum* cum *Carduo arvensi*; *Santolinam* maritimam (*γναφάλιον* Diosc.) cum *Gnaphalio uliginoso*, *Cuscutam* cum *Androsace*, *Polytrichum* cum *Adianto* et *Asplenio Trichomanē* confirmare.

Subiulit tamen ipsi, *tiliam* in *Dioscoride* non occurrere, sed *Phillyream*, *Acaciam* non esse *Prunum spinosam*, *Aristolochiam rotundam* alienam esse a *Fumaria bulbosa*. *Imperatoriam sylvestrem* (*Angelicam*) primum apud eum mihi observare videor, licet *Smyrni* falso nomine traditam: tum etiam *Erodium moschatum* (*Acus moschata*).

Indicem exhibet plantarum, quas Arabes primi invenerint, mancum eum et fallacem.

Simili plane ratione rem herbariam tractavit *Hermannus*, Comes a *Novenaar*, dum ad *Schottum* daret epistolam de explicandis simplicibus, 1529 scriptam, antequam *Leoniceni* liber integer ad ipsum venisset. Addita haec est epistola *Tomo 2. Brunfelsii*. *Eupatorium* inter alias verum esse *Agrimoniā*, *Cyclamen*, *Acetosam* aliasque herbas, nominibus germanicis praeditas, conciliare audeat.

Ambiguum est de Io. Ruellii *Suessionensis* meritis iudicium. Medica is arte, quam primum

Parisiis exercuit, abdicata, sacerdotium promeruit. Dioscoridem latine interpretatus est (Argentor. 1529. fol.) quae quidem versio summo studio facto Marcelli omnino Vergilii praeferenda est, quum illustrationibus Hermolai Barbari et Leonici sedulo usus fuerit.

Dein autem edidit opus integrum *de natura stirpium* (Venet. 1538. Not. 1. 2. 8.) quod uberimum et primum fere tractatum de nomenclatura botanica, de partium usu et de colore, odore saporeque plantarum continet, plerumque compilatum e Theophrasto et Plinio. Fateatur licet, se multum diuque per montium iuga et sylvas peregrinatum fuisse, pauca tamen nova aut peculiariora occurrunt. In nominibus plantarum conciliandis totus est, neque tamen satis felix. Confundit enim Coluteam cum Senna, Cardamomum cum Capfico, Smyrnium cum Ligustico, Nardum cum Lavandula, Tanacetum cum Artemisia, Celtin cum Nymphaea, Cyperum ipsum cum Curcumae pigmento. Qui quidem errores amplam praebuerunt posteris occasionem, eum reprehendendi.

Sequitur aequissimus maiorum suorum iudex, Leon. FUCHSIUS, vir linguarum studiosissimus, ipsiusque plantarum naturae, quam et in horto suo et in agris sylvisque indagaverat. Natus 1501 Wernbdingae Rhaetiae, in patrio oppido primum ludi magister, dein Ingolstadii medicinam docuit,

## HERBARUM EXAMEN. FUCHSIUS. 325

fuit etiam Ansbaci apud principem, revocatus Ingolstadtum, dein Tubingam abiit, ubi per triginta annos († 1565) summa laude medicinam professus est.

Initio edidit 1532 adnotationes aliquot herbarum et simplicium, quae Brunfelsio adiectae, redeunt auctae in *Paradoxis medicinae* Basil. 1535. fol. Vatiniano odio prosequutus Arabes, quos impii bestias vocat, ad Graecos fontes ubique ablegat: acerrime reprehendit recentiores, qui, summo rei medicae damno, plantarum veterum nomina traduxerint ad Germanicas plantas. Populum arborem Arabes non cognovisse; Cassiam Fistulam longe alienam esse a Siliqua dulci; saccharum Arabum a Graeco saccharo; Carpesium Galeni a Cubebis; male herbarios Cicutam commutasse cum Harmel Arabum; Sanguinem Draconis male Arabes descripsisse, cuius arborem (Dracaenam) recens in Canariis insulis inventam *Cadamustus* navigator, de quo deinde plura illustraverit. Thlaspi veterum penitus ignorari.

Adgressus est paullo post insigne opus, *de historia stirpium* Basil. 1542. fol., quod eo potissimum fine edidit, ut ad vulgatissimas Germaniae australis plantas botanicorum studia converteret, atque icones daret, non sumtuosas, sed fidissimas, umbris partium solis expressis, in quo consilio ita adiutus fuit a Rod. Specklin, Argentinenh, at ip-

# 326 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

hae etiam partes essentielles non negligerentur. Rarissime hae icones erroneae sunt, e. g. p. 611. ubi Thlaspi Bursa folia habet omnia lyrata. Nomina sunt quidem antiqua, descriptiones etiam saepius e maioribus excerptae, plura tamen nova, ipsique peculiaria, quae ut clarius fiapt, libet meliora ordine systematico apponere.

Veronica Beccabunga (*Sium* 725.). . . Veronica agrestis (*Alfimo media* 22.).

Valeriana officinalis (*Phu germanicum* 857.). .

Holcus Songhum (771.).

Alchemilla vulgaris (*Pes leonis* 612.). .

Anchusa italica (*Cirsum italicum* 55.). .

Campanula Rapunculus (*Rapum sylvestre* 214.). .

Lyfimachia Nummularia (*Censumtorbia* 401.). .

Datura Stramonium (690.). . Capsicum annuum,

baccatum et grossum (*Siliquastrum* 732 — 734.). .

Primula veris et elatior (*Verbasculum odoratum et non odoratum* 850. 851.).

Chenopodium album (*Triplez sylv.* 119.). .

Impatiens Balsamina (190.). . . Gentiana lutea

(200.). . . Ammi maius (67.). . . Daucus Vis-

naga (*Seseli massiliense* 786.). . . Athamanta cre-

tensis (*Daucus creticus* 231.). . . Athamanta Li-

banotis (*Daucus* III, 233.). . . Selinum Cerva-

ria (*Daucus* II, 232.). . . Sium angustifolium

(*Apium palustre* 270.). . . Scandix Cerefolium

(*Gingidium* 216.). . . Pimpinella nigra (*Sifer syl-*

## HERBARUM EXAMEN. FUCHSIUS. 327

*vestre* 753.). . . *Chaerophyllum sylvestre* (*Myrrhis* 525.).

*Lilium Martagon* (*Asphodelus femina* 115.). . .

*Ornithogalum luteum* (*Bulbus sylvestris* 169.). . .

*Allium ursinum* (739.). . . *Allium vineale* (737.).

*Scilla bifolia* (*Hyacinthus coeruleus minor* 837.).

. . *Hyacinthus racemosus* (*coeruleus maior* 836.).

*Calla palustris* (*Hydrop. rubeum* 844.).

*Paris quadrifolia* (*Aconitum Pardallanches* 87.).

*Agrostemma Githago* (*Lolium* 127.). . . *Stel-*

*laria Holothea* (*Gramen. Agrostis* 136.). . . *Di-*

*anthus Carthusianorum* (*Betonica sylvatica* 1, 352.).

. . *Saxifraga granulata* (747.). . . *Saponaria offi-*

*cialis* (*Struthium* 780.).

*Spiraea Filipendula* (*Oenanshe* 562.).

*Clematis Vitalba* (*Vitis nigra* 97.). . . *Ranun-*

*culus polyanthemus* (*Chrysanthemum* 879.). . .

*Ranunculus auricomus* (156. *Ranunc.* 1.). . . *Ra-*

*nunculus acris* (*R. hortensis* 137.). . . *Ranuncu-*

*lus sceleratus* (*R.* 11, 159.). . . *Ranunculus bul-*

*bosus* (*R.* 111, 160.). . . *Anemone Nemorosa*

(*Ranunc.* 111, 161.). . . *Anemone Ranunculoides*

(*Ranunc.* 114, 162.). . . *Delphinium Consolida*

(*Chamaemelon Exanthemum* 27.).

*Ajuga reptans* (*Consolida media* 391.). . . *Me-*

*littis Melissophyllum* (*Melissophyllum adulterinum*

499.). . . *Teucrium Botrys* (*Chamaedrys femina*

870.). . . *Digitalis purpurea* (893.). . . *Digit-*

328. LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

lis lutea (894.). . . Scrofularia aquatica (*Galeopsis* 194.).

Hesperis matronalis (314.). . . Lepidium latifolium (484.). . . Sifymbrium Löselii (*Verbena recta* 592.). . . Sifymbrium tenuifolium (*Eruca sativa* 262.).

Erodium cicutarium (*Geranium* 1, 204.). . . Geranium molle (*Ger.* II, 205.). . . Geranium Robertianum (*Ger.* III, 206.). . . Geranium dissectum (*Ger.* IV, 207.). . . Geranium pratense (*Ger.* V, 208.). . . Geranium sanguineum (*Ger.* VI, 209.). . . Gossypium herbaceum (*Xylon* 581.).

Fumaria bulbosa (*Aristolochia Pistolochia* 91.). Spartium monospermum (*Spartus* 758.). . . Vicia lathyroides (*Aphace* 110.). . . Lathyrus tuberosus (*Apios* 131.). . . Trifolium ochroleucum (818.). . . Medicago lupulina (819.).

Apargia autumnalis (*Hieracium minus* 320.). . . Tagetes patula (57.). . . Carlina vulgaris (*Atractylis mitior* 121.). . . Inula dysenterica (*Calaminthae* III genus 436.). . . Aster Amellus (*A. atticus* 154.). . . Chrysanthemum Leucanthemum (*Bellis maior* 148.). . . Centaurea benedicta (*Atractylis hirsutior* 122.).

Zea Mays (825.).

Mercurialis perennis (*Cynocrambe* 444.).

Asplenium Ruta muraria (*Saxifraga* 730.). . .

Parmelia pulmonacea (*Pulmonaria* 632.).

\* \* \*

## HERBAR. EXAMEN. BRASAVOLUS. 529

Eccipiat hunc Antonius Mafa. BRASAVOLUS, nobilis Venetianus, qui a Nic. Leonicensi et Manardo hausit doctrinam, magnifico et eximio literarum artiumque patrono, Principi Estensi Rerariae inservivit, cum quo et Liguriae montes et Galliam et Illyriam peragravit; a quo et praedium dono accepit, ubi plantas externas solertissime coluit; ipsi etiam duci Alphonso suavit, tum hortum amoenissimum, Pado circumdatum, plantarum copia ornare, tum quotannis Cretam mittere navigia, quae semina inde et plantas reportarent. Patrium solum optimus vir insigni sedulitate perquisivit, nea auctorum veterum studium neglexit, nec, raro exemplo, aegrotorum curationem, quorum quotannis sesquimillia ipsi semet tradere consueverunt (*Amat. Lusit. in Diosc.* 307.). Herbarium ipse collegit ditissimum († 1555. Cf. *Tiraboschi letterat. Italian.* tom. 7. vol. 2. p. 57.).

In egreio libro: *Examen omnium simplicium medicamentorum*, Lugd. 1537. 8: pleraque tractat, ab aliis iam exposita aut illustrata, plura tamen nova: in nominibus gallicis, italicis et ipsis germanicis satis curiosus; corrigit textum Dioscoridis et castigat versionem. Libere iudicat, certo partem nondum centesimam in universo orbe exstantium a Dioscoride aut Plinio descriptam esse, sed indices augeri plantarum cognitarum copiam.

Veram Androsacen in Istria invenerat, non-



stravit eam Amato (*in Diosc.* 376.) Centauream Rha ponticam haud esse Rha ponticum veterum suffissime demonstrat. Convolvulum Imperati (Brassicam marinam) bene illustrat. Valerianam Phu (non veram Dioscoridis) ab officinali tamen aegre distinguit. Acorum Dioscoridis credit Galangam esse. Lycium petiit e Bononiae montibus: Atropam Mandragoram in Gargano monte, in Apennino Thapsiam veram (Th. Asolepium) invenit.

Modeste et parhumaniter dubia movere studuit Aloysius MUNDILLA, prof. Brixienfis, in praed. et botanica et medica parum instructus (*Amat. Lusit. in Diosc.* 394.). Licet bene refutet Ruellium, Coluteum cum Senna commutantem, alienus tamen omnino est a plantarum ipsarum inspectione. Cabebas idem credit esse ac Carpesium Galeni: saccharum nostrum veteribus iam fuisse notum; Rheum ponticum idem esse cum barbaro etc.

\* \* \*

AMATUS LUSITANUS, seu, quod verum videtur nomen, Io. RODERICUS CASTELLI ALBI, Beira-Lusitanus, Antverpiae, Ferrariae, Anconae, Thessalonici demum vixit, anxie amhivit medici munus apud Ragusanos, quibus indigne in epistola nuncupatoria adulatur; paradoxus homo, cui namq. tempore aequalium favit. *Enarrationes* scripsit *in Dioscoridem*, Argentor. 1554. 4., quas iam, sub vero suo nomine, 1539, edidisse gloriatur;

### EXAM. MUNDELLA. LUSITAN. STEPH. 33.

non inutiles eas, cum Lusitanus, qui Antverpiae vixerat, non paucas merces indicas, quae in contentione erant, bene cognosceret et illustrare posset. Nardum et Costum, Radicem Chinae, Batatas et Colocassiam ipse examinavit. Anconae ipsi orator Imperatoris Romani apud Solimanum monstravit verum Rheum ponticum, quod in Ponto ipso evulserat (p. 258.). Prope Anconam Salsolam Tragum invenit (418.), Spartum copiose in Hispania (471.), ibidem Atriplicem Halimum (110.) Acacalida credit Ericam baccantem esse, Camarinham Lusitanorum (109.). Vidit etiam ipsum Aspalathum et lignum Rhodium, Genistae radices (38.). Ribes fruticem apud antiquos non occurrere, sed esse Ribes Arabum, in quo vehementer fallitur (115.).

Haud paucos tamen etiam errores commisit. Malabathrum esse Betel (25.); Helenium, Nepenthes Homerii (50.); Myrabolantos iam a Dioscoridis describi (138.). Elaten Dioscoridis esse nucem indicam (140.). Persica mala cum Persica confundit. Benzuinum esse Asiam dulcem (348.). Inimicitias sibi non paucas concevit, dum acriter inveheretur in eos, qui eadem ante tractaverant, maxime in Fuchsum, aequissimum virum, et in Matthiolum, qui tum iam coeperat Dioscoridem illustrare.

Pauca huc pertinentia insunt Caroli STEPHANI, e celebri typographorum familia († 1564.)

libello de re hortensi. Lugd. 1536. 8. Rhamnum habet pro Grossularia, Lencanthes pro Iasmino, Hyacinthum pro Orchide doxopsea, Bacchar pro Asaro. Rosas ceteroquin recenset provincialem, gallicam damascenam et luteam: Momordicam etiam describit Balsaminam.

Inutile opus susceperunt, cui pares non erant, Monachi Minoritae, Bartholomaeus Urbevetanus et Angelus Palla Iuvenatiensis, dum commentarios in Mesuen iuniorem ederent Venet. 1543. fol. Licet per Nursiae montes plantas semet conquisivisse fatentur, plantarum tamen vera cognitio ab iis aequae absuit ac veterum auctorum. Fuchsiam fere ubique sequuntur, et si quae de suis adiciunt, labuntur plerumque. Aethusam Meum; quam in Nursiae montibus invenerunt, verum habuerunt Meum antiquorum; Galangem crediderunt esse Innci odorati radicem, Matricariam cum Artemisia, Colchicum cum Hermodactylo, Cynosbaton cum Cynorrhodo, Carum cum Carota confuderunt. Quos cum amare satis, nec tamen iniuste reprehendisset Matthiolus, defendere semet conati sunt, de quo Vincentius Cantonus ad Matthiolum (epist. 1, 55.) scripsit. Respondit Matthiolus, ut solitus erat, acriter sed docte (ib. p. 63 f.).

\* \* \*

Insignia sunt merita, licet nil reliquerit, Lucas G R I N I I, Imolensis, prof. simplicium Patavini,

tum Bononiensis, demum Pisani († 1556.). Eximius is plantarum indagator, hortorum botanicorum Patavini pariter ac Pisani auctor, tanta liberalitate usus est erga Matthiolum, ut, quas ipse, amplissima collectione, describere sibi proposuerat, plantas omnes Matthiolo donaret, doctissimum etiam atque aequissimum adiungeret commentarium. „Scio,“ inquit *Matthiolus* (*epist.* 1, 118.) „me „maximam accepisse iacturam, cum mihi e „vis sublatu8 est Ghinius, in quo maximae et quam „plures fulgebant animi dotes, inter quas praeci „puum locum sibi vendicabant integritas, sinceri „tas, humanitas, fides. Nulla unquam in eo fuit „invidia. Cuius rei hoc maximum omnibus prae „bebit indicium, quod, quum decrevisset volumi „na quaedam, quae de plantis conscripserat, una „cum imaginibus in lucem edere, visis perlectisque „commentariis nostris, non solum ad me gratulato „rias scripsit literas, quod ipsum praevenerim, ip „siusque sublevaverim labores, sed quamplurimas „misit plantas, quas illi sane refero acceptas, ubi „earum imaginibus nostrum ornavimus Dioscori „dem.“ Simili laude eum extollit dignissimus eius discipulus Barthol. *Maranta* (*meth. cognosc. simpl.* p. 3. 4.).

Unicus fere, qui Ghinium parvi facit, successor eius Patavii est, Aloysius ANGUILLARA Romanus, eruditissimus vir, qui ad Cassianum Bas-

## 538 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

Wulffenii mihi, fl. hal. p. 54. (*Coronopus* f. *Serpentina* 383.). . . *Hypecoum procumbens* (*Cuminum sylvestre* II, 556.). . . *Epimedium alpinum* (700.). . . *Globularia* *Alypum* (880.).

*Euonymus europaeus* (169.). . . *Onosma echioi-*  
*des* (*Anchusa* 3, p. 704.). . . *Lycopsis pulla* (*Bu-*  
*glossum alterum flore nigro* 826.). . . *Musa pa-*  
*radisiaca* (189.). . . *Zizyphus vulgaris* et *Lotus*  
(211.). . . *Cordia Sebestena* (218.). . . *Cordia*  
*Myxa* (*Persea* 237.). . . *Datura Metel* (225.). . .  
*Convolvulus Soldanella* et *Imperati* (368.). . . *Gen-*  
*tiana Pneumonanthe* (481.). . . *Campanula Me-*  
*diola* (699.). . . *Salsola Tragus* (731.). . . *Hyos-*  
*cyamus Scopolia* (*Solanum somniferum* 755.). . .  
*Atropa Belladonna* (756.). . . *Coris monspeliensis*  
(*Symphytium petraeum* 682.). . . *Verbascum Lych-*  
*nitis* (*Lychnite* 801.). . . *Verbascum pulverulen-*  
*tum* (*Verb.* II, 800.). . . *Verbascum nigrum* III,  
*ib.*). . . *Verbascum sinuatum* (801.). . . *Hotto-*  
*nia palustris* (*Myriophyllum alterum* 812.). . . *Cor-*  
*tusa Matthioli* (698.). . . *Primula Auricula* (685.).  
. . . *Lyfimachia Ephemerum* (780.). . . *Cynanchum*  
*erectum* (*Apocynum* I, 774.). . . *Periploca graeca*  
(*Apocynum* II, *ib.*). . . *Salsola Soda* (*Kali maius*  
*cochleato semine* 364.). . . *Cressa cretica* (*Chamae-*  
*pitys altera* 670.). . . *Pastinaca Opopanax* (*Pseu-*  
*docostus* 54. *Panax Heracleum* 544.). . . *Echi-*  
*nophora spinosa* (381.). . . *Athamanta Matthioli*

(*Meum* 24.), . . *Aethusa Meum* (*Meum adu-*  
*rinum* 24.). . . *Phellandrium Mutellina* (*Meum al-*  
*pinum* 25.). . . *Scandix australis* (*Sc. italica* 403.).  
 . . *Caucalis nodosa* (404.). . . *Eryngium mariti-*  
*um* (505.). . . *Thapsia Asclepium* (*Panax Af-*  
*clepium* 545.). . . *Thapsia foetida* (851.). . . *La-*  
*serpitium Siler* (*Ligusticum* I, 547.). . . *La-*  
*serpitium Libanotis* (*Seseli aethiopicum* 550.). . .  
*Daucus Visnaga* (*Seseli massiliense* 550.). . . *Bu-*  
*pleurum fruticosum* (*Seseli aethiopicum* II, 551.).  
*Ligusticum peloponnesense* (*Ses. peloponnes.* 551.).  
 . . *Lagoecia cuminoides* (*Cuminum sylvestre* 556.).  
 . . *Seseli Ammoides* (*Ammi* 558.). . . *Bubon*  
*macedonicum* (*Petroselinum macedon.* 563.). . .  
*Smyrniolum perfoliatum* (*Smyrniolum creticum* 566.).  
 . . *Cachrys Libanotis* (*Libanotis* I, 575.). . . *Fe-*  
*rula communis* (578.). . . *Oenanthe pimpinelloi-*  
*des* (*Oenanthe* II, 627.). . . *Oen. crocata* (*Oe-*  
*nanthe* III, 628.). *Oen. fistulosa* (IV, *ib.*). . .  
*Astrantia Epipactis* (*Epipactis* 806.). . . *Viburnum*  
*Opulus* (*Samb. aquatica* 874.). . . *Linum mariti-*  
*um* (334.). . . *Lin. tenuifolium* (*ib.*).

*Oryza sativa* (346.). . . *Hyacinthus Muscari*  
(*Bulbus vomitorius* 452.). . . *Pancratium illyricum*  
(*Narcissus* III, *constant.* 859.). . . *Allium Victo-*  
*rialis* (*anguinum* 422.). . . *Allium subhirsutum*  
(*Moly* 544.). . . *Uvularia amplexifolia* (*Laurus*  
*alexandrina* I, 841.). . . *Iuncus bufonius* (*Ho-*

340 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

*lostium* 687.). . . *Leontice Leontopetalum* (596.).  
 . . . *Anthericum Liliastrum* (*Phalangium* 607.).

*Aesculus Hippocastanum* primum innotuit 1557  
 Matthiolo, cum Quakelbeen, medicus Busbequii,  
 in literis ad Matthiolum datis (*lib. 3. p. 101.*) il-  
 lius mentionem faceret.

*Epilobium angustifolium* (*Chamaedaphne* 842.).  
 . . . *Daphne Cneorum* (46.). . . *Amyris Opobal-*  
*samum* (54.).

*Euphorbia Characias*, myrsinites et *Paralias*  
 (864.). . . *Euphorbia Apios* (876.).

*Styrax officinale* (89.). . . *Diospyros Lotus*  
 (211.). . . *Melia Azedarach* (*Pseudo-Sycomorus*  
 232.). . . *Ledum palustre* (*Rosmarinum sylvestre*  
 576.). . . *Anagyris foetida* (665.). . . *Silene Saxi-*  
*fraga* (694.). . . *Sedum dasyphyllum* (*Sempervivum*  
*minus femina* 785.). *S. Cepaea* (666.). . . *Semper-*  
*vivum arboreum* (786.). . . *Cotyledon Umbilicus et*  
*ferrata* (787.). . . *Saxifraga Cotyledon* (788.). . . *Sa-*  
*ponaria Ocimoides* (*Cneorum Theophrasti* 872.).

*Releda Luteola* (*Pseudo Struthium* 442.). . .  
*Peganum Harmala* (542.) Quakelbeen misit.

*Prunus lusitanica* (197.). . . *Prunus Chamae-*  
*cerafus* (198.). . . *Eugenia caryophylla* (435.)  
 a Calceolario missa.

*Cistus villosus* (*mas* 158.). . . *Cistus salvifo-*  
*lius* (*femina ib.*). . . *C. Helianthemum* (*Flos solis*  
 546.). . . *Cistus Ledon* (*Ledum* 160.). . . *Ranun-*

culus hirsutus *Ran.* II, 458.). . . *Ran. polyanthemus* (*Aconitum* III, 764.). . . *Ran. Gouani* (*Aconitum* V, 765.). . . *Ran. Thora* (*Pseudo-aconitum* 766.). . . *Anemone narcissiflora* (*Ran.* IV, 458.). . . *Trollius europaeus* (*Ran.* VI, 459.). . . *Nigella fativa, damascena et arvensis* (*Melanthium* 580.). . . *Clematis Flammula* (680.). . . *Aconitum pyrenaicum* (*Aconit.* IV, 764.). . . *Aconitum Lycoctonum* (*Aconit.* VI, 765.). . . *Aconitum volubile* (*Aconit.* VII, 765.). . . *Aconitum Anthora* (*Aconit.* IX, 769.). . . *Aconitum Napellus* (*Napellus* 768.). Cum eo experimenta famosa in latronibus capitis damnatis instituit. . . *Adonis vernalis* (*Pseudo-Elleborum* 846.).

*Origanum heracleoticum et Onitis* (522.). *A Ghinio e Creta adlata*. . . *Origanum Dictamnus* (522.). . . *Maerubium Pseudo-Dictamnus* (522.). . . *Thymus Tragoriganum* (520.). . . *Moluccella laevis* (*Melissa constantinop.* 602.), . . *Dracopcephalum Moldavica* (*Melissa moldavica* 603.). . . *Teucrium montanum* (*Polium alterum* 612.). . . *Teucrium capitatum* (*Polium* I, 612.). . . *Stachys recta* (*Sideritis* II, 711.). . . *Phlomis fruticosa* (*Verbascum* IV, 800.). . . *Satureia iuliana* (*Saxifraga* I, 693.). . . *Satureia montana* (*Saxifr.* II, 693.). . . *Satureia capitata* (*Thymum* I, 551.). . . . *Sideritis syriaca* (*Stachys* I, 605.). . . *Orobanche elatior* (409.). . . *Digitalis Thapsi* (*Bac-*



342 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

*charis* 538.) a Lacuna missa. . . *Lathraea Squamaria* (*Dentaria maior* 685.). . . *Antirrhinum Elatine* (716.). . . *Antirrhinum spurium* (*Veronica femina* 514.).

*Cochlearia Draba* (*Arabis* f. *Draba* 530.). . . *Iberis umbellata* (*Thlaspi* IV, 428.). . . *Thlaspi faxatile* (*Thlaspi* III, 427.). . . *Sisymbrium polyceraton* (*Frio altera* 431.). . . *Sisymbrium stric-tissimum* (*Draba lutea* 430.). . . *Dentaria pentaphylla* (684.).

*Geranium tuberosum* (*Geran.* I, 621.). . . *Geranium rotundifolium* (*Geran.* II, 621.). . . *Geranium reflexum* (*Geran.* V, 623.). . . *Erodium malacodes* (*Geran.* VI, 624.).

*Spartium spinosum* (*Acacia altera* 172.). . . *Astragalus Cicer* (*Cicer sylvestre* 335.). . . *Glycyrrhiza echinata et glabra* (486.). . . *Astragalus Poterium* (495.) *Busbequius* misit. . . *Pforalea bituminosa* (*trifolium asphaltites* 608.). . . *Coronilla Securidaca* (641.). . . *Trigonella polycerata* (*Securidaca minor* 641.). . . *Hippocrepis unifili-quosa* (*Sferra cavallo* 648.). . . *Cytisus Laburnum* (*Anagyris altera* 665.). . . *Medicago arbo-rea* (*Cytisus* 810.). A Barthol. *Maranta acceperat.* . . *Galega officinalis* (836.). . . *Ornithopus scorpioides* (895.).

*Hypericum Androsaemum* (668.). . . *Hypericum Coris* (669.).

*Zacyntha verrucosa* (389.). . . *Apargia tuberosa* (*Cichorium consantinop.* 388.). . . *Lactuca quercina* (400.). . . *Scorzonera glastifolia* (410.). . . *Scorzonera hispanica* (ep. 5. 219.). . . *Carthamus lanatus* (*Atractylis* 593.). . . *Santolina maritima* (*Gnaphalium* 625.). . . *Serratula alpina* (*Cirsium* 817.). . . *Cacalia alpina* (823.). . . *Gnaphalium* ~~alpina~~ *Leontopodium* (828.). . . *Inula crithmifolia* (382.). . . *Inula viscosa* f. *Pulicaria* (*Conyza maior* 629.). . . *Inula odora* (*Conyza minor* 629.). . . *Tussilago alpina* (*Asarina* 370.). . . *Xeranthemum annuum* (*Ptarmica alba* 441.). . . *Erqtera corymbosa* (*Chamaeleon niger Morantae* 491.). . . *Artemisia Santonica* (*Abfynth. Seriphium* 511.). . . *Artemisia coerulescens* (*Abfynth. maritimum* α. 509.). . . *Artemisia pontica* (*Ambrosia* II. 619.). . . *Prima* est *Coronopus*. . . *Anthemis Pyrethrum* (*Pyrethrum alterum* 574.). *Alterum* videtur esse *Pimpinella*. . . *Chrysanthemum italicum* (*Helichrysium* 753.). . . *Doronicum plantagineum* (*Alisma* 666.). *Bauhinus* vult *Arnica* esse montanam, sed valde dubito. . . *Doronicum scorpioides* (*Aconitum Pardalianches* 762.). . . *Doronicum austriacum* (*alterum ib.*). . . *Doronicum Pardalianches* (763.). . . *Achillea aegyptiaca* (*Abfynthium seriphium aegyptiacum* 511.). . . *Bupthalmum spinosum* (*Aster atticus alter* 818.).

*Orchis mascula* (*Testiculus* 1, 635.). . . *Or.*

### 342 LIB. IV. CAP. II. PATRIAR. HERB.

chis Morio (*Test. iii. —*). . . Orchis conopsea (*Test. iv, maior fig. 4*). . . Orchis maculata (*Test. iv, minor fig. 636.*). (*Palma Christi maior 637.*). . . Orchis coriophora (*Test. v, 636.*). . . Orchis nigra (*Palma Christi minor 637.*). . . Ophrys myodes (*Test. ii, 635.*). . . Ophrys ?anthrophora (*Test. v, mai. fig. 636.*). . . Epipactis ovata (846.).

. . . Arum italicum (448.). . . Arum proboscideum (*Arum ib.*). . . Arum Arisarum (450.). . . Arum tenuifolium (*Arisarum alterum ib.*). . . Pinus Mughus, Cembra, halepensis et maritima (98.). . . Quercus Pseudofuber (181.).

. . . Pistacia Terebinthus (108.). . . Juniperus phoenicea et lycia (122.). . . Acacia vera (171.). . . Myristica Nux moschata (224.). . . Hydrocharis Morfus. ranæ (*Nymphæa parva 644.*). . . Smilax Saraparilla (838.).

. . . Marfilea quadrifolia (*Lens palustris altera 783.*) a Cortufo accepta. . . Aspidium Lonchitis (*Lonchitis aspera maior 661.*). . . Blechnum boreale (*Lonchitis aspera minor 661.*). . . Acrostichum Marantæ (*Lonchitis Marantæ ep. p. 168.*). Hoc missum a Luca Ghinio pro Lonchitide, cum Aspidio Lonchitide a Matthiolo commutatum erat (*Marant. meth. p. 21.*).

Interpretationem hispanicam commentariorum Matthioli edidit Andr. LACUNA, Salmant. 1560.

## EXAM. LACUNA. IAXAVA. MARANTA. 545

fol., quam auxit et illustravit *Suarez de Ribera*. Matr. 1752. fol. Lacuna tamen Ruellii et Matthioli interpretationem emendare studuit, ex ipso codice antiquo, non tamen neapolitano, quod docuit *Weigelius* (*Baldingers med. Journ. St. 32. p. 10.*).

Io. IAXAVA etiam compilavit simile opus: *Historia de las Yervas y Plantas*, facada da Dioscorides y otros autores. Antverp. 1557. 8.

Iuvenis, quocum de his aliisque plantis amice disputavit Matthiolus (Barthol. MARANTA) Venusinus, Pisis a Lucae Ghini ore pependit, post Neapoli vixit in horto Pinelli, Apuliae et Calabriae montes, Garganum maxime, perquisivit. Edidit autem *Methodum cognoscendorum simplicium*, Venet. 1559. 4., librum, qui principatum fere sui aevi habet. Eximia enim libertate a praeconceptionis opinionibus, eruditione non mediocri, incredibili fere ingenii acumine conspicuum continet regulas, iuxta quas plantae veterum eruendae sint, multasque indicat plantas, quas ipse primus invenerat: e. g. verum *Cytisum veterum* (p. 36.), *Verbenacam* in Apulia (p. 175.) et *Thymelaeam* ad Cajetam (p. 175.), *Pistolochiam* (23.) et *Ammi* (27.). In nominibus veterum plantarum et partium descriptionibus similitudinibus etiam indicatis cautissime agendum esse. Maxime vero ridet homines imbecilli animo ac paene languenti, qui Dioscoridi addere nihil audeant, quum omnes plantas ab eo

descriptas fuisse opinentur. Asphodeli, cuius unicam solummodo speciem cognoscat Diosc., se tria genera in Gargano monte invenisse: Ranunculi decem: Geranii undecim: Trifolii viginti. Multas esse apud Theophrastum, quas siluerit Diosc. multas exteras arbores vel male hunc descripsisse vel penitus ignorasse. Nonnullas etiam varia aetate exposuisse, ut ad inventutem solam aut ad adultam aetatem quadret. Dictamnium cretensem omnino flores habere, quos negaverit Diosc. Demum de codicum mendis. Praeclare omnia, dilucide, optime exposita sunt.

Marantae aemulus fuit Laurentius PEREZ, seplasiarius Tolitanus, doctissimus vir, qui Graeciam et Asiam ipsam adierat. Optimas is plantarum veterum descriptiones dedit in libro hispanico *de la thetiaca*, Toledo 1575. et synonymiam eruditissimam plantarum in libro: de medicamentorum delectu, quem 1590. Toleti Franc. Penla edidit (Cf. *Cavan. in anal. de cienc. nat. n. 20. p. 110.*).

Valerius CORDUS, Euricii filius, si diutius vixisset, maturitatem quamdam ipsius opera consequuta fuissent, quae iis magnopere deest. Studiose enim perquisiverat Saxoniam, praesertim saltus Hercynicos, Halensem ditionem ad Stasfurthum usque; tum Misniam, Bohemiam, Austriam, Italiam borealem. Romae febre correptus, cumque annum nondum trigessimum attigisset, extinctus

(† 1544.) reliquit *Adnotationes in Dioscoridem; Historiam plantarum et Sylvam observationum* in itinere per Germaniam institutarum: quae omnia Conr. Gesnerus Argentinae 1561. fol. edidit, iconibusque adornavit. Librum quintum descriptionum e codice Gesneri edidit C. C. Schmiedel cum *Gesneri opp. Norib.* 1751. fol. Italicas is continet 25 stirpes, non admodum raras.

Minoris momenti sunt adnotationes in Dioscoridem, cuius ne textum quidem graecum legerat, cuius plantas iuvenis, media in Germania educatus, cognoscere non poterat. Errorum inde cetera excusanda. Asphalathum esse cassiam ligneam: lotum idem cum fantalo; quercus species graecas omnes in Germania crescere: Phillyream cum Ligustro commutat, nec scit, quid de Tilia agendum.

Historia plantarum plures continet ad id usque tempus incognitas plantas: multas tamen etiam obscuras, plurimas novis nominibus decoratas, quas haud facile aliquis enodare potuerit: e. g. Chamaepeuce (f. 111.) pro qua Gesnerus Lycopodium clavatum pingit. Falsa praeprimis occurrunt in quarto libro, ubi de exoticis agitur: Guaiacum enim et Scammonia (f. 210.) neo ipsa Gesneri fictitia icone clariora fiunt. Sunt autem, quas Valerius primus recenset, aut melius maioribus suis, sequentes:

*Cancalis Anthriscus (Daucoides minus* f. 159.

### 348 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM

b.). Cf. C. Bauhin. *prodr.* p. 80. . . *Selinum Oreofelinum* (*Polychrestum* f. 155. b.). Sed radicem tricubitalem (*sphalma forte*) facit. . . *Selinum palustre* (*Olsenichium* f. 149. a.). Utrumque Gesnerus cognovisse non videtur. . . *Menyanthes trifoliata* (*Trifolium palustre* f. 96. b.). . . *Drosera rotundifolia* (f. 86. a.). . . *Parnassia palustris* (*Hepatica alba* f. 152. b.).

*Phalangium ramosum* (f. 149. a.). . . *Phalangium Liliago* (f. 190. b.).

*Adoxa Moschatellina* (*Moschatella* f. 172. b.).

*Vaccinium Oxycocco* (f. 140. b.). . . *Saponaria Vaccaria* (*Thamecnemum* f. 104. a.). . . *Saxifraga Aizoon* (*Aizoon ferratum* f. 92. b.).

*Euphorbia Peplus* (f. 106. a.). . . *Rosa arvensis* (*Cynorrhodos tertia* f. 19. b.).

*Comarum palustre* (*Pentaphyllon palustre* f. 96. a.). . . *Thalictrum minus* (f. 97. b.). . . *Ranunculus arvensis* (f. 120. a.). . . *Ranunculus bulbosus* (f. 121. a.). . . *Ranunculus Flammula* (f. 121. b.).

*Lathraea Squamaria* (*Anblatum* f. 89. b.).

*Dentaria enneaphylla* et *bulbifera* (*Corallodes* f. 151. a.).

*Cytisus ? austriacus* (f. 187. b.). . . *Cytisus nigricans* (*Pseudocytisus* f. 188. a.).

*Lactuca faligna* (*Ixopus* f. 104. a.).

*Epipactis latifolia* (*Alisma* f. 150. b.).

*Sagittaria sagittaeifolia* (f. 87. a.). . . *Hippophaë rhamnoides* (*Oleaster. german. f.* 186. b.).

Regiones Europae plantarum feracissimas docti viri plures curiose perquisiverunt: quorum opera utilior multo fuisset, ni solis nominibus Dioscoridis, Plinii, Fuchsi et Tragi contenti, descriptiones nimis neglexissent.

Ut de *Helvetia*, plantarum, alma matre, ordi-  
diar, summum hic quidem indagatorem rei herba-  
riae, Conradum *Gesnerum*, silentio praeterire li-  
ceat, quippe qui infra, ubi de conatibus systema  
condendi praecipiam, meliorem obtinebit locum.

Amici autem Gesneri, Benedictus ARETIUS,  
prof. theologiae Bernensis († 1578.) et Io. FA-  
BICIUS, clericus Curienfis, hic nominandi sunt,  
quorum ille montes Niesen et Stockhorn in ditio-  
ne Bernensi peragravit, et quadraginta fere plantas  
alpinas, helveticis maxime nominibus insignitas,  
invenit (*Ad Valer. Cord. opp. f.* 232 — 235.):  
Erutae perquam difficiles sunt, quum nec synonyma  
nec descriptiones addantur. Orchidem tamen  
odoratissimam (*Brändlin*): Salicem myrtilloidem  
aut reticulatam (*Balmenstritten*) Phellandrium  
Mutellinam (*Mutrina*): Primulam Auriculam, fa-  
rinosam, integrifoliam (*Flüebumen*): Violam bi-  
floram (*Gule Violen*): Eryngium alpinum (*Edel-*



*distel*): *Trollium europaeum* (*Dönij*) certo intelligo.

Paucula sunt et negligenter notata, quae *Fabrics* in monte Galandae, ditionis Rhaeticae, invenit (*Ad Valer. Cord. f. 255.*). Inter ea *Doronium* plantagineum, *Veratrum* album, *Ranunculus* montanus et glacialis etc.

Multo maiora sunt *Veronenfium* botanicorum de montis *Baldi*, amoenissimi et ditissimi, gazis merita. Primus, qui eum multoties conscendit. Franc. CALCEOLARIUS, pharmacopola Veronenfis fuit, quem comitati sunt celebres viri, Ulysses Aldrovandus, Aloyfius Anguillara, Iulianus Fumanella et Io. Bapt. Olicea (*Iter in Baldum montem ad calc. Franc. Seguieri plant. Veron. vol. 2. p. 445 f.*).

Baldus mons, lacui Beraco (*Lago di Garda*) ab oriente contiguus, inter Veronam et Tridentum extenditur. Altissimum cacumen, a Comite *Sternbergio* nuper mensuratum, 6860 pedes supra maris planum adscendit. Plantarum varietas infinita fere, quum praeter alpinas et boreales omnes fere magis australes ibi occurrant. A Buffolengo inde vallem clausam, pagum Caprini et sacrum Mariae Coronariae visitavit. Rariores plantae, quas invenit, sunt sequentes:

*Erythronium Dens Canis* (*Mithridatica.*) . .  
*Hypecoum procumbens.* . . *Reseda Phyteuma*

## EXAMEN. CALCEOLARIUS. PONA. 351.

(*Reseda Plinii*): Cf. *Sternbergii iter in rhaeticas alpes*, p. 50. . . *Athamanta cretensis (Daucus)*. . . *Laserpitium Libanotis (Seseli aethiopicum)*. . . *Ligusticum peloponnesiense*. . . *Tordylium officinale (Seseli creticum)*. . . *Campanula saxatilis*. . . *Valeriana celtica et montana*. . . . *Aconitum album*. . . *Arum Arisarum*. . . *Prunus Chamaeerasus*. . . *Anemone baldensis*. . . *Arnica scorpioides*. . . *Arnica cordata Wulff. (Pseudo-Doronicum)*. . . ~~*Plantago Wulffemii*~~ (*Coronopus serpen-  
tius Matth.*). . . *Ferula nodiflora f. rablenfis*. . . *Thapsia garganica*. . . *Saxifraga adscendens Vahl*. Cf. *Sternbergii iter nuperrimum* p. 50. Plures species sub generico nomine comprehensas non rite distinxit, nonnullas etiam satis obscuras nominat: e. g. *Acacalidem* Diosc., quam solus *Amatus* pro *Erica* baccante habuerat. Videtur tamen Calceolarius *Empegrum nigrum* voluisse.

Vestigia Calceolarij pressit Io. PONA, pharmacopolus etiam Veronensis, qui ad Car. Clusium primo, dein seorsim edidit: *Plantas, f. Simplicia, quae in Baldo monte reperiuntur*, Basil. 1608. 4. iconibus ligno incisis decoratas. Ioachimo Iungermannio Noribergenſi et Nicolao Maronea comitibus totum montis amplissimum tractum percucurrit, non neglectis Caesaris *Niclesolae* viridariis, quae Pontini erant, ac in quibus plantae graecae plurimae colebantur. Praeter has, alio loco recensendas, Bal-

denfibus ipfis Pona operam dedit, praecipue frequentibus:

. . . *Veronica faxatilis* p. 74. . . *Wulffeniae Bonarotae* (*Veronica petraea sempervirens* p. 72.). Haec Linnaeo falfo dicta *Veronica Pomae*. . . . *Campanulae Cervicariae* (*Trachelium maius petraeum* p. 62.). . . *Phyteumati comofo* (*Trachelium minus petraeum* p. 70.). . . *Bupleuro graminifolio* (*Sedum petraeum bupleuri folio*, p. 111.). . . *Geo montano* (*Caryophyllata* p. 91.). . . *Saxifragae adfcendenti* (*S. alba-petraea* p. 76.). . . *Eherleriae Sedoidi* f. *Sileni acauli* (*Ocimoides muscosum* p. 89.) . . *Arenariae bavaricae* (*Saxifraga bavarica* p. 60.). . . *Ciffo guttato* (p. 8.) . . *Atrageni alpinae* (*Clematis cruciata* p. 68.). . . *Ranunculo rutaefolio* (*R. alpinus Coriandri folio* p. 87.). . . *Barthae alpinae* (*Clinopodium alpinum* p. 95.). . . *Myagro faxatili* (*Thlafpi petraeum myagrodes* p. 78.). . . *Geranio argenteo* (p. 91.). . . *Trifolio alpino* (p. 84.). . . *Artemiffae Mutellinae* (*Abfinthium alpinum* 2.). . . *Senecioni incano* (*Abfinthium* 3 *alpinum*.) . . *Centaurae Rhaponticae* (*Centaurium maius* p. 65.). . . *Aspidio alpino* (*Filix faxatilis crifpa* p. 101.).

Columnnae amicus et Clufii, Ferrandus IMPERATUS pharmacopoeus Neapolitanus, fedulo plantas italicas et praefertim marinas, collegit, et vel amicis largitus eft vel ipfe etiam in *Historia natu-*

## EXAMEN. PONA. LUSITANUS. 353

rali, quae italice primum Neap. 1599. fol., dein latine Colon. 1695. 4. prodiit, publicavit. Mentionem maxime merentur:

Verbena nodiflora (p. 889.). . . Valeriana italica (*bulbosa* p. 869.). . . Crucianella monspeliaca (*Rubia spicata* p. 880.). . . Telephium Imperati (872.). . . Convolvulus Imperati (*marinus* 886.). . . Thapsia garganica (884.). . . Phyteuma pinnatum (*Rapunculus creticus* 882.). . . Gypsophila Struthium (871.). . . Euphorbia mauritanica (*Tishymalus aphyllus* 876.). . . Argemone mexicana (*Papaver spinosum* 873.). . . Ranunculus illyricus (888.). . . Cichorium spinosum (881.). . . Cnicus Acarna (883.). . . Parmelia fuciformis (*Fucus capillaris* 850.). . . Parmelia Roccella (*Alga fucus* 851.). . . Fucus barbatus (*Abies marina* 849.), natans (*Acinaria* 844.), lumbricalis (*Furcelluria* 842.). . . Plocamium (*Palmula marina* 844.). . . Ulva intestinalis (*Cava* 858.).

\* \* \*

*Borussiae* plantas recensuit Ioannes Wigandus, Episcopus Pomezaniensis (*Vera historia de Succino prussico et de herbis in Borussia nascentibus*, Ien. 1590. 8.). Nomina antiquorum male traducta ad boreales plantas, ut vix possis dignoscere, quales velit. Stratiotem tamen aloidem, Melampyrum cristatum, Callam palustrem, Glaucem mari-

## 354 LIB. IV. CAP. II. PATRIARUM.

timam, Gladiolum communem et paucas alias manifestas habet.

\* \* \*

*Hercyniae* saltus, borealis Germaniae gazophylacium botanicum, Io. THALIVS, medicus Northufanus († 1587.), primus perquisivit (*Sylvæ Hercynia* Frkf. ad Moen. 1588. 4.). Laurentium Hial, rei herbariae in universitate Ienensi professorem, laudat praeceptorem. Insignem copiam et rariorum hodie plantarum multarum etiam varietatum, congeffit, nonnullas, praecipue graminum, erutu difficillimas. Novae sunt, aut melius descriptae:

*Veronica triphyllos* (*Dactyliobotanon coeruleum* 39.). . . *Eriophorum alpinum* (*Gramen iunceum lanigerum* 55.).

*Scabiosa Columbaria*, ochroleuca et arvensis 108. 109. . . *Potamogeton perfoliatus* (μαλακόφυλλον 86.).

*Myosotis palustris* (*Echium palustre* 40.). . . *Campanula thyrsoides* (*Cervicaria tenuifolia* 32. s. 4.). . . *Campanula glomerata* (*Rapunculus sylvestris umbellatus* 94. t. 6.). . . *Thesium Linophyllum* (*Linaria montana* 72.). . . *Lithospermum purpureo-coeruleum* 74. . . *Cicuta virofa* (33.). . . *Caucalis daucoides* (*Daucus ἐχινόκαρος* 3-.). . . *Laserpitium pruthenicum* (*Daucus λασιόκαρπος* 36.). . . *Laserpitium latifolium* (*Li-*

## HERBARUM EXAMEN. THALIUS. 355

*banotis Theophrasti* 71.). . . *Selinum Cervaria*  
(*Libanotis alba minor* 71.). . . *Seseli annuum*  
(*Libanotis ναεθηκοειδής* 71.). . . *Chaerophyllum*  
*hirsutum (Myrrhis Broccenbergenfis* 77.). . . *Li-*  
*num catharticum (λινσκάριος* 72.).

*Iuncus triglumis (Lychnanthemus tenuis* 60.).

*Vaccinium uliginosum (Myrtus tenuifolia* 18.).  
*Vaccinium Oxycoccus* 82.

*Trientalis europaea (αλσινάνθεμον* 15.). . . .  
*Gypsophila fastigiata (Symphytum petraeum* 113.).

*Saxifraga tridactylites (Dactylis botanion alba*  
*flore* 39.). . . *Lychnis Viscaria (ἑξέκαυλος* 59.). . .  
*Cucubalus Otites (κράνερόφιλον* 68.). . . *Euphor-*  
*bia Cyparissias cum Aecidio Euphorbiae* 126. . .  
*Euphorbia amygdaloides* 127. . . *Rubus saxatilis*  
102. . . *Ranunculus aconitifolius* 101. . . *Scutel-*  
*laria galericulata (Sideritis* 3, 104.). . . *Euphra-*  
*sia lutea (Ericoides luteum* 39.). . . *Euphrasia*  
*Odontites (Ericoides purpureum* 40.).

*Draba verna (Pilosella filiquata* 84. tab. 7.  
f. E.). . . *Lunaria rediviva* 74. . . *Arabis Thaliana*  
(*Pilosella filiquata* 84. f. 7. f. D.).

*Geranium lucidum (Saxatile ὑγροσκοπέλλον*  
44. . . *Anthyllis Vulneraria (Arhetica Saxonum*  
10.). . . *Orobis tuberosus (Astragalus sylvati-*  
*cus* 7. t. 1.). . . *Orobis vernus* 80. . . *Lathyrus*  
*latifolius* 74. . . *Astragalus microphyllus (Cicer-*  
*sylvestre minus* 37.).

Scorzonera glastifolia f. humilis 117. . . ? Cre-  
 pis tectorum (*Chondrilla* alla species 22.). . .  
 Hypochoeris glabra (*Chondrilla altera* 24.). . .  
 Hypochoeris maculata (*Pilosella maior Gallorum*  
 83.). . . Apargia hispida (*Chondrilla altera Do-*  
*donati* 23.). . . Hieracium alpinum 57. . . Hie-  
 racium cymosum (*Intybi spec.* 5, 64.). . . Hie-  
 racium sabaudum (*Intybi spec.* 7, 65.). . . Hiera-  
 cium praemorsum (*Intybus αφυλλάκαυλος* 9, 66.)  
 . . Hieracium murorum (*Int. nigrifolius lanugi-*  
*nosus* 11, 67.). . . Hieracium paludosum (*Int.*  
*uliginibus familiaris* 13, 67.). . . Sonchus alpi-  
 nus (*Int. πλατύφυλλος* 62.). . . Chondrilla iun-  
 cea (*Int. species* 3, 64.). . . Prenanthes purpu-  
 rea (*Lact. sylv. ἐρυθράνεμος* 75.). . . Serratula  
 tinctoria (*Centauroides* 26.). . . Senecio palu-  
 dosus (*Conydia aquatilis maxima* 21.). . . Sene-  
 cio farracenicus (*Consolida farracenicica* 27.). . .  
 Conyza squarrosa (*maior montana* 20.). . . Cen-  
 taurea montana (*Cyanus integrifolius* 29.). . .  
 Centaurea phrygia (*Cyanus κυνογλωσσόφυλλος*).  
 . . Centaurea paniculata (*Cyanus sylvestris tenui-*  
*folius*).

Orchis bifolia (*candida* 82.). . . Epipactis pal-  
 lens (*Alisma κυμβαλιάνθεμον* 13.). . . Cyprip-  
 edium Calceolus (*Alisma καιλάνθεμον* 13.).

Betula pubescens (*pumila* 20.). . . Empetrum  
 nigrum (*Erica baccifera* 41.).

*Blechnum boreale* (*Lonchitis aspera* 72.). . .  
*Lycopodium Selago* (*Selago tertia* 116.).

\* \* \*

Ipse Paracelsi et adfectorum stulta ignorantia, licet omnis eruditioni generis vehementer obfuerit, haud impedivit tamen rei herbariae patriae culturam. Plerique enim, qui in Paracelsi verba iuraverunt, adeo adhaeserunt patriis, i. e. germanicis medicamentis, ut summo studio ea conquirere, summa diligentia describere et illustrare suum ducerent.

Celeberrimus fere est Leon. THURNEISEN, natus Basileae 1530. Aurificis officinam, fraude captus vilissima, deseruit, stipendia meruit et in metalli fodinis laboravit, donec agryta curationibus celebratus, Electori Brandenburgico commendatus, ab hoc archiater nominatus fuerit. Quo munere indigne abusus, in exilium pulsus, vagabundus Coloniis 1595. obiit. „*Historiam plantarum omnium*,“ Berol. 1578. fol. edidit, in quo umbelliferas solas tractat, admistis nugis theosophicis et astrologicis.

Non defuerunt inter hos, qui ad augendam rem herbariam nati viderentur: e. g. Io. *Fischartus*, obscurus ceteroquin homo, cuius librum Michael *Toxites*, Rhaeticus, post medicus Haganoensis edidit. Titulus est: „Horn des Heyls moischlich, cher Blödigkeit: oder Kreutterbuch, darin die Kreutter des teutschen Landes, aus dem Licht



„der Natur, nach rechter Art der himmlischen  
 „Einfließung beschrieben durch *Philomusum Ano-*  
 „*nymum*, nachmals durch Doctorem *Toxiten*.“  
 Strasfb. 1606. fol. Astrologicus liber continet ta-  
 men patriarum herbarum descriptiones adeo exac-  
 tas, adeo claras, ut optimae omnium iudicari pos-  
 sint, quae ad id usque tempus prodierant. Loca  
 etiam natalia egregie indicantur: icones adduntur  
 eximiae, licet Dulcamarae fallissima sit. Nomina  
 ceteroquin erronea, ut Gratia Dei pro Erodio cicu-  
 tario, Smyrnum pro Imperatoria, Salicaria pro  
 Eysmachia, Galeopsis Melissa pro Leonuro Marru-  
 biastro ponantur.

\* \* \*

*Hispanicae* provinciae, *Valenciae* plantas hoc  
 faeculo primus examinavit Iacob. Petr. ESTREVE,  
 interpret theriacorum Nicandri. Licet *Hallerus*  
 id herbarium *Valentinum*, velut typis excusum iam  
 citet (*Bibl. bot.* 2, 671.) nunquam tamen pro-  
 diit, a solo *Escolano* (*hist. de Valencia* 1, col.  
 681.) visum. Cf. *Cavanill. in annal. hist. natur.*  
*hispan.* n. 20. p. 116.

Alter peregrinator botanicus Hispanus fuit Ioan-  
 nes FRAGOSUS Toletanus, chirurgus Philippus II,  
 qui cum Franc. Hernandezio Hispalensem provin-  
 tiam perquisivit. Edidit librum utilem „de succe-  
 dancis medicamentis. Matrit. 1575. 12. Cf. *Ca-*  
*van. l. c.* p. 111.

## EXAM. ESTEVE. FRAGOS. CIENFUEGOS. 359

Tertius Bernardus CIENFUEGOS Tarraconensis, ab Ignatio *Affo* primo, dein a *Cavanillesio* laudatus, professor Alcalensis, totam Hispaniam peragraverat. Reliquit septem tomos historiae plantarum, cum picturis egregiis et doctis adnotationibus, qui etiamnum scripti latent in bibl. regia Escorialensi. Cf. *Cavan.* l. c. p. 123,

---

### CAP. III.

#### HORTORUM CULTURA,

**P**aucis exponi nequit, quot quantaque emolumenta in rem herbariam augendam et amplificandam ex hortorum botanicorum cultura redundant. Et enim, quae, per varia climata, solique et terrarum innumeras differentias dispersa, a nemine fere observari et examinari possint, ea omnia unus hortus botanicus iungit, observatuque ita facilia reddit, ut instructioni iuventutis suppetant. Accedit, differentias plantarum, siue essentielles sint siue accidentales, non nisi in cultis rite decerni posse, novas etiam plurimas species, quae a negligente aut non satis instructo observatore peregrinante haud definitae erant, in horto demum cultas optime determinari. Unde elucet, tum omnino plantarum cognitionem incrementa cepisse laetissima, cum horti coli coepissent. Fuit id autem praecipuum in Italia, medio saeculo decimo sexto,

Antiquissima hortorum botanicorum vestigia, Theophrasti Eresii, Mithridatis regis, Antonii Castoris, Caroli Magni, Matthaei Sylvatici, suis iam locis citavimus. Post restitutas autem literas Italia prima et illustria proposuit exemplaria hortorum et privatorum et publicorum, in quibus plantae omnis generis, et a remotissimis regionibus adlatae, coelarentur.

Immortalis Torquati Tassi patronus, literarum omnium patronus liberalissimus, Alfonsus Estensis, dux Ferrariae, gloriam meruit sempiternam eo etiam nomine, quod, Musa maxime Brassavolo mone, hortos plures botanicos instituerit ac coelavit: amoenissimum maxime, Pado circumdatum, quem Belvedere nominabat (*Brasavol. exam. p. 288. 289. 299.*). Tribus iis hortis praefuit per aliquod tempus Pancius, prof. Ferrariensis (*Fantuzzi vita di Aldrovandi, p. 257.*). Hoc duce exemplum sequuti sunt plures Ferrarienses. Ioannes *Brasavolus*, patruus Musae viridarium habuit (*Brasavol. exam. p. 316.*). In horto nobilis *Acciajuoli* Ferrariensis rariores pleraeque plantae conspiciebantur. (*Amat. Lusit. in Diosc. p. 290. 375. 448.*). Tantum omnino Ferrariae studium plantarum exoticarum fuit, ut exteri botanophili eo potissimum confluerent, quod de Io. *Falconero* Anglo, narrat Amatus, qui herbarium insigne, Ferrariae potissimum collectum, servabat (*in Diosc. p. 357.*

357.). Quotannis enim Ferrarienses in Graeciam Asiamque navigia mittere consueverant, quae semina plantasque rariores inde reportarent.

Simile fuit studium Venetorum. Patricii Michellii et Cornarii laudantur a Brasavolo, Marino et Anguillara, quod simplicia ex Oriente advehi, plantasque rariores in ditissimis hortis coli iusserunt. Aegyptiacas etiam plantas, ut fabam Aegyptiam (*Arum Colocasia*) in pluribus venetis hortis coli vidit *Amatus* (in *Dioscor.* p. 246.). Hieronymum Capellum, Senatorem Venetum et Cretae proconsulem, plantas innumeras graecas Patavium misisse, ac Nicolum Contarenum Patricium, hortum ditissimum prope Campum Sancti Petri aluisse, testatur Prosp. *Alpinus* (in *praef. ad exot.*).

Patavii vixit botanices summus promotor, Gaspar a Gabrichis, qui nullis sumptibus pepercit, ut quascunque conquireret plantas (*Stephan. de re hort.* p. 45. *Gesner de hort. German. f.* 239. b.). Tres alios hortos patavinos, Priuli, Pasqualigi et Bernard. Travisini laudat *Anguillara* (*di sempl.* p. 34. 80. 90.).

Primus omnino hortus academicus Pisis, iubente Cosmo medico, praefecto Luca Ghinio, instructus fuit. Anno enim 1544 ad Arnun flumen magnificus Princeps donavit fundum, qui tum a Ghinio tum a Caesalpino successore adeo ditatus fuit, ut Belonium 1555, admiratione impleverit. Qui post

Cosmum Etruriam imperio rexit, Ferdinandus Iosephum *Benincasam*, quem *Casabonam* vulgò appellant, in Orientem misit, ut plantas et semina colligeret, reducem hortò praefecit (*Calvi comm. histor. Pisani vireti. Pis. 1777. 4.*). Is etiam Florentinum hortum primus instruxit.

Post Pisanum primus fuit Patavinus hortus, inauguratus 1545. a Patricijs Venetis et Patavinis, qui rei herbariae promovendae studerent. Primus index, satis pauper, Venetiis 1591. 8. prodit plagulis tribus.

Coeperunt autem primam cathedram stabilire ut simplicia omnia exponerentur, quam ex anno 1533. primus occupavit Franc. *Bonafides* (*Tiraboschi letterat. ital. vol. 7. p. 2. p. 50.*). Suadente praeprimis et indies magis urgente ipso Bonafide Daniel tandem Barbarus, patriarcha Aquilagenfis, viridarium exstrui iussit (*Belon. neglect. cult. plant. ad Clus. exot. p. 239.*). Id iam 1535. factum fuisse licet Hallerus arbitretur (*Bibl. bot. 1, 266.*). Tiraboschio tamen potius credendum, qui annum 1545. ex actis ipsis indicat. Aloyfio Anguillarae, primo horti praefecto mox successit Melchior Guilandinus, ei autem Io. Ant. Cortusus et Prosp. Alpinus.

Sequuti sunt Bononienfes, qui 1568., Ulyffe Aldrovando hortante, hortum in patria academia stabiliverunt.

In agro Veronensi Caesar Nicelola habuit prae-

dium, plantis peregreis dicatum, ubi in viridariis duobus amplissimis colebantur rarissimae quaecunque graecae plantae, quas *Pona* descripsit (*iter in Baldum*, p. 9.).

Neapoli erat hortus ditissimus Io. Vincent. *Pinnelli*, quem multoties celebrat *Maranta*: Arimini Iul. *Moderatus*, Romae Scipio ad S. Apostolum hortos alebant, quos nominat C. Gesnerus.

In agro Lucensium hortum satis amplum ac locupletem habuit Vincentius a Monte Catino, ubi a longo inde tempore arbores peregrinae colebantur (*Belon. l. c.*). Florentiae Nic. Goddius hortum aluit praestantissimum, cui praefuit Benincasa.

\* \* \*

Gallia pauciores eo aevo hortos botanicos exhibet. Celeberrimus fuit Renati Bellai, episcopi Cenomanensis, omnium, ut *Stephanus* ait (*de re hort. p. 31.*) nobilissimus et ditissimus. Nominat id praedium Toutuoia, Cenomanorum urbi vicinum, *Belonius* (*neglect. cult. p. 216.*).

Cum idem Belonius anno 1558. etiamnum Parisinae universitatis antistites moneat, facili negotio posse hortum institui academicum (*l. c. p. 240.*), patet, eo demum tempore caruisse horto botanico Parisios.

Primum autem in Gallia conditi horti publici exemplum est Monspelienfis, quem a Rich. Bellavio instructum, suadente duce Ventadour, uni-

### 364 LIB. IV. CAP. III. HORT. CULTURA

verſitati donavit Henricus magnus (*Histoire de Lan-guedoc, tom. 5. p. 487. 503.*). Ibi gallicas, alpi-nas et pyrenaicas plantas, numero MCCC coli, te-ſtatur Olivarius de Serras (*théatr. d'agricult. 1600. Paris. fol.*).

\* \* \*

In Germania qui horti eius ſaeculi fuerint, me-moriae prodidit Conr. *Gesnerus* (*de hort. Ger-man. ad cult. Valer Cordi.*). Ipſe autem Euricius Cordus, Theod. Zwingerus Baſileae, Matth. Cur-tius Lindaviae, Bened. Aretius Bernae, Iſraël Min-kelius Argentinae, Petrus Condenbergius Antver-piae hortos aluerunt. Hieron. Tragi etiam, Leon. Fuchſii et Laur. Scholtzii Vratiſlaviensis horti eo aevo celebres fuerunt. Catalogum plantarum, pri-mum plantarum, quae in Germaniae hortis prove-niebant, edidit Conr. *Gesnerus*, dein horti ſui Laur. *Scholtzius* (1594.).

Leidae hortus publicus academicus, ſuadente Ger. Bontio, 1577. conditus eſt, Theod. Augerio Clutio primo praefecto, cuius filius mox itineribus per Europam Auſtralem et Africam ſuſceptis in-ſigniter novum hortum ditavit. Succedit Clutio 1589. Petr. Paavius, partes autem provinciae de-mandatae ſunt Car. Cluſio et Bern. Paludano (*Boer-haav. hiſt. hort. in limine indic. alter. hort. Lugd-bat. 1720. 4.*).

## CAP. IV.

PEREGRINATIONES ET ITINERA,  
QUAE REI HERBARIAE AMPLIFICANDAE  
INSERVIERUNT.

Quantopere profuerint itinera, vel alio fine suscepta, rei herbariae per ipsa barbara saecula, supra praecepimus. Iam vero, quum lux liberiorum cognitionum alacritate nova studia incitaret, in ipsum hunc finem instituta itinera messim ingentem plantarum novarum attulerunt.

Merus et simplicia orientalia triplici potissimum via Europam adferebantur. Prima borealis per Bactrianam caspiumque mare tendebat Casanum; unde Novogrodum et Wisbium (in insula Gottlandia) ibatur (*Lopez de Gomara hist. de las Indias*, p. 99. in *Barcia historiador. primit. de las Ind.* vol. 2. — *Sartorii hist. civit. hanseat.* p. 198 f.). Secunda via per pontum Euxinum ducta, Trapezunti in Tauride urbe emporia habebat (*Clavijo hist. del gran Tamarlan*, p. 113. *Lopez de Gomara l. c.*). Tertia demum via per sinum persicum et mare rubrum, Alexandriam aut Halepum agnoscebat, velut celeberrima commercii emporia: licet, et ipso fatente *Sanuto Torfella*, multo carioris pretii et vilioris indolis merces essent, quae hac via in Europam advehebantur. Varia etiam simplicia nunquam per Alexandriam, sed semper



### 366 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

per Tauridem et Trapezuntam venerunt, velut Rheum, Cinnamomum, nuces moschatae, caryophylli (*Clavijo p. 113. 190.*).

Interea a medio inde saeculo decimo quinto Lusitani, principe Henrico iubente, occidentalem oram Africae navigando perquisiverunt Maderam primum, dein 1456. Capitis viridis insulas, promontorium viride et rubrum appulerunt, cuius Ladovicus praeprimis *Mostus*, Venator, qui *Cadamofo* vulgo appellatur, narrationem reliquit (*Ramusio coll. 1.*). Impulit autem principem Henricum, ut huc potissimum navigia tendere iuberet, magnus mercimoniorum pretiosorum proventus in iis insulis. *Dracaena* maxime *Draco*, quam ad portum sanctum Maderae inventam describit *Mostus* (*Ramusio 1. f. 106.*) quaeque Sanguinem draconis, ab antiquo omnino diversum, largiebatur, magni aestimatum. Saccharum etiam in Madera et aliis insulis Canaribus colebant Lusitani. *Laurus indicæ* lignum rubrum, eximiam materiem, mensis elegantissimis idoneam et *Lichenem Roccellam*, *Ori-cello* dictam, e Canariis insulis apportarunt Lusitani. Ad fluvium Senegal invenit *Mostus* arbusculam, quae phaeolos ferat coccineos cum hilis atro exiguis — *Abrum præcatorium* (*Ramusio 1. f. 113. a.*). Ad promontorium viride arborem vastissimam, 17 ulnas diametro — *Adamsoniam digitatam* (*ib. f. 118. b.*).

Oram Africae occidentalis iugiter legentes Lusitani, 1460, Alphonso Sequeira duce, litus invenerunt, quod a *Zingibere Malaguetia* (alias *Amomum Granum Paradisi*) nomen habet. Is olim fructus a Mauris, Mandingis, per desertum ingens Zaharam, Tuncum portabatur (*Barros decada, da Asia portuguesa, f. 33. d.*).

Lusitani sequentibus annis lineam ultra aequinoctialem progressi, Alphonso Aveira duce, Beninum et Congum regionem invenerunt, ubi *Myrcus Vincenta* (*Rabo pola*) provenit, haud tanti aestimata ac pipér orientale (*Barros l. c. f. 40. d. 41. a.*). Fallitur ergo amicus olim *Sprengelius* (*hist. geogr. 376. 377.*) dum Malaguettam et Pimentam confundit.

Paullo post (1486.) detectum a Bartholomaeo Diaz caput bonae spei, *Vasco da Gamma* viam monstravit, qua peti India orientalis posset. Earum regionum commercium lucrosissimum ex eo inde tempore Lusitani sortiti sunt, donec (1520.) Ferdinandus Magellanus, Lusitanus et ipse, a rege suo neglectus aut offensus, Hispanis suaderet, aliam sibi munire, et occidentalem quidem viam, qua sub America ipsa iretur ad Indiam orientalem. Invidiam continuam bellaque ipsa crudelissima commoverunt Caryophylli aromatici, quos e Moluccis, Satalum, quod e Timor, Camfora, quam e Borneo, et Aloë, quam e Succotra reportarunt Lusitani

## 368 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

(*Barros* 1, 114. 147. *Lopez de Gomara* in *Barcia historiad.* 2, 92. 93.). Invidiam mercatorum Alexandrinorum primum tumultum Indorum contra Lusitanos sollicitasse, refert *Petrus Martyr* (*epist.* 10, 181.).

Quum Ceylonam Lopo de Soarez 1519. detexisset, Cinnamometorum in ea insula frequentium etiam potiti sunt Lusitani: *Cocos maldivica* (*Lodicea Commerf.*) innotuit ut alexipharmacum, dum Io. Gomez 1525. insulas Maledivas occuparet (*Barros* 3, 70.). Sumatra a Georgio Albuquerque Lusitanis subiecta largita est Camforam e Fanfora, Santalum album, Aquilariam, Terminaliam Benzoin, Metroxylon *König.*, Nipam fruticantem et Elaten sylvestrem (*Barros* 3; 114. 128.).

Caryophylli aromatici maxime ex insulis Ternate, Tidor, Bocham, Mutel et Palo Caballo, quae ab occidente insula Gilolo vicinae sunt, proveniebant. Praefuit huic mercatui legatus Lusitanorum, Antonius Calvaõ, in insula Ternate residens (*Barros* 3, 127.).

\* \* \*

Novus interea orbis detectus novum etiam et immensum Florae imperium revelavit. Indiam quaesiverunt aromatibus et auro ditissimam, qui primi Americam adierunt, Indiam etiam appellarunt novas terras, Indiaeque plantas ibi observare sibi visi sunt. Quid quod Europaeos flores in Chi-

lenſi regione deſcribat poëta Alphonſus *Ercilla* (*Araucana*, cant. 17. p. 176.).

„El blanco lirio y encarnada roſa,

„junquillos, azahares y moſquetas,

„asucenas, jazmines y violetas.“

Et ipſe *Cortuſius*, egregius alioquin botanicus, *πικνύκιστος* Dioſc. (*Leonurum Marrubiaſtrum*) cum Papas Peruano (*Solano tuberoſo*) commutavit (*I. Bauh. hiſt.* 3, 623.). *Arachidnam* Theophrasti idem credidit *Cluſius*.

Protinus ut ſumma ingenii vis et fortitudo Chriſtophori *Columbi* 1492. inſulas Indiae occidentalis appuliſſet, novae plantae novique fructus ſemet ipſi obtulerunt. *Dioſcorea fativa*, *Amyris baſamifera* (*Almaſtiga*, arbol, que en la hoja y eh fruto es ſemejante al lentisco), *Zea Mays*, *Nicotiana Tabacum*, *Bombax Ceiba* primae plantae fuerunt, ad quas Hiſpanorum animi attendebant (*Barcia hiſtoriæ*. 1, 24.).

Quum Columbus ſecunda navigatione detegeret Guadalupam, *Bromelia Ananas* primum innotuit. (Cierta fruta, que parecia piñas verdes, y Uenas de una carne, que parecia Melon, muy olorosa y ſuave. *Barcia* 1, 43.). Huic fructui palmam prae omnibus tribuebat rex Ferdinandus (*Petr. Martyr rer. ocean. dec. 2. lib. 39. b.*). Cinnamomum invenerunt Hiſpani in Hiſpania (*Barcia* 1, 61.) quod *Laurus montana* eſſe videtur: Myrobalanos

## 370 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

in Veragua, qui e *Terminalia latifolia* venisse videntur (*ib.* 106.): *Palmam novam*, e cuius fructibus *cerafa* aemulantibus vinum parabatur, *Bactris maior* (*ib.* 112.): *Mammeam americanam*, fructum suavissimum; *Iatropham* denique *Manihot*, e qua panis conficiebatur (*ib.* 118.), quo vestri malebant Hispani, quam triticeo, quod sapidi sit gustus ac facilius stomacho concoquatur (*Petr. Martyr epist.* 8, 156.). *Iuccam* vocabant incolae, cuius succum aconito letaliorem esse aiebant, qui epotus ilico perimat, panem autem ex eius farina confectum sapidum esse et salubrem omnes constebantur (*Petr. Martyr de reb. ocean. lib.* 1. p. 2. *Osiedo in Barc.* 1. p. 6. 7.).

Mexicanum regnum detectum 1519, Cordova, et occupatum 1520 Cortesio ducibus; Peruvianum imperium 1527 — 1530 a Francisco Pizarro subigatum; Chilensis natio Hispanis post diuturna bella submissa a Valdivia 1548.; Florida occupata a Ferdinando de Soto eodem fere tempore; Brasilia longe antea (1500) a Petro Alvarez Cabral Lusitanorum imperio submissa; novae terrae, quas Ferdinandus Magellanus in America australi et oceano pacifico (1519) detexit, novarum plantarum innumeram copiam Europaeis tradiderunt, quae tum usui medico ac oeconomico idoneae tum ad rei herbariae doctrinam amplificandam commodissimae videbantur.

Primus, qui novi orbis plantas uberius descripsit, Gonzalus Ferdinandus Oviedus de Valdes est, summus Hispaniolae et Dariae praefectus; memoriter autem conscripsit historiam 1525 post reditum. (*Barcia historiadores* 1. *Ramufio* 3. *Purchas Pilgrims* 2.). Quae maxime memorabiles ipsi videbantur, sequentes sunt:

Mammea americana (*Mamey* p. 37. *Barcia.*).  
 . . Annona muricata (*Guanabano* *ib.*). . . Psidium  
 pomiferum et pyriferum (*Guayaba* *ib.*). . . Cocos  
 nucifera (*Cocos* p. 38.). . . Cocos fusiformis (*ib.*).  
 . . Chamaedorea gracilis Willd. (*Ai unas palmitas, que tienen la hoja como la de los palmitos terreros del Andalucia, y estas llevan por fruta unas cuentitas pequeñas y redondas* p. 39.). . .  
 Elais occidentalis (*Ai otras palmas altas y de buenos palmitos etc.* *ib.*). . . Thrinax parviflora (*Palmas muy espinosas* *ib.*). . . Areca oleracea (*Palmitos muy excelentes para comer* *ib.*). . . Quer-  
 cus salicifolia (*Encinas buenas de comer* *ib.*). . .  
 Vitis indica (*Parras: sed uvas mas gruesas no tan agras* *ib.*). . . Carica cauliflora (*Higos del mastuerzo* p. 40.). . . Chrysobalanus Icaco (*Membrillos* *ib.*). . . Laurus Persea (*Perales* *ib.*). De  
 eadem Petr. Martyr ocean. f. 41. . . . Crescentia  
 Cujete (*Higuero, que echan calabazas redondas* *ib.*). . . Spondias Mombin (*Hobos* p. 41.). De  
 eadem Lopez de Gomara p. 60. Petr. Martyr

## 372 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

f. 39.) . . . *Guaia-cum officinale* (*Palo santo, Guaia-can ib.*). *Guaia-cum Xagua* ? p. 42. . . *Hippomane Mancinella* (*Mançanas de la Jerva p. 42.*). . . *Bambusa Guadua Humb.* (*Caña p. 44.*). . . *Convolvulus Batatas* (p. 45.). . . *Ceropia peltata*? (*Plasanos p. 46.*). . . *Cactus Tuna* (p. 27.). . . *Heliconia Bihai* (*ib.*).

In eadem *Barciae* collectione Alvarus Nuñezius *Cabeça de Vaca* Floridae plantas describit: *Cassiam Fistulam* (cuius uberrimum invenerunt Hispani proventum): *Limonium acidissimum*: *Hedwigiam balsamiferam* (non *Myroxylon peruiferum* ut vult *Bauhinus in pin.*), *Canellam albam*, *Ingam fagifoliam* Willd.

Mexicanas plantas *Lopezius de Gomara* paucas habet: *Agaven americanam* (*Maguey. Metl. Barcia tom. 2. p. 211*) *Tolmiferam Balsamum*: *Cactum coccionelliferum* (*Nuchtli p. 79.*); *Theobroma Cacao* (p. 82. 209.).

Peruvianas plantas primus descripsit *Carate* (*Barcia 3.*) qui (p. 10. 477.) nomine *Papas Solani* tuberosi meminit.

Paraguaenses poeta *Martinus del Barco* in *Argentina* (*Barcia 3.*) ubi p. 9. *Passiflora coerulea*, *Mimosa pudica* et *Dorstenia Contrayerva* memorantur.

Adiit etiam *Indiam occidentalem* (1542 — 1556) *Hieronymus Benzoni*, Italus, cuius „no-

„*va novi orbis historia*“ Genev. 1578. 8. plantarum quarundam memorabilium descriptionem continet. Inter eas eminet *Petum*, s. *Nicotiana Tabacum*, cuius usum is uberius observavit. Non multo post Benzoni reditum (1559) herba ea Lisbonae iam culta, velut remedium ulcera maligna sanans, oratori gallico Ioanni *Nicotio* innotuit, qui, tum foliis tum aqua destillata tentatis, eximium eius usum semet observasse Regi Galliae nuntiavit. Quo quidem iure nomen ipsius plantae tributum fuit (*L'Agriculture et maison rustique, par Ch. Estienne et J. Liebaut, p. 208. Rouen 1647. 4.*). Fuit autem ea species *N. Tabacum*, quod e descriptione *Nic. Monardis* (apud *Clus. exot. p. 307.*) elucet. Mox vero et *N. fruticosa* (*Petum femina* et *N. glutinosa* et *N. rustica* fuerant, ut quatuor iam species *Clusio* innotuerint. Optimus *Conr. Gesnerus*, qui experiri omnia consueverat, folia eius herba et manducare et fumum fugere ausus fuit, quo ebrietatis speciem et vertiginem sibi conscivit (*epist. medic. f. 79. b.*). Eadem in cane experimenta repetiit *Aegidius Everardus*, qui insignia commoda herbae praedicavit (*Comm. de herba Pannacea, quam alii Petum, alii Nicotianam vocant, Antverp. 1587. 12.*). *Monardis* tractatum interpretatus est *Iacob. Gohory* (*Instruction sur l'herbe Petum, Rouen 1588. 8.*).

Meminit etiam primus Benzonius arboris il-



#### 374 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

lius mirabilis, quae perennes aquas e foliis fundat, *Nepenthes* sine dubio *destillatoriae*, cuius vero patria (Zeilona) falso habetur insula Ferro. Recurrit tamen haec arboris historia in plerisque posterioris aevi scriptis, et ipso C. *Bauhini pinace* (p. 512. 513.).

E primis memorat Benzonius *Coram* fruticem, quem adfido Peruanos in ore gestare adfirmat, ut nec sitim sentiant nec virium infirmitatem. Est autem, ut Ios. *Jussieuus* observavit, *Erythroxyli* species, cuius proventus in provincia Peruviae, Yungas dicta, tam copiosus est, ut quotannis 7 — 800,000 numi, quos *Piastras* dicunt, inde redeant (*Lam. encycl.* 2, 393.).

Brasiliae historiam naturalem primus conscripsit monachus Carmelita, Andreas *Thevetius* (*Les singularitez de la France antarctique*, Antverp. 1558. 8.). Licet rudiores plantarum icones addat, ac diu se in Brasilia commoratum fuisse adseveret, fidei tamen parum meretur, quum non immerito de fama ipsius detraxerit Ioannes *Lerius*, Margella-Burgundus, candidus homo et ecclesiasticus, qui ad fidem Reformatorum propagandam, iubente summo Collegio, cum aliis Brasiliam (1556.) adgressus est (*Histoire d'un voyage fait en Bresil.* 1576. 8.). Disertis is verbis fatetur, terram ipsam a Brasiliano potius ligno, quam hoc ab illa nomen accepisse (p. 194.). Describit plantas sequentes:

*Zamiam furfuraceam* (202. *Ayri, palmam, ligno durissimo.*). . . *Copaiferam officinalem* (*ib. Copan.*). . . *Amyridem balsamiferam* (202. *Bois de senteur de roses.*). . . *Cerberam Ahovai* (*ib.*). . . *Anacardium occidentale* (205. *Acaion.*). . . *Mufam sapientum* (*Paco* 206.). . . *Nicotianam Tabacum* (*Petum* 212.). . . *Caladium esculentum Venten* (*Caïou, espèce de Choux* 214.). . . *Convolvulum platanifolium* (*Haïch* 214.). . . *Arachin hypogaeam* (*Marobi* 215.).

Et in cosmographico opere (*La Cosmographie universelle*, 1. 2. Paris 1575. fol.) *Thevetius* plantarum descriptiones dedit parum fidas iconesque aequae incertas. Sic (*vol. 1. f. 69. b.*) oleraceam plantam, *Achanaca*, habet, quae contra morbum Yaws dictum, expediat. Fabulosa pariter est historia *Rhabarbari* (*f. 126.*) et miserrima figura, e *Marino* mutuo accepta. *Smilacem* Chinam paullo melius tractat (*f. 415.*). Qualis sit arbor *zeilanensis Gehuph* (*f. 419. b.*) plane ignoro. *Convolvulum platanifolium* male delineat (*vol. 2. f. 921. a.*) ut et *Cerberam Ahovai* (*f. 922. a.*): pessime *Nicotianam* (*f. 927. a.*) et *Iatropham Manihot* (*f. 948. b.*).

Quae alii invenerunt, collegit Nicol. *Monardes* prof. Hispalensis in libro, quem *Clusius* in exoticis interpretatus est. Multa ipse viderat, plura etiam, velut *Carañam*, quae etiamnum definire ne-

## 376 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

quimus: medicus tamen medico consilio omnia describit. Praecipuae plantae, systematice determinandae sunt:

Hymenaea Courbaril (297. *Anise.*). . . Populus balsamifera (238. *Tacamahaca.*). . . Iatropa Curcas (299. *Oleum cicinum.*). . . Tolvifera Balsamum (304.). . . Guaiacum officinale (312.). . . Dorstenia Contrayerva (311.). . . Smilax China et Sarfaparila (315. 316.). . . Laurus Sassafras (320.). . . Canella alba (323.). . . Iatropa multifida (*Avellanae purgatrices* 334.). . . Convolvulus Mechoacantha (334.). . . Capsicum annuum et frutescens (*Piper* 340.). . . Passiflora incarnata (*Granadilla* 347.). . . Helianthus annuus (*Herba Solis ib.*). . . Tropaeolum maius et minus (*Flos sanguineum et Nasturcium peruanum* 348.).

Monardis librum cum aliis fere excerptit Ioan. Fragosus, quem supra iam citavimus. „Discursos de las cosas aromaticas etc. de las Indias, „Maadr. 15-2. 8.“

Neque Gaufridus *Linocierus* peculiaria multa habet, sed pleraque e Monarde, Lerio, Garcia et Acofta (*Histoire des plantes aromatiques, qui croissent dans l'Inde tant occidentale, qu'orientale*, Paris 1584. 16.).

\* \* \*

Orientis interea regiones, eximiarum plantarum feracissimae et veterum monumenta maxime

## ET ITINERA BOTANICA. BELONIUS. 377

illuſtrantes, eruditorum curioſitatem excitant: quorum ſtudio factum eſt, ut plantae, quas Dioſcorides et Arabes dixerant, indies magis innotefcerent et melius exponerentur.

Primus autem peregrinationem eiſmodi utiliſſimam ſuſcepit Petrus BELONIUS, Cenomanus (nat. 1517., occiſus a latrone Romano 1563.). Peragratis ab ineunte adoleſcentia Gallice, Helvetiae, Italiae, Germaniaeque partibus, Cardinali Turnonio commendatus et ab eo ſuſtentatus, adit Orientem (1546.) ac per tres annos Graeciam, Archipelagum, Aſiam minorem, Syriam et Aegyptum perquiſivit, in plantis potiſſimum ſtudioſus, neque tamen animalia aut ipſos hominum mores neglexit. Gallice conſcriptas obſervationes Cluſius latine interpretatus eſt et exoticis ſuis addidit.

Utilia multa et nova occurrunt, e. g.:

Platani orientalis vera deſcriptio et icon (p. 9.).  
.. Salvia pomifera. .. Ariſtolochia baetica ſ. altiffima. *Fontan.* (p. 9.). .. Brotera corymbola (*Chamaeleon niger in infula Lemno p. 34.*). .. Euphorbia Apios in monte Atho (p. 43.). .. Coptyledon Umbilicus (p. 56.). .. Acacia vera (p. 123.). .. Lawſonia inermis (p. 135.). .. Caucaelis orientalis (p. 200.). .. Ephedra altiffima (p. 206.). .. Prunus Laurocerafus (*Ceraſus trapezuntina.*).

## 578 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRIN. ET ITIN.

Secundus Orientem adiit Melchior GUILLANDINUS Borussus, post reditum prof. Patavinus († 1589.) acerrimus homo, Matthiolo praesertim adversarius. In Aegypto et Syria fuit 1559 et 1560, ex captivitate piratarum redemptus Fallopii liberalitate. Edidit celeberrimum et eruditissimum „de Papyro“ tractatum, Venet 1572. 4. odii praeterea plenum libellum „Theonis adv. Matthaeolum,“ Patav. 1558. 4. Tantopere saepius fallitur, ut Belladonnam cum Mandragora confundat (*Matthiol. ep. 3. p. 134.*).

Vestigia Belonii pressit, incredibili plantarum amore accensus, optimus vir Leonardus RAUWOLFUS, Vindelicus († 1596.), qui per tres annos (1573—1576.) Asiam minorem, Syriam et Persiae partem visitavit. Itinerarium ipsius (*Ai-gentliche Beschreibung der Rayfs etc.*, Lauingen 1583. 4.) descriptiones plerumque exactas plantarum plurimarum continet, quas numero DXIII. ficcatas ex Oriente reportaverat: servantur eae etiamnum in bibliotheca Leidensi, iisque investigatis Io. Fr. Gronovius „floram orientalem.“ LB. 1755. 8. elaboravit. Redierunt tamen plures iconibus elegantibus expressae in C. Gesneri *opp. ed. Schmiedel*. Itinerarii Rauwolfiani editio, quam supra citavi, quarto libro continet XLII. icones plantarum orientalium, in opere ipso descriptarum, plerumque novarum, e. g.:

*Plantago Lagopus* (*Catananche* n. 6.) saepe repetita ab Imperato, C. Gesnero, C. Bauhino.

*Convolvulus Imperati* (n. 54. b.). . . *Echium italicum* var.  $\beta$ . (n. 120.). . . *Solanum Melongena* (n. 75.). . . *Sol. sanctum* (n. 73. b.). . . *Anabasis aphylla* (*Kali Arabum* n. 38.). . . *Artemisia squamata* (*Gingidium Diosc.* n. 287.). . . *Pastinaca Secacul Ruffel.* (n. 74. b.). . . *Statice sinuata* (*Limonii species*, n. 314.).

*Leontice Chryfogonum* (n. 119.).

*Michauxia campanuloides* (*Medium* 248.) multo elegantius ea redit in *Gesneri opp. ed. Schmiedel tab. lign. 4 fig. 36.* . . *Lawsonia inermis* (n. 60.).

*Rheum Ribes* (n. 266.).

*Reaumuria vermiculata* (*Kali* n. 37.). . . *Zygophyllum Fabago* (*Morgani* n. 113.).

*Acanthus Dioscoridis* (n. 285.).

*Hibiscus Trionum* (n. 193.).

*Hedysarum Alhagi* (*Agul.* n. 94. 173.). . . *Astragalus christianus* (n. 116.). . . *Astrag. densifolius* (*Tragium alterum* n. 29.). . . *Astrag. columboideus* (*Tragacantha altera* n. 281.).

*Scorzonera tuberosa* (*Chondrilla altera* n. 117.). . . *Artemisia iudaica* (*Scheha* n. 456.). . . *Gnaphalium sanguineum* (*Baccharis* n. 285.). . . *Baccharis Dioscoridis* (*Conyza* n. 54.). . . *Erigeron tuberosus* (*Chondrilla altera*, n. 117. b.). . .

### 380 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRIN. ET ITIN.

Centaurea Behen (*Behen album* n. 288.). . . Gundelia Tournefortii (*Silybum* n. 74.).

Aristolochia maurorum (*Raufut et Rumigi* n. 121.).

Poterium spinosum (*Bellan* 287.). . . ? Salix aegyptiaca (*Zarnab.* n. 112.)? Elaeagnus spinosa. . . Sal. babylonica (*Gurb* n. 160.).

In opere ipso Coffeae potus (p. 98.) describitur, rarioresque aliae plantae, ut Calla orientalis (*Arum Carfuami* p. 115.), Tragopogon lanatus (p. 219.) etc.

\* \* \*

Mox etiam Indiam suam orientalem Lusitani medici curatius peruestigarunt, ut medicamenta et aromata veterum exponerent. Arabum monumenta, licet linguam noui fatis callerent, assiduo compararunt, neque facile plantarum botanicam dederunt descriptionem, utilem tamen omnino laborem.

Praeivit GARCIA AB ORO, proregis indicis medicus, qui Goae et Bombae diu commoratus erat, hortumque plantis medicis refertum posteriori loco aluerat. „Aromatum historia“ a Clusio versa huius exoticis inserta, haud pauca nova aut memorabilia continet:

Nyctanthen Arborem tristem (225.).

Strychnon Nucem vomicam (*Colubriini ligni tertium genus* 214.). . . Str. colubrinum (*alte-*

**BOT. GARCÍAS AB ORTO. ACOSTA. 381.**

*rum genus 214.*) . . . *Ophioxylon serpentinum*  
(*primum genus 214.*) . . . *Convolvulum Turpe-*  
*thum* (206.) *verum arabicum*, quod longe differt  
a *Turbith barbarorum*, *Seseleos specie.* . . *Carif-*  
*sam Carandas* (227.) . . *Iamboliferam peduncu-*  
*latam* (235.).

*Terminaliam Benzoin* (156.) . . *Term. Che-*  
*bulam* (194.) . . *Amyridem Kataf* (*thuris arbo-*  
*rem* 157.) . . *Aeglen Marmelos Correue* (*Cydo-*  
*nia indica* 233.).

*Mangiferam indicam* (228.) . . *Garciniam*  
*Mangostanam* (233.) . . *Eugeniam Iambos* (233.).  
*Averrhoam Carambolam* (234.) . . *Annonam*  
*muricatam* (*Iaca* 227.).

*Viticem Negundinem* (226.).

*Phaeolum Mungo* (236.) . . *Indigoferam*  
*Anil* (239.).

*Durionem zibethinum* (231.) . . *Arecam Ca-*  
*techu* (187.) . . *Excoecariam Agallocham* (172.).  
. . . *Smilacem Chinam* (208.) . . *Mimosam Ca-*  
*techu* (163.).

Imitatus est *Garciam* et saepius plane exscripsit  
*Christophorus ACOSTA*, chirurgus Lusitanus, in  
*Africa natus*, *literarum rudis*, cuius „*Aromatum*  
*hystoria*“ ab eodem *Clusio* exoticis adiecta, eadem  
fere continet, quae *Garcias* docuerat. *Ligni ta-*  
*men colubri*ni descriptio differt. *Habet etiam pau-*  
*ca peculiaria:*



Pavettam indicam (*Pavate* 266.). . . Cerberam Manghas (*Mangas bravas* 284.). . . Hyperantheram Moringam (248.). . . Mimofam pudicam (290.).

Ioannes Hugenius LINSCHOTEN, Enchufatus Batavus, adiit Indiam orientalem et Chinam ab anno inde 1579. „Itinerarium“ ipsius (Amsteld. 1644. fol.) a D. Paludano commentariis dotatum, complectitur fructus et aromata Garciae et Acoftae, praeterea Rhizophorae Mangles (*Arbor de-rays* p. 82.), Daturae Tatulae (*Dutroa* p. 86.), Aquilariae ovatae (*Palo d'aguilla* p. 96.) descriptionem. Paludanus addidit primam mentionem Polianthis Tuberosae, quam 1594. Simon de Tovar Hispanus cum ipso communicaverat.

\* \* \*

Summa folertia et indefeffo ftudio Profper ALPINUS plantas Orientales examinavit, pluresque veterum, ante ignotas, clare exposuit. Marofficae natus 1553., cum Confule Veneto Eno 1580 Aegyptum adiit, Caïri triennium commoratus eft. Graeciae infulas etiam, maxime Candiam perquifivit, poft reditum Principis Doriae medicus, dein profeffor Patavinus fuit, denatus 1617.

Celeberrimum opusculum eft „de plantis Aegypti“, cuius editionem Patav. 1640. 4. coram habeo. Plantae nondum quinquaginta defcribun-

tur dialogice, delineatae more saeculi illius: inter eas novae fere sunt:

Cynosurus aegyptius (*Meiem el msalib* p. 122.) . . Cyperus Papyrus (p. 111.) . . Plantago squarrosa (*Kalli* 3. p. 127.) . . Vahlus habet Schoenum mucronatum, sed valde differt.

Zizyphus Spina Christi (*Nabea* p. 19.) . . Periploca Secamone (p. 124.) . . Cynanchum viminale (*Felfel tavil* p. 96.) . . Rhamnus divaricatus Forsk. (*Aghahlid* p. 39.) . . Asclepias procera (*Beidelfar* p. 86.) . . Cassia Abfus (p. 97.) . . Cass. Sophora (p. 84.) . . Lycium europaeum (*Uzeg* p. 43.) . .

Amyris Opobalsamum (p. 60.) . . Corchorus olitorius (*Melochia* p. 93.) . . Origanum aegyptiacum (*Zatarhendi* p. 95.) . . Sesamum orientale (p. 100.) . . Pistia Stratiotes (p. 108.) . . Adansonia digitata (*Baobab* p. 67.) . .

Gossypium arboreum (p. 71.) . . Hibiscus ficulneus (*Bamia* p. 91.) . . Abrus precatorius (p. 77.) . . Coronilla Sesban (p. 82.) . . Trigonella hamosa (*Alchimelech* p. 124.) . . Acacia Senegal (p. 15.) . .

In libro, qui huic adnectitur, „de balsamo“, Amyridis Opobalsami et gileadenfis historiam naturalem uberrime exponit, veraene autem sint species an varietates duntaxat, ambiguum mittit. Co-  
luit tamen in horto fruticem.

#### 384 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

Praestantissimum et novarum plantarum locupletissimum opus est posthumum „de plantis exoticis“, quod Venetiis 1627. 4. prodixit. Amplectitur eas, quas a Capello, proconsule Veneto Cretae, a Palmerio Anconitano, Caëri residente et ab aliis amicis acceperat et in horto ditissimo Patavino coluerat. Inter eas praecipuae sunt:

*Syringa persica laciniata* (*Ligustrum nigrum* 178.). . . *Cenchrus frutescens* (*Arundo graminea aculeata* p. 104.). . . *Scabiosa limonifolia* (*Sc. arborea* p. 34.).

*Galium graecum* (p. 166.). . . *Lithospermum fruticosum* (*Anchusa arborea* p. 68.). . . *Onosma simplicissima* (*Echium creticum* 129.). . . *Convulvulus paniculatus* (*arabicus* 185.). . . *Campanula Alpini* (*pyramidalis minor* 340.). . . *Ferula Asa foetida* (*Laserpitium* 210.). . . *Statice Echinus* (56.). . . *Linum arboreum* (18.). . . *Oenothera biennis* (*Hyoscyamus virginianus* 324.).

*Daphne oleoides* (*Chamaedaphnoides cretica* 43.). . . *Aur creticum* (1).

*Saponaria cretica* (*Saxifraga altera* 291.). . . *Dianthus iuniperinus* (*Caryophyllus sylv. arboreus* 58.). . . *Euphorbia aleppica* (*Tithymalus Cyparissius* 64.).

*Pyrus cretica* (*Cerasus idaea* 2.). . . *Nymphaea Lotus* (p. 213. — 229.). *Uberrima eius*

## ET ITINERA BOTANICA. ALPINUS. 385

plantae historia. . . Cistus creticus (*Ladanum creticum* p. 88.). . . Ranunculus muricatus (p. 262.).

Teucrium creticum (*Rosmarinum stoechadis facie* p. 102.). . . Satureia graeca (*Clinopodium creticum* p. 264.). . . Nepeta Scordotis (p. 283.). . . Origanum Maru (p. 288.). . . Scrofularia fambucifolia (*Sideritis* p. 202.). . . Celsia Arcturus (*Verbasculum sylvestre creticum* p. 122.). . . Bunias spinosa (*Brassica* p. 200.).

Alyssum creticum (*Leucoium luteum, utriculato femine*, p. 118.). . . Cardamine Impatiens (*Sium minimum* 331.). . . Cleome pentaphylla (*Quinquefolium filiquosum* 322.). . . Hibiscus Abelmofchus (p. 196.).

Genista lusitanica vel Spartium horridum (*Echinopoda* p. 14.). . . Anthyllis cretica (*Ebenus* p. 278.). . . Anth. Hermanniae (*Spartium spinosum* p. 26.). . . Coronilla argentea (*Colutea scorpioides argentea* p. 16.). . . Coron. globosa (*Hedysarum argenteum* p. 314.). . . Astragalus echinoides (*Tragacantha altera* p. 54.). . . Trifolium clypeatum (p. 306.). . . Trif. uniflorum (*Spica trifolia* p. 168.). . . Lotus edulis (*Trifolium corniculatum* p. 268.).

Catananche lutea (*Stoebe plantaginis folio* p. 286.). . . Acarna gummifera (*Carduus pinea* p. 124.). . . Ac. cancellata (*Carduus minimus* p. 254.). . . Stachelina arborefcens (*Cyanus arbo-*

### 386 LIB. IV. CAP. IV. PEREGRINATIONES

*rescens altera* p. 32.). . . *Balsamita ageratifolia*  
(*Bellis spinosa* p. 326.). . . *Chrysanthemum trifur-*  
*catum Fontan.* (*Buphthalmum peregrinum* 320.).  
. . . *Achillea cretica* (*Stratiotes millefolia cretica*  
p. 83.). . . *Centaurea spinosa* (*Cyanus spinosus*  
163.). . . *Cent. babylonica* (*Iacea maxima* 281.).  
. . . *Cent. eryngioides* (*Carduus* 158.).

*Datiscia cannabina* (*Canapis lutea* 295—301.).  
. . . *Ephedra fragilis* (*Equisetum montanum creti-*  
*cum* 140.). . . *Pteris longifolia* (*Phyllitis* 66.).

Plura etiam infunt huic operi nondum satis de-  
terminata.

Cum Prospero Alpino iungendus est Honorius  
BELLUS Vicentinus, medicus Cydonia Cretensis,  
qui Belonium et Alpinum imitans, plantas Grae-  
ciae studiose examinavit. Epistolae ipsius ad Clu-  
sium datae (*Clus. hist.* 2, p. 299—314.) versan-  
tur maxime in ventilandis Belonii et Alpini expo-  
sitionibus: scriptae autem sunt ab anno inde 1594.  
Explicat Echinopoda, Baobab, Asclepiada proce-  
ram, Sopheram, Cytifum veterum, Stachyn spi-  
nosam (*Gaiderothymo*), Scaudicem australem  
(*Zilimonida*), Scutellariam peregrinam (*Scordo-*  
*sin Plinii* 2.), Abrum etc.

Ex eiusdem Belli literis Pona expositiones non  
paucas montis Baldi historiae inseruit: e. g. de Stä-  
helina Chamaepeuce (*Stoebe capitata*), de Cicho-  
rio spinoso, de Loto eduli (*isgaçoun*), de Phyteu-

## ET ITINERA BOTANICA. BELLUS. 387

mate pinnato (*Petromarulo*), de Verbasco spinoso (*Galastivida*), de Satureia spinosa, Teucrio brevifolio (*Polium erectum creticum*) etc.

---

### CAP. V.

## INSTAURATIO, COLLECTIO ET DISPOSITIO INVENTORUM.

Expositio veterum critica, hortorum cultura et itinera botanica thesaurum rei herbariae fatis amplum aperuerunt. Inventa vero colligenda, comparanda cum cognitis et ventilanda erant: necessitas etiam urgebat tot varias res in ordinem quendam disponere, ac, ni systema conderetur, speciem quamdam dispositionis melioris introducere.

Id consilium primus, ni fallor, Conradus GERNERUS cepit, vir omni literarum genere cumulatissimus, atque tum animi dotibus praeclaris tum incredibili plantarum amore insignis. Humili loco Tiguri 1516. natus, patre pellione in bello civili occiso, victum tenuissimum quaerere in puerorum institutione debuit. Immaturo etiam matrimonio magis depressus, adiit tamen Galliam meridionalem, Argentoratum, Laufannam et Basileam, ubi demum summos in arte medica honores adeptus, patriae postea inservit, alpes Helvetiae, maxime montem Septimum et Pilati, et Vallem Tellinam,

### 388 · LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

Io. Bauhino comite, percucurrit, hortum proprium coluit, veterum monumenta diligentissime emendavit, plantarum vires experimentis in se ipso, temere saepius, institutis investigavit, pictorem aluit, qui plusquam MD icones nitidissimas et exactissimas, ad opus insigne, historiam plantarum, pararet, artem medicam ipse exercuit, eamque laboriosam vitam ad annum 1565. usque produxit, ubi peste ereptus est \*).

E tantis tanti viri meritis, quae Hallerus civis ipsius et Schmidelius uberrime exposuerunt, memoranda praecipue est ipsius perspicacia, quae facile vidit, e seminibus, fructibus et floribus plantarum potius quam e foliis naturas stirpium et cognationes apparere. Unde monuit amicum Theod. Zwingerum (*epist. ed. Wolf. f. 113. a.*) femina et fructus plantarum delineari debere. His enim notis facile deprehendi, Staphidem agriam et Confolidam regiam Aconito *συμφύλους εἶναι βοτάνας*. Ita etiam ad Ad. Occonem (*f. 65. b.*) scribit, cognationem plantarum e seminibus praeprimis derivandam esse. Eo etiam nomine icones Gesnerianae prioribus omnino multo praestantiores sunt, quod partes essentielles exprimunt.

Novas complures species detexit, tum alpinas,

\*) Uberrime de vita Gesneri commentatus est C. C. Schmidelius in *praef. ad opp. Gesneri*.

quas ipse vel invenerat vel amici, Aretius Bernensis, Vullatus, Zwingerus et alii miserant, tum exoticas, in horto suo cultas aut ab amicis exteris cum ipso communicatas. Plerasque diligentissime pictas cum descriptione reliquit Casp. Wolfio, qui *ὑπόσχεσιν* cum specimine iconum, Simleri vitae Gesneri adiectam (Tigur. 1566. 4.) edidit. At promissis Wolfius morbis vexatus non stetit, vendidit thesauros Gesnerianos Ioach. Camerario (pretio 150 flor.), qui iis ad epitomen Matthioli edendam usus est, ut, quaenam verae sint Gesnerianae icones, haud facile determinari possit. Cesserunt aliae icones Trewio, a quo acceptas C. C. *Schmiedelius* titulo „Operum botanicorum“ tom. 1. 2. Norib. 1754. 1771. fol. numero 72 vel aeri vel ligno incisis partim etiam coloratis edidit.

Coram est „Historia plantarum C. Gesneri, Paris. 1541. 16.“ iuvenile opus, e veteribus conscriptum, nil peculiare aut novum continens. Multo utilior est „Montis Fracti s. Pilati historia,“ quam *Scheuchzerus* in *hist. nat. Helvet.*, Tigur. 1716. recudi curavit. Ad Tragi etiam historiam et ad Valer. Cordi opuscula adnotationes et addita-  
menta iunxit, praecipue celeberrimum tractatum „de hortis Germaniae,“ ubi plures novas plantas recenset. Infunt eae etiam epistolis, tum iis, quas Wolfius Tiguri 1577. 4., tum quas Bauhinus Basili



### 396 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

1591. 8. edidit, tum etiam libro quarto epistolarum, Wittebergae 1584. 4. impresso.

Ut pauca tantummodo e tot divitiis clarissimi viri adducam, Cannam indicam (*epist. Wolf. f. 52. b.*) fere primus habet. Passim occurrunt praeterea:

Salvia ceratophylla (*tab. lign. 12. f. 104.*), calycina Sibth. fl. graec. 16. (*tab. lign. 12. f. 105.*).

Lappago racemosa (*tab. lign. 3. f. 20.*).

Scabiosa prolifera (*tab. lign. 4. fig. 56.*) . . Potamogeton ferratus (*Lapathi genus sylvestre minus, hort. Germ. f. 263. b.*).

Nicotiana Tabacum, cuius folia ipse expertus erat (*epist. Wolf. f. 79. b.*) . . Androsace villosa (*opp. tab. aer. 9. f. 76.*) . . Primula Auricula (*hort. f. 274. a.*) . . Pr. marginata (*opp. tab. aer. 9. f. 77.*) . . Lyfimachia nemorum (*Nummularia sylvatica hort. f. 268. b.*) . . Convolvulus Nil (*hort. f. 255. a.*) . . Lobelia Dortmanna (*tab. lign. 13. f. 117.*) . Rediit primum in *Clus. cur. post. 75.* Gladioli lacustris nomine. . . Lonicera alpigena (*Chamaecerasus ad Val. Cord. f. 213. b.*) . . Solanum Pseudocapsicum (*hort. f. 282. a.*) . . Rhamnus infectorius (*opp. t. 19. n. 167.*) . . Swertia perennis (*opp. prima picta.*) . . Gentiana bavarica (*opp. t. 22. f. 84.*) . . Gent. asclepiadea (*t. 11. f. 99.*) . . Gent. punctata (*t. 28, f. 92.*) . . Gent. purpurea (*ib.*) . . Eryngium

alpinum (*mont. fract.*). . . Ligusticum peloponnesense (*ib.*).

Tulipa Gesneriana (*ad Cord. f. 213.*) 1559  
primum adlata Augustae Vindelicorum floruit.

Epilobium angustissimum (*ad Cord. f. 215. b.*).

Rhododendron ferrugineum (*tab. lign. 21. f. 181.*). . . Saxifraga autumnalis (*Sedl minoris genus, floribus luteis maculosis, mont. fract.*). . .  
Euphorbia dulcis (*Esula hort. f. 280. b.*). . . Dianthus barbatus (*Lychnis monachorum hort. f. 266. a.*).

Mespilus Chamaemespilus (*ad Cord. f. 215.*).  
. . . Comarum fragarioides (*Fragaria sterilis hort. f. 250. b.*). . . Dryas octopetala (*opp. tab. aer. 3. f. 22.*).

Actaea spicata (*Christophoriana hort. f. 253. a.*).  
. . . Cistus linearis Cav. (*tab. 3. aer. f. 25.*). . .  
Cist. halimifolius (*ib. f. 26.*). . . Cist. guttatus (*ib. f. 27.*).

Mentha cervina (*Pulegium angustifolium, ib. f. 274. a.*). . . Stachys palustris (*Betonica foetida, mont. fract.*). . . Pedicularis flammea (*Herba aspleno persimilis ib.*). . . Digitalis lutea (*ib.*).

Bunias Erucago (*tab. lign. 13. t. 113.*). . . Lepidium perfoliatum (*tab. lign. 13. f. 110.*).

Polygala Chamaebuxus (*ib.*). . . Astragalus Erianthus f. Eriocephalus Willd. (*Poterium Rauwolf. tab. lign. 13. f. 119. aer. inc. 1. f. 1.*). . .

392 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*Ulex nanus* (*tab. aer. 1. f. 2.*) . . . *Lathyrus*  
*Aphaca* (*ib. f. 5.*) . . *Lath. fetifolius* (*tab. 2. f. 11.*  
 . . *Lath. angulatus* (*tab. 2. f. 12.*) .

*Artemisia vallesiaca* (*Absinthium seriphium femina ib.*) . . *Achillea moschata* (*Iva moschata ib.*) . .

*Coix Lacrima* (*opp. tab. lign. 2, 15.*) . . *Pteris cretica* (*ib. f. 12.*) . *Doronicum scorpioides* f. *Arnica scorpioides*, quam haud esse *Aconitum* veterum contra *Matthiolum* probare studuit, experimentis in se ipso institutis fretus (*epist. Wolf. f. 74. 78.*) . *Ranunculum* autem *Thoram* id potius esse perhibet (*f. 9.*) .

Non reticenda est in historia rei herbariae summi viri modestia, candor, humanitas, probitas. Eae animi virtutes vel e qualibet epistolarum pagina elucent. Ut *Moibani* amici liberis auxilium ferret, suscepit editionem euporistorum *Dioscoridis*, e codice, quem *Moibanus* possederat: a *Rihelio* typographo accepit thalerum unicum pro quaternis philiris, quam pecuniam infantibus patre orbis partim donavit (*epist. f. 25.*) . Cum *Fuchsius*, nimis suae gloriae cupidus, anxie rogaret, ne plantarum historiam ederet, candidus vir ita respondit, ut virum eximium decet (*ib. f. 137.*) *Guilandinum*, *Matthiolo* infestissimum, monuit, ut merittissimo viro parceret, neque *ματαίον* nominaret, ut adfectus iuveniles exuisse videretur (*ib. f. 140.*) .

Gratissimus erga amicos primus consilium cepit, nomina plantarum ab iis petere viris, qui experimenta de earum viribus instituerint. Vولاتam, Aretiam, Occoniam, Calceolariam, Cortusam optima censet nomina, si modo plantae veteribus plane incognitae fuerint: alioquin enim veterum appellationes delendas non esse (*epist. f. 73. a. 120. b.*).

Sequatur Gesnerum amicus eius, Gulielmus TURNERUS, Morpetha-Northumbrensis, Cantabrigiae, exemplo Tragi et ipsius Gesneri, medicinae simul et theologiae operam dedit, cumque reformatorum partes nimio defendisset ardore, exilio multatus est. Id sapienter toleravit rei herbariae studiosus vir: moratus est Coloniae Agrippinae, Argentorati et Basileae, ubi in familiaritatem Gesneri venit, Patavium denique se contulit, ubi medicae artis doctor renunciatus est. Redux Ducis Somersfeti archiater, decanus Wellensis et canonicus Windfori creatus est. Hortos plures aluit, Kewi et Wellae, seminumque ipsi adfiduum fuit commercium cum Gesnero, Matthiolo, Ghinio et Guilandino († 1568.).

Edidit magnum opus alphabetico ordine: „A new herball P. 1. Lond. 1551. fol.“, cuius nova editio, tribus tomis comprehensa Coloniae 1568 fol. prodiiit. Duo priores tomi complectuntur plantas veteribus cognitae, quas caute et docte ex-

## 394 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

ponit, ventilatis Fuchsi, Matthioli et Tragi commentariis: icones autem e Fuchso sumptae, additis circiter nonaginta. Tertius vero tomus novas habet et veteribus incognitas plantas, tum exoticarum tum britannicas tum etiam rhenanas. Inter eas

Asperula arvensis (*Alisson*). . . Sedum reflexum (*S. minus*). . . Crambe maritima (*Brassica sylvestris*). . . Astragalus glycyphyllos (*Glaux*). . . Medicago fativa.

Rembertus DODONAEUS, Iankema-Friso, archiater Caesareus, dein prof. Leidenfis; nat. 1517, † 1586, innumeras contulit symbolas ad augendam rem herbariam. Typographi Antverpiensis amici suasu suscepit primum opus belgicum, „Cruydeboek, Antverp. 1553. fol.“ quod a C. Clusio gallice 1557. Antverp. et ab Henr. Lyte anglice Lond. 1578. versum fuit. Praxi licet medica obrutus auctor, amicorum tamen divitias tanto studio in suum convertit usum, ut 1559. „de stirpium historia „commentarios“ voluminibus duobus edere potuerit. Icones praeter Fuchsianas adiecit 133 proprias nitidas. Auctum denique et emendatum opus, titulo „stirpium historiae pemptades VI. Antverpiae 1583. fol.“ prodiit, cuius posthumam editionem 1616. parumper auctam possideo. Adiectae huic etiam Lobelianae et Clusianae plantae sunt, ut nonnisi e prioribus editionibus eluceat, quid ad amplificandam rem herbariam ipse contu-

## INVENTORUM. DODONAEUS. 395

lerit Dodonaens. Ordinem fere feryat naturalem: plantas veterum docte et eximie exponit, adductis iconibus codicis Dioscoridei Viadobonenfis. Sunt autem, quas primus observavit ac delineavit, plantae praecipuae hae:

Isaminum fruticans (*Trifolium fruticans* 570.).  
 . . Veronica longifolia et maritima (*Pseudolyfimachium coeruleum* 86.).

Iris graminea (*Chamaeiris* 247.). . . Aegilops triaristata Willd. 539.).

Heliotropium supinum (70.). . . Campanula Speculum (*arvensis minima* 168.). . . Celosia coccinea (*Amarantus purpureus* 185.). . . Atriplex portulacoides (*Portulaca marina* 771.). . . Cynanchum acutum (*Periploca prior* 408.). . . Hydrocotyle vulgaris (*Cotyledon palustris* 133.). . . Bupleurum rigidum (*B. alterum latifolium* 633.).  
 . . Bupleur. iunceum et falcatum (*angustifolium* ib.). . . Selinum Oreoselinum (*Veelgutta* 696.).  
 . . Ferula Ferulago (321.). . . ? Laserpitium Chironium (*Panaces peregrinum* 309.). . . Cicutula virofa (*Sium alterum* 589.). . . Sifon Ammi (*Ammi alterum parvum* 301.).

Allium Ampeloprasum (690.). . . Fritillaria Imperialis (202.) 1576. Viennae innotuit. . . Fritill. persica (*Lilium persicum* 220.). . . Fritill. Meleagris (233.). . . Tulipa sylvestris (*minor narbonensis* 232.). . . Ornithogalum narbonense (222.).

#### 400 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

excipiunt *Siliquosae*, sine nomine generali, quibus tamen et Resedam et Senecionem adnumerat: tum *Cichoraceae*, Serides dictae; *Brassicae* (quibus melior locus inter Siliquosas fuisset): *Atriplices*: *Glaucia*, cum *Anemone*: *Lapatha*, cum eohorte disparium plantarum: *Leucoia*, *Tithymali*, *Perfoliata* et iterum *Bupleura*: *Labiatae* pleraeque, ordine satis iusto: *Asperifoliae* item: *Nymphaeae*: *Cucurbitaceae*: *Rubiaceae*: *Filices*: *Leguminosae*: *Rosaceae* et aliae *Arbores*, sine certo quodam ordine.

Haec prima familiarum naturalium rudimenta plures scriptores Lobelio posteriores imitati sunt. Ipse autem singularum plantarum adiunxit icones aeri nitidissime incisas, exiguas quidem sed novas plerasque, dum, quas Dodonaeus, quas Fuchsius alique iam habeant, fide summa indicaverit. Descriptiones haud optimaе, dictio etiam aspera ac impedita. Nova fere haec sunt:

Schoenus mucronatus (*Iuncus maritimus* 44.).  
 . . Poa dura (2, 461.), alpina (2, 463.). . . Aira  
 canescens (2, 466.). . . Melica uniflora (2, 466.),  
 quam Villarsius ideo M. Lobelii vocat.

Scabiosa alpina (233.). . . Plantago maior, var.  
 rosea (128.). . . Plant. albicans (*Holosteum mons-*  
*pelienfe* 18.). . . Alchemilla Aphanes (*Percepier*  
*Angl.* 324.).

*Anchusa sempervirens* (*Buglossum* 247.). . .

Illecebrum capitatum (*Polygonum montanum niveum* 180.). . . Apocynum venetum (*Esula rara e Lio Venet.* 160.). . . Heracleum ?tauricum (*Laferpit. massil.* 313.). . . Statice oleaefolia (*Limonium maritimum* 123.). . . Radiola Millegrana Smith. (*Herba Turca* 180.).

Aphyllanthes monspeliensis (190.). . . Frankenia laevis (*Polygonum alterum pusillum* 180.).

Daphne Tartoniraira (160.).

Gypophila Saxifraga (*Saxifraga antiquorum* 183.).

Cactus mammillaris (*Echinomelocactus* 373.).

. . . Pyrus Aria (435.).

Aiuga Iva (*Iva moschata* 164.). . . Sideritis scordioides (225.). . . Marrubium creticum (222.).

. . . Phlomis italica (*Verbascum sylvestre* 241.). . . Moluccella spinosa (*Molucca asperior* 221.).

Clypeola Ionthlaspi (*Thlaspi alterum minus clypeatum* 74.). . . Biscutella coronopifolia (*Thlaspi parvum hieracifolium ib.*). . . Iberis pinnata (*Thlaspi minus umbellatum* 75.). . . Alyssum maritimum (*Thlaspi narbonense* 75.). . . Sifymbrium Iris 69.). . . Cheiranthus sinuatus (*Leucoium maritimum maius* 141.).

Lavatera olbia (*Althaea* 294.).

Trifolium angustifolium (*Lagopus* 384.). . .

Lotus filiquosus (385.). . . Lot. hirsutus (*Oxytriphyllum alterum Scribonii* 381.). . . Dory-



#### 402 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

cnium monspeliense (389.). . . *Medicago marina* (383.). . . *Medic. turbinata* (*Medicae spec. II, ib.*).

*Hieracium bulbosum* (*Chondrilla pufilla marina bulb.* 83.). . . *Carduus acanthoides* (371.). . . *Cnicus tuberosus* (*Carduus bulbosus monspel. ib.*).  
*Cnic. eriophorus* (370.). . . *Carthamus Carduncellus* (374.). . . *Stäbelina dubia* (*Stoechas citrina altera* 203.). . . *Gnaphalium sylvaticum* (*tercium anglicum* 202.). . . *Erigeron graveolens* (*Corniza minor vera* 146.). . . *Aster acris* (*minor narbonensium* 147.). . . *Cineraria maritima* (*Iacobaea marina* 80.). . . *Inula montana* (*Aster montanus hirsutus* 148.). . . *Anacyclus aureus* (*Herbariorum Anthemis chrysanthemos* 343.). . . *Anthemis maritima* (*Cotula* f. *Parthenium marinum minimum* 345.). . . *Centaurea conifera* (*Chamaeleon non aculeatus* 367.). . . *Cent. pullata* (*Iacea humilis serpens* 235.). . . *Echinops Ritro* (369.). . . *Echin. strigosus* (*Spina alba ib.*).

*Typha minor* (41.). . . *Osyris alba* (*Cafia poetica Monspeliensium* 185.).

*Pistacia reticulata* (*Terebinthus maior pistachiae folio* 411.). . . *Coriaria myrtifolia* (*Rhus Plinii myrtifolia* 412.). . . *Fucus natans* (256.).

Sequuta est „Plantarum f. stirpium historia, Antverp. 1576. fol.“ quae paucas novas plantarum descriptiones, sed earum, quae in adversariis ex-

ponuntur, icones et illustrationes continet, minoris pretii opus, icones etiam rudiores. Hae quidem, tum ex hoc libro tum ex adversariis repetuntur in „Iconibus stirpium, Antverp. 1591. 4. oblong.“, additis figuris Dodonaei, Clusii aliorumque, ut plusquam 2000 icones numerentur. \*) Nulla descriptio, nomina sola, qualia aetas amabat, indices autem copiosissimi septem linguarum. Quodsi discefferis ab iis, quae mutuo acceptae ab aliis sunt, supersunt Lobelio peculiares aut novae fere sequentes:

Lemna trifolca (*Hederula aquatica* 2, 36.). . .  
 Utricularia vulgaris (*Millefolium aquaticum* 1, 791.). . .  
 Salvia glutinosa (*Colus Iovis* 1, 557.). . .  
 Nardus stricta (*Spartum nostras parvum* 1, 90.). . .  
 Alopecurus geniculatus (*Gramen aquaticum spicatum* 1, 13.). . .  
 Holcus bulbosus (*Gramen bulbosum nodosum* 1, 23.). . .  
 Poa aquatica (*Gramen maius aquaticum* 1, 4.). . .  
 P. fluitans (*Gr. aquis innatans* 1, 12.). . .  
 Avena nuda (1, 32.).

Asperula taurinensis (*Rubia laevis taurinensium* 1, 800.). . .  
 Plantago subulata (*Serpentina omnium minima* 1, 439.). . .  
 Camphorosina acuta (*Anthyllis marina Narbonensium* 1, 468.).

\*) Halleri numerus 2191 nimius est, quum paginarum duplicatus sit: haud tamen quaevis pagina duas continet icones.

Cynoglossum omphalodes (*Symphytum pumilum repens* 1, 577.). . . Symphytum tuberosum (1, 584.). . . Cyclamen hederaefolium (1, 605.). . . Verbascum virgatum With. (1, 564.). . . Samolus Valerandi (*Anagallis aquatica tertia* 1, 467.). . . Herniaria fruticosa (*Polygonum herniariae foliis* 2, 85.). . . Tordylium syriacum (*Gingidium foliis bauciae* 1, 725.). . . Bunium aromaticum (*Ammi creticum* 1, 724.). . . Ligusticum austriacum (*alterum Belgarum* 1, 786.). . . Chaerophyllum aureum (*Myrrhis altera* 1, 735.). . . ? Sefeli montanum (*Meum alterum spurium* 1, 778.). . . Linum strictum (*Passerina linariae folio* 1, 411.). . . Lin. campanulatum (*Campanula lutea linifolia* 1, 414.).

Tillandsia utriculata (*Peruviana alia, aloës facie* 2, 204.). . . Allium carinatum (*Ampeloprasum proliferum* 1, 156.). . . Tulipa suaveolens (*T. pumilio* 1, 127.). . . Scilla Liliohyacinthus (*Hyacinthus stellataris liliifolius* 1, 101.). . . Kerneria oceanica Willd. (*Alga marina* 2, 248.). . . Iuncus conglomeratus (*laevis glomerato flore* 1, 84.). . . Iunc. glaucus (*acutus vulgatus* 1, 85.). . . Iunc. pilosus (*Gramen hirsutum nemorosum* 1, 16.). . . Iunc. adscendens (*Gr. aquaticum alterum* 1, 12.). . . Iunc. campestris (*Gr. exile hirsutum cyperoides* 1, 15.). . . Triglochin maritimum (*Gr. spicatum alterum* 1, 1.). . . Alisma

**Damasonium** (*Plantago aquatica minor altera* 1, 301.). . . **Al. ranunculoides** (*Plant. aqu. humilis* 1, 300.).

**Polygonum maritimum** (1, 419.). **P. lapathifolium** (*Hydropiper* 1, 315.). . . **Coccoloba uvifera** (*Populus novi orbis* 2, 195.).

**Rhododendron hirsutum** (*Balsamum alpinum* 1, 367...). **Saxifraga Burseriana** (*Sedum minimum tertium* 1, 376.). . . **Dianthus prolifer** (*Armeria prolifera* 1, 449.). . . **Dianth. deltoides** (*Caryophyllus minimus pulchellus* 1, 444.). . . **Silene conoidea** (*sylvestris altera* 1, 338.). . . **Sil. maritima** (*Lychnis marina anglica* 1, 337.).

**Refeda alba** (*maxima* 222.).

**Cactus peruvianus** (*Euphorbii arbor* 2, 25.).

**Papaver Argemone** (1, 276.). . . **Aconitum variegatum** (*Lycoctonum coeruleum parvum* 2, 678.). . . **Ranunculus gramineus** (1, 671.). . . **Ranunc. falcatus** (*Perpusillum Melampyrum* 1, 37.).

**Phlomis Herba venti** (1, 532.). . . **Origanum syriacum** (*Marum syriacum* 1, 499.). . . **Melissa cretica** (*Calamintha* 2 *incana* 1, 514.). . . **Antirrhinum Asarina** (1, 601.). . . **Scrofularia canina** (*Ruta canina* 1, 55.). . . **Digitalis ferruginea** (1, 573.). . . **Vella Pseudocytisus** (*Cytisi facie Alyssum fruticans* 2, 49.).

#### 406 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

Cochlearia danica (*Hederaceum Thlaspi* 1, 615.). . . Cochl. anglica (*britannica* 1, 294.). . .  
 Alyssum spinosum (*Thlaspi fruticosum spinosum* 1, 217.). . . Al. campestre (*Thl. supinum luteum* 1, 226.). . . Erysimum diffusum (*Eruca sylv. angustifolia* 1, 205.).

Erodium gruinum (*Geranium creticum annum* 1, 662.).

Genista anglica (*Genistella aculeata* 2, 93.). . .  
 Ononis antiquorum (*Ononis Aegipyros* 2, 28.). . .  
 On. rotundifolia (*Cicer sylv. verius* 2, 73.). . .  
 Cytisus argenteus (*Lotus asperior fruticosa* 2, 41.). . .  
 . . ?Coronilla Emerus (*Colutea scorpioides* 2, 86.). . .  
 . . Pforalea americana (*Trifolium* 2, 31.). . .  
 Medicago radiata (*Lunaria radiata Italarum* 2, 38.).

Hypericum elodes (*tomentosum* 1, 400.). . .  
 Hyp. ferpyllifolium (*syriacum et alexandrinum* 2, 390.).

Apargia crispa (*Hieracium flore et folio dentis leonis* 1, 238.). . . Helminthia echiioides (*Buglossum echiioides luteum* 1, 577.). . . Cnicus dissectus (*Cirsium maius* 1, 582.). . . Cn. pratensis (*Cirs. anglicum* 1, 583.). . . Cn. Cafabonae (*Acarua Theophrasti* 2, 16.). . . Staehelina fruticosa (*Cyanus repens* 1, 548.). . . Artemisia arborefcens (*Abfinthium* 1, 753.). . . Gnaphalium alpinum (*Leontopodium parvum* 1, 484.). . . Ga.

asterisciflorum (*Leontopodium ib.*). . . Xeranthemum orientale (*Iacea pusilla incana* 1, 545.). . . Cineraria palustris (*Conyza helenitis fol. laciniosis* 1, 547.). . . Cin. ? campestris (*Conyza helenitis mellita incana ib.*).

Orchis variegata (*strateumatica minor* 1, 184.). . . Orch. militaris (*strateum. maior ib.*). . . Ophrys Monorchis (*Orchis minor leodienfis* 1, 187.). . . Ophr. apifera (*Melittias* 1, 180.). . . Ophr. araneifera (*Testiculus vulpinus secundus* 1, 179.).

Carex ovalis (*Gramen cyperoides parvum aquaticum* 1, 19.). . . Car. vulpina (*Gr. palustre cyperoides ib.*). . . Car. elongata (*Gr. palustre maius* 1, 11.). . . Car. Pseudocyperus (1, 76.). . . Ambrosia maritima (*Jativa hortensis* 1, 766.).

Asplenium marinum (*Chamaefilix marina anglica* 1, 814.). . . Fucus barbatus (2, 254.). F. acinarius (256.). Ulva Lactuca (*hist.* 647.). U. umbilicalis (*Lichen marinus ic.* 2, 246.).

Posthumus „stirpium illustrationes“ Gul. Howe Lond. 1655. 4. edidit, ubi variae rariores occurrunt, sine iconibus: e. g. *Aquilegia canadensis*, *Anamenia Ventenati* etc.

\* \* \*

Excipiat Lobellium vir omnino summus et immortalis, *Carolus CLUSIUS*, qui omnes facile sui aevi botanicos, cognitione fere immensa plantarum, iudicii acumine, arte describendi, experientia et

#### 408 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

doctrina superavit. Cuius vita cum laborum et fortunae varietate, peregrinationibus maxime abundaverit, repetere eam hic libet. Atrebas fuit, natus 1525, in disciplina apud Lovanienſes et Marpurgenſes permanſit, donec Monſpelium adiret, ubi 1559. ſummos in arte medica honores adeptus eſt. Redux Antverpiae, Lovanii et Auguſtae Vindelicorum commoratus eſt. Inter amicos Fuggerorum receptus, cum hiſ Belgium et Germaniam borealem peragravit, dein oras Galliae occidentales, totam Hiſpaniam et Luſitaniam ipſam. Rediit 1565, quinquennium conſumſit in digerendis itineris fructibus: 1560. adiit Angliam: 1573. vocatus eſt Viennam, ut hortis Imperatoris praeſeſſet. Quo munere functus eſt ita, ut totam ſimul Auſtriam et Hungariam perquireret. Angliam iterum 1580. tendit: 1587. Francofurti ad Moenum habitare coepit, ubi a Landgravio Haeſſiae ſuſtentatus, Leidam denique 1593. vocatus fuit, ut rem herbariam publice doceret († 1609.). Valetudine adverſa et variis morbis luit immenſum ardorem in re herbaria. Brachium et alterum ſemur fractum, alterum luxatum cum fracto malleolo coëgerunt ſenem, ut baculis ſe continuo ſuſtineret: hiſ acceſſit hernia cum aliis morbis, qui tamen animum ſummi viri nunquam deprimere neque minuire amorem plantarum potuerunt. Harum immenſam fere copiam ex itineribus retulit, in naturales quasdam familias

ligeret, studio summo discrevit novas a cognitis, illas duntaxat ut suas descripsit, iconibusque illustravit. Non iudicii folius acie excellit, sed eruditione etiam non mediocri, cum et veteres et recentiores plerasque linguas calleret. Quibus animi virtutes acceperunt non vulgares: pietas in Deum pariter ac in homines. Cum enim maiori natu dominium ac feudum Watenesi hereditatis iure a patre accepisset, cessit eo ultro fratri natu minori, victum sibi quaerens e diligentiae et doctrinae emolumentis (Cf. Ever. *Vorsii orat. de vita Clus. ad calc. cur. poster.*).

Tanti viri scripta monumenta aeterna ingenii sunt ac doctrinae, quibus et tiro et qui ad maturitatem pervenit, etiamnum carere nequit. Edidit autem, praeter Garciam, Monardem, Acoftam, Dodonaem et Belonium, „Rariorum stirpium per Hispanias observatarum historiam“, Antv. 1576. 8. cum 229 iconibus, dein „Rariorum stirpium per Pannoniam observatarum historiam“, Antverp. 1583. 8. cum figuris 358. Utrumque librum contraxit, additis aliis, in „Rariorum plantarum historiam“ Antverp. 1601. fol. Quibus post obitum acceperunt „Curae posteriores“, Antverp. 1611. 4. Complectuntur autem haec opera tum eas plantas, quas ipse detexerat, tum quas amici ipsi tradiderant, inter quos grate nominat Thom. Pennacum Londinensem, qui in plantas



#### 41\* LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*la urfi* iv., *hist.* 1, 304.). *Pr. glutinosa* (vii. *ib.*),  
*Pr. minima* (305.). *Pr. farinosa* (*Pr. veris rubra*  
*flore* 300.). . . *Lythmachia thyrsiflora* (*lutea* 3.  
*hist.* 2, 53.). *Lyf. punctata* (*altera* 52.). . . *Ana-*  
*gallis Monelli* (*app. alt. exot.*). . . *Azalea pro-*  
*cumbens* (*Chamaecistus* vii. *hist.* 15, 7.). . . *So-*  
*lanum tuberosum* (*hist.* 2, 79.) 1588 tubera ipsi  
 misit Phil. de Sivry. . . *Convolvulus althaeoides*  
 (*hist.* 2, 49.). *C. Cantabrica* (*ib.*). . . *Ipomoea*  
*Bona nox* (*Buenas noches exot.* 44.). *Ip. Quam-*  
*oclit* (*cur. post.* 8. 9.). . . *Lonicera nigra* (*Pe-*  
*riclymenum rectum* ii. *hist.* 1, 58.). . . *Lycium*  
*afrum* (*Rhamni* i. *spec.* ii. *hist.* 1, 109.). . . *Rham-*  
*nus lycioides* (iii, 110.). *Rh. Alaternus* (50.). . .  
*Evonymus latifolius* (*hist.* 1, 56.). *Ev. verrucosus*  
 (57.). . . *Viola grandiflora* (*montana* iii. *hist.* 1,  
 310.). *V. pinnata* (*laciniato folio* 309.). . . *Cynau-*  
*chum monspeliacum* (*Apocynum* iv. *latifol.* *hist.*  
 1, 126.). . . *Gentiana pannonica* (*maior purpu-*  
*reo flore* *hist.* 1, 312.). *G. verna* (vi, 315.). *G.*  
*nivalis* (xi, 316.). . . *Eryngium pusillum* (*hist.*  
 2, 158.). . . *Tordylium maximum* (*Caucalis*  
*maior*, *hist.* 2, 201.). . . *Caucalis pumila* (*cur.*  
*post.* 71.). . . *Laserpitium Archangelica* (*hist.* 2,  
 195. *male*). . . *Chaerophyllum bulbosum* (*Cicu-*  
*taria vulgaris* *hist.* 2, 200.). . . *Seseli Hippoma-*  
*rathrum* (*Saxifraga pannonica*, *hist.* 2, 196.). . .  
*Peucedanum arenarium* (*pannonicum* *ib.*). . .

*Thapsia villosa* (*hist.* 2, 192.). . . *Pimpinella peregrina* (*Selinum montanum pumilum*, *hist.* 2, 200.). . . *Cassine capensis* (*Celastrus Theophr. cur. post.* 4.). . . *Telephium Imperati* (*hist.* 2, 67.). . . *Linum hirsutum* (*sylv.* 1. *hist.* 1, 317.). *L. tenuifolium* (iv, 318.). *L. alpinum* (v, *ib.*).

*Leucoium aestivum* (*bulbosum maius*, *hist.* 1, 168.). *L. autumnale* (*bulbosum serot. tenuifolium* 170.). . . *Narcissus minor* (*Pseudonarcissus minor hisp.* *hist.* 1, 165.). *N. triandrus* (*iuncifolius albo flore reflexo*, *app. alt. auct. in exot.*). *N. serotinus* (162.). *N. Tazetta* (*latifolius* 155.). *N. moschatus* (*Pseudonarcissus* III, 166.). *N. calathinus* (ix *angustif.* 158.). . . *Pancratium maritimum* (*Hemerocallis valentina*, *hist.* 1, 167.). . . *Bulbocodium vernum* (*Colchicum vernum app. alt. exot.*). . . *Amaryllis lutea* (*Narcissus autumnalis maior*, *hist.* 1, 164.). . . *Am. formosissima* (*Narcissus latifolius flore rubro* 157.). . . *Allium rotundum* (*Moly* v. *hist.* 1, 195.). *All. oleraceum* (*Moly* III, 194.). *All. vineale* (II, *ib.*). *All. paniculatum* (iv, *ib.*). *All. senescens* (*narcissinis foliis* 1, *ib.*). *All. angulosum* (II, 196.). *All. Clusianum* (*Moly minus* 192.). *All. nigrum* (*Moly Theophrasti* 191.). *All. Moly* (*app. alt.*). . . *Lilium pomponium* (*rubrum praecox*, *hist.* 1, 133.). *Lil. chalconicum* (*byzant. miniatum* 132.), *Lil. pyrenaicum* Gouan. (*montanum flavum hist.* 2,

#### 414 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

256.). . . *Fritillaria pyrenaica* (*hist.* 2, 257.). . .  
*Ornithogalum pyrenaicum* (*app. alt. ad exot.*).  
*O. comosum* (*pannon. albo flore hist.* 1, 187.).  
*O. arabicum* (186.). *O. nutans* (*neapolitanum*  
*app. alt. ad exot.*). . . *Scilla italica* (*Hyacinthus*  
*stellatus cineracei coloris hist.* 1, 184.). *Sc. peru-*  
*viana* (182.). *Sc. verna* (*Ornithogalum hisp. mi-*  
*nus* 188.). *Sc. hyacinthoides* (*Bulbus eriophorus*  
172.). *Sc. autumnalis* (*Hyacinthus autumnalis mi-*  
*nor* 185.). . . *Asphodelus ramosus* (1, 196.). *A. al-*  
*bus* (11, 197.). *A. fistulosus* (*minor ib.*). . . *Aspara-*  
*gus acutifolius* (*Corruda* 1. *hist.* 2, 177.). *A. aphy-*  
*llus* (11, 178.). *A. albus* (111, *ib.*). . . *Convallaria la-*  
*tifolia* (*hist.* 1, 276.). . . *Polianthes Tuberosa* (*Hy-*  
*acinthus indicus hist.* 1, 176.). . . *Hyacinthus cer-*  
*nuus* (*hispanicus hist.* 1, 177.). *H. romanus* (*como-*  
*pus albo flore* 180.). . . *Lachenalia serotina* (*Hy-*  
*acinthus obsoleti coloris hist.* 1, 177.). . . *Yucca*  
*Draconis* (*Tacori exot.* 48.). . . *Tofieldia palu-*  
*stris Hudf.* (*Pseudo-asphodelus* 11. *hist.* 1, 198.).  
*Sternbergia colchiciflora Kitaib.* (*Colchicum pan-*  
*nonicum* 199.). . . *Colchicum montanum* (*hist.* 1,  
200. 201.). . . *Fraukenia pulverulenta* (*Anthyl-*  
*lis valentina hist.* 2, 186.).

*Chlora perfoliata* (*Centaurium parvum fla-*  
*rum hist.* 2, 180.). . . *Erica viridi-purpurea* (*co-*  
*ris folio* 3. *hist.* 1, 42.). *Er. arborea* (*coris folio*  
1, 41.). *Er. mediterranea* (11, 42.). *Er. scoparia*

(iv, *ib.*). *Er. cinerea* (v, 43.). *Er. purpurascens* (vii, *ib.*). *Er. herbacea* (viii, 44.). *Er. ciliaris* (xii, 46.). . . *Passerina hirsuta* (*Sanamunda* iii. *hist.* 1, 89.). . . *Polygonum viviparum* (*Bistorta minor hist.* 2, 69.).

*Laurus Persea* (*hist.* 1, 3.).

*Ruta montana* (*hist.* 2, 136.). . . *Rhododendron Chamaecistus* (viii. *hist.* 1, 76.). . . *Arbutus alpina* (*Vitis idaea* ii. *hist.* 1, 62.). *A. Uva urfi* (63.). . . *Pyrola secunda* (*hist.* 2, 117.). *P. umbellata* (iii, *ib.*). *P. uniflora* (iv, 118.). . . *Saxifraga caesia* (*Sedum minus* ix. *hist.* 2, 61.). *S. Hirculus* (*cur. post.* ii.). *S. aizoides* (*Sedum minus* vi. *hist.* 2, 60.). . . *Dianthus alpinus* (*Caryophyllus sylv.* iii. *hist.* 1, 283.). . . *Silene quinquevulnera* (*Lychnis sylv.* vi. *hist.* 1, 290.). *S. conica* (*Lychnis sylv.* ii. *hist.* 1, 288.). *S. Muscipula* (iii, 289.). *S. polyphylla* (viii, 290.). *S. Armeria* (1, 288.). *S. alpestris* (x, 291.). *S. pumilis* (*Caryophyllus sylv.* vii, 285.).

*Sedum Anacamperos* (*Telephium* vi. *hist.* 2, 67.). *S. villosum* (*Sedum minus* iii, 59.). . . *Cerastium dichotomum* (*Alfne corniculata hist.* 2, 184.).

*Refeda Clusii mihi* in cent. (*Sesamoides parvum salmant.* *hist.* 1, 295.). . . *Euphorbia ferrata* (*Tithymalus myrtites valent.* *hist.* 2, 189.). . . *Euph.*

#### 416 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*hiberna* (*Tith. platyphyllos* 190.). *E. Characias* (1, 188.).

*Philadelphus coronarius* (*Frutex coronarius* *hist.* 1, 55.). . . *Pyrus Amelanchier* (*Vitis idaea* II. *hist.* 1, 62.). . . *Spiraea salicifolia* (*hist.* 1, 84.). *Rosa spinosissima* (*campestris odor. hist.* I, 116.), *R. sempervirens* (*app. alt. auct.*). . . *Rubus Chamaemorus* (118.). . . *Potentilla supina* (*Pentaphyllon supinum hist.* 2, 107.). *P. opaca* (IV. *spec.* 2, 106.). *P. aurea* (III, *ib.*). *P. Clusiana* (II, 105.). -

*Sarracenia purpurea* (*Limonio congener hist.* 2, 82.). . . *Bixa Orellana* (*fructus echinatus exot.* 73.). . . *Cistus lavandulifolius* (*hist.* 1, 72.). *C. ocimoides* (*fol. sampsi ib.*). *C. thymifolius* (*ib.*). *C. oelandicus* (*Chamaecistus* II, 73.). *C. canus* (*Chamaec.* III, 74.). *C. pilosus* (IV, *ib.*). *C. Clusii* (V, 75.). *C. Fumana* (VI, *ib.*). *C. ledifolius* (*annuus* 76.). *C. laurifolius* (*Ledon.* I, 17.). *C. populifolius* (*latifolius* II, 78.). *C. laxus* (*Ledon.* IV, *ib.*). *C. mouspelienfis* (V, 79.). *C. Libanotis* (VI, *ib.*). *C. umbellatus* (X, 81.). *C. crispus* (*mas* V, 168.). *C. incanus* (*mas* II, *ib.*). *C. albidus* (*mas* I, 67.). . . *Delphinium ambiguum* (*elatius simpliciflore hist.* 2, 206.). *D. intermedium* (*Aconitum Lycoctonum flore Delphin.* 2, 94.). . . *Aconitum tauricum* (*hist.* 2, 96.). *Ac. neomontanum* (*neubergense* 97.). *Ac. cer*

nuum (VIII, 97.). *Ac. Cammarum (iudenhergenſe ib.)*. . . *Rhizobolus butyrolus Gärtn. (Caſtanea peruiana, hiſt. 1, 8.)*. . . *Anemone palmata (hortenſis latifolia, hiſt. 1, 248.)*. . . *Clematis cirrhoſa (altera baetica, hiſt. 1, 123.)*. *C. integrifolia (coerulea pannonica ib.)*. . . *Ranunculus amplexicaulis (pyrenaeus albo flore, append. alt. auctar. ad exot.)*. *R. bullatus (grumofa radice I, hiſt. 1, 238.)*. *R. creticus (239.)*. *R. illyricus (grumofa radice IV, 240.)*. *R. alpeſtris (montani ſpec. I, 234.)*. . . *Iſopyrum thalictroides (Ranunc. praecox II, hiſt. 1, 232.)*.

*Teucrium fruticans (III, hiſt. 1, 348.)*. *T. montanum (Polium VII, 363.)*. . . *Nepeta tuberoſa (Menthaſtrum III, hiſt. 2, 33.)*. . . *Lavandula dentata (Stoechas criſpo folio, hiſt. 1, 345.)*. *L. multifida (ib.)*. . . *Sideritis hiriſuta (III, hiſt. 2, 40.)*. *S. hyſſopifolia (VII, 41.)*. . . *Lamium Orvala (Galeopſis maxima pannonica, hiſt. 2, 36.)*. . . *Betonica Alopecuros (albo flore, hiſt. 2, 39.)*. . . *Stachys hirta (Ocimaſtrum valentinum, hiſt. 2, 42.)*. . . *Marrubium peregrinum (alterum pannonicum, hiſt. 2, 34.)*. . . *Thymus pannonicus (Serpyllum pannon. III, hiſt. 1, 360.)*. *Th. Zygis (358.)*. *Th. alpinus (Clinopodium auſtriacum 353.)*. . . *Dracocephalum auſtriacum (Chamaepitys auſtr. hiſt. 2, 185.)*. . . *Prunella grandiflora (I, hiſt. 2, 43.)*. . . *Pedicularis*

#### 418 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

havis foliofa (*Alectorolophus alpina*, *hif.* 2, 210.).  
*P. rostrata* (III, 221.). . . *Antirrhinum triphyllum*  
 (*Linaria hispan.* 1, *hif.* 1, 320.). *A. lupinum* (*hif.*  
 v, 321.). *A. simplex* (iv, 323.). *A. alpinum*  
 (III, 322.). *A. genistaefolium* (*pannonica* 1, *ib.*).  
 . . *Scrofularia tanacetifolia* Willd. *hort. berol.* t. 55.  
 (*cretica* 1, *hif.* 2, 209.).

*Vella annua* (*Nasturtium sylvestre valenti-*  
*num*, *hif.* 2, 130.). . . *Thlaspi montanum* (II,  
 131.). *T. alpestre* (III, *ib.*). . . *Iberis odorata*  
 (*Thlaspi* iv, 132.). . . *Peltaria alliacea* (*Thlaspi*  
 1, 130.). . . *Cardamine trifolia* (*hif.* 2, 127.). . .  
*Cheiranthus erysimoides* (*Leucoium fylv.*, *hif.* 1,  
 299.). *C. litoreus* (*marinum minus* 298.). . .  
*Arabis alpina* (*Draba* II, *hif.* 2, 125.). *A. bel-*  
*lidifolia* (*Plantula Cardamines alterius aemula*  
 129.). *A. Torrita* (*maior Plateau* 126.). . . *Braf-*  
*fica arvensis* (*campestris* II, 127.).

*Geranium phaeum* (1, *hif.* 2, 99.). *G. no-*  
*dofum* (101.). *G. fylvaticum* (II, 99.). . . *La-*  
*vatera maritima* (*Althaea frutex*, *hif.* 2, 24.). . .  
*Althaea cannabina* (*hif.* 2, 25.). . . *Hibiscus*  
*Sabdariffa* (*Alcea americana*, *hif.* 2, 26.).

*Polygala maior* (*hif.* 1, 324.). . . *Erythrina*  
*Corallo dendron* (*Coral arbor*, *hif. app.* 253.). . .  
*Spartium sphaerocarpon* (II, *hif.* 1, 102.). *Sp.*  
*Scorpius* (*Aspalathus alter* III, 106.). . . *Geni-*  
*ffa florida* (*tinctoria hispan.*, *hif.* 1, 101.). *G. fa-*

gittalis (*Chamaegenista* II, 104.). *G. canariensis* (*Cytisus* I, 94.). . . *Cytisus divaricatus* (II, *hist.* I, 94.). *C. capitatus* (V, 95.). *C. austriacus* (V, *spec. alt.* 96.). *C. lupinus* (VII, *ib.*). *C. triflorus* (III, 94.). . . *Anthyllis cytifoides* (*Cytisus* VI, 96.). *A. Erinacea* (107.). . . *Vicia pisiformis* (*Pisum sylv.*, *hist.* 2, 229.). *V. oroboides* (*Orobis pannon.* IV, 231.). *V. ampicarpa* (*Theophrasti. ἀράνη ὁμοίον exot.* 88.). *V. fordida* (*sylv. albo flore*, *hist.* 2, 235.). . . *Coronilla valentina* (*Polygala*, *hist.* I, 98.). *C. glauca* (*Colutea scorpioides* I, 97.). *C. coronata* (II, 98.). . . *Phaca baetica* (*Astragalus*, *hist.* 2, 233.). *Astragalus hamosus* (*monspeliacus*, *hist.* 2, 234.). *A. Glaux* (233.). . . *Trifolium alpestre* (*maius* III, 245.). *T. montanum* (*maius* I, *ib.*). *T. fragiferum* (*cur. post.* 73.). *T. squarrosum* (*Lagopus angustifolia hisp.*, *hist.* 2, 247.). . . *Lotus tetragonolobus* (*filiquosus rubello flore*, *hist.* 2, 244.).

*Hypericum balearicum* (*Myrtocistus Pennaei*, *hist.* I, 68.). *H. humifusum* (*supinum* III, *hist.* 2, 181.).

*Scorzonera purpurea* (*angustifolia* IV, *hist.* 2, 139.). *Sc. humilis* (*pannon.* II, 138.). *Sc. rosea* (*angustifolia* III, 138.). . . *Apargia incana* (*Hieracium* VI, *montanum* *hist.* 2, 141.). . . *Hieracium villosum* (V, 141.). . . *Lapsana pusilla* (*Hie-*



#### 420 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*racium* ix. *minimum* *hist.* 2, 142.). . . *Scolymus maculatus* (*hist.* 2, 153.). *Sc. hispanicus* (*ib.*). . . *Serratula discolor* (*Carduus mollior* ii. *hist.* 2, 151.). . . *Carduus defloratus* (*Cirsium* iii. *hist.* 2, 149.). *C. pannonicus* (*Cirsium pannonicum* i, 148.). *C. mollis* (*mollior* 1, 150.). . . *Carlina racemosa* (*sylv. minor hispanica* *hist.* 2, 157.). . . *Carthamus coeruleus* (*Cnicus alter* *hist.* 2, 152.). . . *Cacalia Kleinia* (*Arbor lavandulae folio exot.* 7.). *C. alpina* (*glabro folio* *hist.* 2, 115.). *C. albifrons* (*incano folio* *ib.*). . . *Santolina squarrosa* (*Abrotanum femina vulg.* *hist.* 1, 341.). *S. rosmarinifolia* (iv, 342.). . . *Tanacetum annuum* (*Elichryson* *hist.* 1, 326.). . . *Artemisia scoparia* (*Abfynthium tenuifolium* *hist.* 1, 339). . . *Gnaphalium margaritaceum* (*americanum* *hist.* 1, 327.). . . *Senecio carniolicus* (*Chrysanthemum alpinum* 1, *hist.* 1, 333.). *S. abrotanifolius* (ii, 334.). *S. alpinus* (*Iacobaea* iii, *hist.* 2, 23.). *S. Doronicum* (*Doron. austr.* 1, 17.). . . *Inula Oculus* (*Conyza* iii. *austr.* *hist.* 2, 20.). *In. Bubonium* (*Aster montanus* iv. *hist.* 2, 14.). *In. ensifolia* (*Aster* vi, 15.). . . *Arnica montana* (*Doronicum* v. vi. *hist.* 2, 18.). *A. Doronicum* (ii, 17.). *A. glacialis* (iv, *ib.*). . . *Chrysanthemum coronarium* (*creticum* *hist.* 1, 335.). . . *Pyrethrum alpinum* (*Leucanthemum* *ib.*). . . *Achillea Clavennae* (*Abfynth. alpinum umbelliferum* *hist.* 1,

540.). Nomen habet a Nicol. *Clavenna*, pharmacopola Bellunensi, cuius tr. de Abfinthio umbellifero, Venet. 1610. 4. exstat. *A. atrata* (*Parthenium alpinum* 336.). *A. tomentosa* (*Stratiotes millefolia flavo flore* 330.). *A. tanacetifolia* (*Millefolium rubro colare* 331.). . . *Bupthalmum maritimum* (*Aster* II, *hist.* 2, 13.). *B. falcifolium* (*Aster* III, *ib.*). . . *Centaurea erucaefolia* (*Stoebe salmantica* II, *hist.* 2, 9.). *C. splendens* (III, 10.). *C. Calcitrapa* (7.). *C. Verutum* (*Iacea luteo flore* 8.). *C. salmantica* (*Stoebe salmantica* I, 9.). . . *Micropus erectus* (*Gnaphalium* III, *Plateau, hist.* I, 329.).

*Orchis sambucina* (*pannonica* VIII, *hist.* I, 269.). . . *Cymbidium Corallorrhiza* (*Dentaria coralloide radice, hist.* 2, 120.). . . *Limodorum abortivum* (*Pseudo-Leimodorum, hist.* I, 270.). . . *Aristolochia baetica* (*hist.* 2, 71.).

*Myriophyllum verticillatum* (*hist.* 2, 252.). . . *Quercus humilis* (*Robur* VII, *hist.* I, 19.). *Q. austriaca Willd.* (*Cerrus* I, 20.). . . *Corylus Colurna* (*Avellana pumila byzantina, hist.* I, 11.). *Hura crepitans* (*Baruce ex Hura exot.* 42.). . . *Manicaria saccifera* (*Palma exot.* 4.). . . *Pinus Pumilio* (*Pinafter* IV, *hist.* I, 52.). . . *Forstera muscifolia* (? *Amomum ad Garc.* 199.). *Poterat* autem a Magellani et Drakii comitibus acceperisse magellanicam plantam.

## 422 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

Empetrum album (*Erica coris folio* 10, *hist.* 1, 45.). . . Smilax nigra (*hist.* 1, 113.). Sm.  
Pseudochina (*exot.* 83.). . . Dorstenia Drakena  
(*exot.* 83.). . . Mercurialis tomentosa (*Phyllum  
marificum*, *hist.* 2, 48.). . . Carica Papaya (*Ma-  
moera Lusitanorum cur. post.* 78 — 81.). . . Schi-  
nus Molle (*cur. post.* 94.).

Polypodium calcareum *Smith.* (*Filix pumila  
faxatilis* 1, *hist.* 2, 212.). P. fragile (11, *ib.*).  
P. quercifolium (*indicum exot.* 89.). . . Botrychium  
rutaceum *Sw.* (*Lunaria minor ramosa* 3, 119.). . .  
Lycopodium denticulatum (*Muscus terrestris lu-  
fit.* *hist.* 2, 249.). . . Fucus vesiculosus (*Quer-  
cus marina*, *hist.* 1, 21.). F. Plocamium (*Muf-  
cus marinus* 2, 250.).

In fungis etiam defudavit praestantissimus Clu-  
sius, esculentos generatim a noxiis discernens.  
Ceterum *Peziza Auricula* (*hist.* 2, 276.). . . *Phal-  
lus impudicus* (288.). . . *Merulius lobatus* (*Fun-  
gi alii E.* 294.). . . *Morchella esculenta* (264.). . .  
*Clathrus ruber* (*Fungus cancellatus in app. al-  
ter. auctar. ad exot.*) novi sunt.

\* \* \*

Andreas CAESALPINUS, quem primum Sy-  
stematicum Orthodoxum praedicat Linnaeus, Are-  
tinus fuit, natus 1519, Lucae Ghini discipulus,  
dein pontificis maximi archiater † 1603.

Quem primum instauraverat naturalem ordinem

Lobelius, Clusius autem auxerat et exornaverat, Caesalpinus legibus firmis ac stabilibus superstruere conatus est. Vir enim perspicacissimus facile intellexit, cum Indies plantarum numerus augetur, difficillimam fieri cognitionem et usum librorum fere nullum evadere, nisi principia quaedam statuuntur ac leges, iuxta quas examinandae sint plantae, similitudines conferendae et genera stabilienda. Molitus id est in opere „De plantis“ Florent. 1583. 4. quod omnino systema quoddam naturale complectitur, sed artificialibus fundatum characteribus.

Orditur autem praeclarissimus vir ab examine partium et loci illius, qui principatum animae habere videatur. Venis iis, quibus animalia, haud quidem instructas esse plantas; esse tamen ductus quosdam succo nutritio plenos, quos in lactescentibus manifesto observamus. Attrahi autem humores e terra vel aëre neque sensu quodam, quo omnino careant plantae, neque mere mechanico modo, ob fugam vacui vel ob magneticam vim, sed caloris ope vim altricem agere ita, ut humores intrent et surgant. Folia e cortice oriri, venas etiam et nervos eorum e libro. Medullam non tanti esse momenti in plantis, quam corticem: plures enim sine medulla vivere: emori etiam circumciso cortice, non perire medulla excavata. Transit ad gemmarum et seminum differentiam, quae et nos

etiamnum exercet: differre autem arbitratur ut foetum vivum ab ovo: semen enim tanquam ovum, esse, in quo fit principium vitale, at vita nequaquam: sobolem vero vivere primo iuxta parentem, ut eius germen, post vero per se ipsam, suis radicibus humorem attrahere. Quae quidem differentia tantum abest, ut rem exhauriat ut potius qualitatem quamdam complectatur et feminibus et geminis peculiarem. Maris et feminae distinctione plantas non egere, ob simpliciores structuram et pauciores spiritum.

Seminis essentialem particulam Caesalpinus iure quaerit in eo loco, unde cotyledones, quas folia duo pulposa vocat, oriuntur; eam particulam *corculum* dicit, quo exesilico plantulam perire observavit. Flores nil esse nisi involucria fructuum, qui cum spiritu potius quam humore abundant, esse versicolores, nec virides, ut folia. Inesse floribus et stamina et floccos: illa (pistilla) esse feminum processus: hos (stamina nobis) arbitratur etiam feminum propagines esse. Calycem, seu exterius floris involucrum, nutriri e cortice, hinc non decidere cum flore, sed fructum plerumque vestire. In quibusdam firmiter flori adhaerere, ut interne flos, externe calyx nominari possit, e. g. Ornithogalum. Patetur, in quibusdam esse sexum distinctum, ut in Cannabi, Urtica, Mercuriali, Iunipero, Taxo etc.

Distributionem plantarum adgrediens, cum Gesnero fatetur, e modo fructificandi optime et commodissime peti generum characteres: in nullis enim aliis partibus tantam organorum varietatem molitam esse et distinxisse naturam, quam in iis, quae ad fructificationem pertineant (*lib. 1. c. 13.*). Quae lex ab ipso stabilita licet optima sit et rationi congrua, labitur tamen eximius vir, dum in singula exspatiatur. Etenim alias esse perhibet plantas, quae dum nullum ferant semen, e putredine oriantur, quorum fungos pertinere autumat, alias vero imperfectum producere, quod aliarum plantarum velut abortus sint aut morbi, ut multa in genere frumentorum, quibus spica inanis et fere iuncorum genera et orchidum, Orobanche et Hypocistis: namque in his pro femine mukum aut pulvisculum conceptaculis contineri. Quosdam aliquid ferre, quod proportionem respondeat semini: *nam per id visas esse propagari*: esse autem lanuginem quamdam foliis insidentem, caule vero et flore et femine carere, velut filices omnes.

Partium fructificantium autem et numerum et situm et figuram in censum venire, dum constitutendae sint classes plantarum. Seminum itaque situm; sive corculum exterius spectet sive interius; sedem supra aut infra calycem; conceptaculorum formam et numerum: ita etiam floris et calycis figuram situmque considerat, ut plantarum genera distri-

buat. Quaecunque autem neque ad totius plantae neque ad fructus constitutionem faciant, ut colores, odores, sapores et alia huiusmodi, accidentia esse, saepiusque e cultu aut locorum coelique diversitate variari.

Vulgarem ordinem sequens, primum arbores tractat, dein herbas, utrasque habet vel simpliciores, quae sub uno flore *A. unicum semen* ferunt, aut *unum seminis conceptaculum*; vel magis compositas, quae plura habent in uno calyce semina. Subdivisiones autem petuntur e sede seminis et corculi, quod vel exterius vergit, ut in plerisque arboribus, vel interius: aut, quod idem est, corculum ex apice vel e basi seminis prodit. *α.* Glandiferae et nuciferae arbores omnes ad prius pertinent genus, quas primo loco tractat Caesalpinus. Inter has Quercus Pseudofuber (*Suberella Caesalp.* 2, 2.) et Olityra vulgaris (2, 7.). Immiscet tamen etiam alienas, ut Acera et Fraxinos et Platanos. . . *β.* Quae pericarpium ferunt, . . 1. *feminis corculo exterius vergente*, aliae quidem florem in summo fructu, aliae vero in basi gerunt. Ad priorem classem refert Amygdalas, Persicas, Prunos, Perseam (quam cum Anacardio confundit), Laurum, Piper, Cubebas, aliasque plantas gummiiferas, ut Benzoën, Styracem et alias, quarum semen haud examinaverat, ad famosissimam usque Lotum. Dein persequitur eas, quarum semina 2. *cor in inferiore parte habent*, qua sci-

hæc aut pedunculo aut conceptaculo nectuntur: magna ex parte plura hæc ferunt semina, aut in communi conceptaculo aut in pluribus. Huc Ficum, Moram, Sambucum, Hederam, Ligustrum, Syringam ipsamque Rosam; dein Vitim, Arbutum, Guaiacum, *Ermellinam* (*Diospyros Lotus*): leguminosas, ut Cassiam, Ceratonium, Tamarindum, Cytisum, Genistam, Emerum, refert. B. Sunt quibus feminis sedes *bipartita* est, ut duo conceptacula videantur, quibus semina lanugine involuta sunt, quorum *Periploca* pertinet, *Staphylodendron*, *Populus*, *Salix*, *Tamarix*. C. *Tripartita* feminis sede pauca in genere arboreo occurrunt: novit autem Caesalpinus duntaxat *Buxum* et *Myrtum*, quarum flores summis fructibus inhaerent. D. *Quadrupartita* feminis sede habentur manifeste quidem *Siler* (*Evonymus*) obscure autem ob fructus parvitatem *Vitex*. E. *Multipliei* feminis sede et indeterminationi numero multa reperiuntur, horum autem  $\alpha$ . quaedam fructum ferunt exterius communi cortice tectum, ut *Malorum* genera,  $\beta$ . alia eundem habent tegente proprio singulorum corpore, ut *Conifera*: hæc enim veluti e squamis compactilem fructum ferunt, sub singulis squamis semina continentur. Seminis autem cor omnibus est in parte inferna: flos nullus, aut, si quis est, amentaceus.

Expositis arborum differentis transit ad suffrutices et herbas, quarum differentias similes præ-



#### 428 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

cipit. A. Prima classis solitaria fert semina sub singulis floribus, aut solitarium seminis conceptaculum. α. Nuda sunt semina in Valerianis foliis, quarum tum flos tum seminis cor exterius sita sunt: insident autem pappi his seminibus summis. β. Pericarpio cincta semina gerunt, quibus vel seminis cor exterius sedet, flos interius: quorsum Thymelaea, Daphnoides et Iasminum pertinet; vel flos in summo fructu et seminis cor pariter, ut in Cassia lignea (Daphne Cneorum.). Aliis pro seminis tegmine datum est floris involucrium, seminibus solitariis existentibus sub singulis floribus, ut in Cannabi, Lupulo, Ambrosia, Chenopodio, Beta, Atriplice, Blito, Tribulo, Spinachia, Rumice, Oxalide, Polygono, Salsola et omnibus frumentis ac cyperoides. γ. Conceptaculum simplex ac unicum sub uno flore gerunt, quae florem habent, fructui pulposo eduli insidentem, ut Cucurbitae et Cucumeres, Bryonia, Sambucus, Solanum, Smilacae, Rusci, Dictamnus, Arum. Huc autem legumina omnia, inter quae recenset etiam Cassiam Sennam italicam (8, 36.<sup>1</sup>), quae in agro Pistoriensis frequens feritur: adnumerat his etiam Lychnides, Dianthos, Asclepiades et alias. B. Secunda classis complectitur eas, quae bina semina nuda sub singulis floribus gerunt, aut conceptacula seminum bipartita. Ad priorem ordinem pertinent umbelliferae omnes (inter eas Pancakeolus s. Bunium Bul-

## INVENTORUM. CAESALPINUS. 429

bocastamum 7, 29.) et Sefeli Ammoides (7, 15.) ad posteriorem Rubiae, (*Crucianella maritima* 8, 12.), Agrimoniae, Mercurialis et Xanthium, Plantago etiam et Euphrasia, Orobanche, Cuscuta, Tor-naebona (*Nicotiana*), Hyoseyamus, Verbascum, Scrofularia. Huc etiam refert filiquosas, quippe quae bipartitum habent conceptaculum. . . C. Tertia classis continet plantas, quae terna semina gerunt aut nuda, ut Thalictrum (quod cum Pegano Harmala confundit), aut in conceptaculis, ut Euphorbiae (inter quas Euphorbia Cajogala 11, 8.) et Croton (*Heliotropium*), Convolvuli etiam, Sesamum, Asarum et Cardamomum, Cyclamen, Hypericum. Huc refert etiam bulbosas omnes, Allia, Scillam, Hyacinthum, Crocum, Narcissum, Aloën, Orchideas omnes. . . D. Sequuntur, quae quaterna habent semina; eaque plerumque nuda, ut Asperifoliae et Labiatae omnes. . . E. Quae multa semina gerunt, dividuntur  $\alpha$ . in Compositas, ubi flos superus est, et semina vel papposa vel nuda, receptaculum etiam vel foliaceum (*paleaceum*) vel nudum. His adnumerat Scabiosas, inter quas Sc. vel cretica vel limonifolia (13, 60.),  $\beta$ . in eas, quibus flos inferus est, qualis apparet in Ranunculis, Anemone, Geo, Butomo, Potentilla, Alchemilla, Geranio, Malvis.  $\gamma$ . in eas, quae in singulis conceptaculis plura gestant semina, at Oxalis, Gossypium, Bamia (*Hibiscus esculen-*

#### 430 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*tus*), Papaver, Ruta, Helleborus, Aconitum, Paeonia, Aquilegia. Superest plantarum familia, quae nullum profert semen, quorsum Filices (inter has Polypodium ilvense, 16, 10.), Musci frondosi, Equiseti, Lichenes, Algae et Fungi.

En primi systematis carpologici syllabum, quod licet imperfectum sit, ingenii tamen summi monumentum et aliorum omnium ad Gärtnerum usque exemplar est.

\* \* \*

Ni inter systematicos, inter collectores saltem inventorum numerandus est Ioachimus CAMERARIUS, medicus Noribergensis (nat. 1534. † 1598), Gesneriani thesauri possessor et horti praestantissimi cultor. Usus est iconibus Gesneri ad edendam „De plantis epitomen utilissimam Petr. Andr. Matthioli“ Frcf. ad Moen. 1586. 4. Egregium opus, ob mutatas et emendatas plerasque Matthioli icones, relictis paucis deterioribus, ut Auricula muris (408.), Rhabarbaro (414.), Chamaeleonte nigro (429.). Reliquae sunt elegantissimae, nitidissimae, quales nec maiores ipse nec posteri unquam ligno inciderunt; pleraeque habent partes essentialia, ut facillime et genus et speciem definire possis. Ordo ceteroquin nullus, nisi is, qui in Dioscoride Matthioli observatur. Adiutus fuerat a nepote Ioach. IUNGERMANNIO, Lipsiensi, post Guilandini successore nominato, qui Orientem ad-

## INVENTOR. CAMERAR. IUNGERMANN. 431

gressurus; oblit Corinthi 1591. Praestantissimas et novas prorsus icones, inter plusquam M, quae hic occurrunt, existimo sequentes:

*Echium italicum* (flore albo 738.). . . *Celosia castrensis* (*Amarantus cristatus* 792.). . . *Seseli tortuosum* (*massiliense nonnullorum* 511.). . . *Agave americana* (*Aloë* 451.) multo melius redit in horto t. 5. . . *Ballota alba* (572.). . . *Cardamine hirsuta* (*Sisymbrium aquaticum alterum* 270.). . . *Sisymbrium strictissimum* (*Arabis quibusdam* 342.). . . *Tragopogon orientalis* (*Barbula hirci* 312.). . . *Sonchus coeruleus* Sm. (281.). . . *Artemisia gallica* (*Abfinthium seriphium vulgo dictum* 458.). . . *Tussilago alba* (*Petasites fl. albo* 593.). . . *Ulva plicata* Roth. (*Muscus marinus alter* Plin. 872.).

Mox sequutus est „Hortus medicus et philosophicus“ Frcf. ad Moen. 1588. 4., primum et splendidum quidem exemplum descriptionis plantarum, quae in horto ditissimo colebantur; icones adiectae sunt nitidissimae, aliae propriae, aliae e Gesneri thesauro. Novae sunt fere:

*Montia fontana* (*Portulaca exigua* p. 131.).

*Sherardia arvensis* (*Rubeola arvensis* 149.).

*Physalis angulata* (*Halicacabum* t. 17.). . . *Gentiana bavarica* (t. 15.). . . *Gent. imbricata* (ib. 11.). . . *Eryngium amethystinum* (*totum coeruleum* p. 58.). . . *Bupleurum longifolium* (*Perfo-*

## 432 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*liata montana* t. 38.). . . *Tordylium peregrinum*  
(*Caucalis hispanica* t. 11.).

*Silene fruticosa* (*Ocimoides fruticosum* t. 33.).

. . . *Sil. noctiflora* (*Oc. noctiflorum* t. 34.). . . *Euphorbia Gerardiana* (*Tithymalus linifolius* 170.).

*Scrofularia peregrina* (t. 43.).

*Bunias fyriaca* (*Rosa hierochuntica alia* t. 42.).

. . . *Cheiranthus triculpidatus* (*Leucoion marinum*  
t. 24.).

*Sida indica* (*Abutilon* t. 1.). . . *Hibiscus fyriacus* (*Alcea arborescens* t. 4.).

*Anthyllis tetraphylla* (*Trifolium halicacabum*  
t. 47.). . . *Trifolium italicum* (*Melilotus italica*  
t. 29.). . . *Lotus ornithopodioides* (t. 25.). . .

*Medicago maculata* (t. 27.).

*Hieracium dubium* (*Lactucella sylvestris repens* p. 82.). . . *Cnicus fyriacus* (*Carduus lacteus fyriacus* t. 10.).

*Neottia repens* (*Orchis radice repente* t. 35.).

. . . *Phoenicis dactyliferae* germinatio (t. 36.).

\* \* \*

Inventa colligere ac in meliorem disponere ordinem fategit etiam Iacobus DALECHAMP, medicus Lugdunensis (nat. 1515. † 1588.), fed, licet adiutus a Ioanne Bauhino et Io. Molinaeo, inconditum tamen opus reliquit, quo aegerrime utimur, cum eadem plantae diversis nominibus occurrant. „Historia generalis plantarum.“ vol. 1. 2. Lugd.

1587. fol. Ronillius bibliopola iusto iactantius praefatur. Ordo singularis: 1. de arboribus sylvestribus; 2. fruticibus; 3. arboribus fructiferis; 4. fagetibus et leguminibus; 5. oleribus et herbis; 6. plantis umbelliferis; 7. flore placentibus; 8. odoratis; 9. palustribus; 10. de plantis in asperis locis et faxosis; 11. de plantis in udis locis et pinguibus; 12. de plantis maritimis et marinis; 13. de parasitis; 14. de Carduis et spinosis; 15. de bulbosis; 16. de catharticeis; 17. de venenatis; 18. de peregrinis. Plantarum descriptiones pleraeque a Matthiolo, Fuchio, Lobelio, Dodonaeo et Clusio: icones indidem mutuatae, paullo inferiores illis, sed appositis interdum, more Gesneri, partibus essentialibus.

Quae propria sunt Dalechampio aut melius ab eo exposita, sequentia videntur:

*Veronica urticaefolia* (*maxima* 1165.).

*Anthoxanthum odoratum* (426.). . . *Saccharum cylindricum* (*Gramen tomentosum* 430.). . . *Elymus arenarius* (*Oxyagrostis maritima* 432.). . . *Knappia agrostidea* Sm. (*Gramen minimum* 424.). . . *Dactylis glomerata* (*Gr. spicatum* 427.). . . *Polycarpon tetraphyllum* (*Paronychia altera* 1213.).

*Globularia nudicaulis* (*Aphyllanthes* m. 864.).  
 .. *Plantago alpina* (*Holosteum quorundam* 1183.).  
 .. *Camphorosma glabra* (*Chamaepeuce Plinii* 1179.).

#### 434 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*Convolvulus saxatilis* (*Lychnidis sylvestris species Myconi* 817.). . . *Verbascum Myconi* (*Auricula urfi* 837.). . . *Eryngium Bourgati* (*Spina alba* 1462.). . . *Bupleurum Odontites* (*Odontites lutea* 1063.). . . *Sifon verticillatum* (*Daucus pratensis* 718.). . . *Oenanthe peucedanifolia* (*Bulbo-castanum femina* 778.). . . *Aethusa Bunius* (774.). . . *Chaerophyllum hirsutum* (*Cicutaria alba* 789.). . . *Sefeli elatum* (*Petroselinum* 702.).

*Ornithogalum latifolium* (*magnum Myconi* 1583.).

*Möhringia muscosa* (*Alfine muscosa* 1235.). . . *Acer monspessulanum*, (95.).

*Scleranthus polycarpus* (444.). . . *Saxifraga Aizoon* (*Phyllon thelygonon* 1195.). . . *Gypophila rigida* (*Tunica minima* 1191.).

*Sedum dasyphyllum* (*Aizoon dasyphyllum* 1133.).

*Euphorbia verrucosa* (*Tithymalus* 1650.).

*Sarracenia flava* (*Turis limpidi folium* 1754.).

. . . *Cistus Tuberaria* (*maior Myconi* 1099.). . .

*Anemone apiifolia* (*Pulsatilla* III. 851.). . . *Ranunculus hederaceus* (1031.). *R. platanifolius* (*montanus albus* ib.).

*Lamium incisum* (*Ballote crispa maior* 1253.).

. . *Erinus alpinus* (*Ageratum purpureum* 1184.).

*Cakile maritima* (*Eruca maritima* 1394.). . .

*Lepidium alpinum* (*Thlaspi montanum minimum*

## INVENTORUM. DALECHAMP. 435

(1180.). . . *Iberis sempervirens* (*Thlaspi montanum candidum* 1180.).

*Althaea hirsuta* (*Alcea villosa* 594.).

*Polygala monspeliaca* (*Onobrychis* III. 491.). . .

*Ononis pinguis* (*lutea non spinosa* 449.). . .

*Coronilla minima* (*Lotus enneaphyllos* 510.). . .

*Ornithopus compressus* (*Scorpioides leguminosa* 493.). *O. perpuillus* (*Ornithopodium tuberosum* 486.). . .

*Astragalus montanus* (1347.). . . *Medicago minima* (*Tribulus minor rectus* 513.).

*Arnopogon Dalechampii* (*Hieracium magnum* 569. *male.*). . . *Sonchus picroides* (*Crepis* 562.).

. . . *Prenanthes muralis* (*Sonchus dendroides* 573.).

. . . *Andryala integrifolia* (*Sonch. lanatus* 1116.).

. . . *Cnicus Erisithales* (1094.). . . *Conyza fordida* (*Ageratum aliud quorundam* 778.). . .

*Eriogeron glutinosum* (*Conyza montana* 1201.). . .

*Anthemis maritima* (*Chamaemelum* 1394.). . .

*Chrysanthemum Myconi* (873.).

*Orchis globosa* (*rotundus* 1556.).

*Polypodium ilvense* (1221. 1230.). *Marfilea quadrifolia* (*Lemma* 1014. 1015.).

Haec quidem certiora sunt. Plurima dubia aut variis nominibus, licet eadem, insignita, de quibus Iacobus Pons egit in „animadversionibus in historiam plantarum generalem.“ Lugd. 1600. 8. Edidit etiam C. Bauhinus animadversiones in historiam plantarum Lugduni editam; catalogum plan-



## 436 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

tarum 400 eo in opere bis terve positarum. Frcf.  
1601. 4.

\* \* \*

Iacobus Theodorus TABERNAEMONTANUS, Alfatus, medicus Episcopi Spirensis et principis Palatinatus, Tragi autem discipulus, praeceptoris opera continuare moliens, impensas ab Episcopo Spirensi accipere speravit, sed intermortuo hoc, Bassaeus, typographus Francofurtanus magni herbarii tomum primum 1588. edidit. Defuncto 1590. auctore ipso, Nicol. Braunius reliquos tomos 1592. curavit: novam autem editionem C. Bauhinus: „Neuw vollkommentlich Kreuterbuch“ Tom. 1. 2. Frcf. ad Moen. 1613. fol. quam coram habeo. Continet, ordine quodam arbitrario, plusquam 5800 species plantarum, quarum 2480 iconibus expressae sunt, rudioribus iis, quam quae Camera-rius curaverat, plerisque mutuo acceptis a Clusio, Lobelio aliisque, nonnullis pessimis, aliis tamen melioribus, imo novis et peculiaribus. Nimius autem in viribus medicis, multus in nomenclatura omnium fere linguarum. Propriae ipsi aut melius descriptae sunt sequentes:

Veronica triphyllos (*Alf. recta* 2, 410.). . .  
Ver. hederæfolia (*Alf. hederacea* 2, 411.). . .  
Ver. arvensis (*Alf. fol. veronicae ib.*). . . Ver. agre-  
stis (*Alf. fol. trifraginis ib.*). . . Salvia hispanica  
(*Sclarea* 2, 97.).

**INVENTOR. TABERNAEMONTANUS. 437**

Valeriana dioica (*Phu minus* 1, 469.). . . Iris pallida (*dilute coerulea* 2, 359.). . . Scirpus Tabernaemontani *Gmel. fl. bad. n. 69. (Iuncus sylvaticus* 1, 554.). . . Phalaris arundinacea (*Gramen harundin. maius* 1, 53.). . . Panicum verticillatum (*Gr. geniculatum* III, 1, 532.). . . Andropogon Ichaemum (1, 553.). . . Stipa capillata (*Aegilops* IV, 1, 564.). . . Polycnemum arvense (*Camforata* II, 1, 57.).

Dipsacus laciniatus (II, 2, 393.). . . Asperula tinctoria (*Gallium album* III, 1, 445.).

Campanula patula (*Rapunculus sylv. minor* 2, 125.). . . Chenopodium murale (II, 2, 142.). . . Chaerophyllum temulum (*Cerefolium sylvestre* I, 288.). . . Pimpinella nigra (*Tragoselinum minus* 1, 258.). . . Linum austriacum (*sylvestre* III, 2, 526.).

Iuncus sylvaticus (*Gramen tunceum* I, 1, 553.).

Epilobium tetragonum (*Lyfimachia* III, 2, 554.).

. . . Epil. palustre (*Lyf.* VII, 2, 555.). . . Polygonum aviculare (II, 2, 533.).

Scleranthus annuus et perennis (*Polygon.* IV, V, 2, 534.). . . Stellaria uliginosa (*Alfine fontana* 2, 411.). . . Ceraftium aquaticum (*Alfine palustris* 2, 412.).

Erodium pimpinellifolium (*Geranium arvense* 1, 124.). . . Althaea ficifolia (*Malva rosea simplex* 2, 469.).

#### 438. LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

Spartium multiflorum (*Genista alba* 3, 824).  
 . . Vicia dumetorum (*Cracca maior* 2, 220.).

Hieracium paludosum (xiv. 1, 509.). H. syl-  
 vaticum (*Pulmonaria gallica tenuifolia* 1, 500.).  
 . . Crepis Dioscoridis (*Hierac.* i. 1, 506.). . . Cr.  
 nemausensis (*Hier.* vii. 1, 507.). . . Cr. virens  
 (*Hier.* ii. 1, 506.). . . Helianthus indicus (*Coro-  
 na folis* i. 2, 466.). . . Hel. multiflorus (*Cor.  
 folis* iv. 2, 467.).

\* \* \*

Immortalem meretur gloriam splendidum inge-  
 nium indefessaque industria *Fabii* COLUMNÆ,  
 Neapolitani. E nobilissima gente circa annum 1567.  
 natus, ab infantia inde diro morbo comitali vexa-  
 tus, licet iuris scientiam sibi elegisset, veteres ta-  
 men medicos assiduo legere coepit, ut remedium  
 aliquod expeditissimum inveniret, quo morbum  
 suum fugare posset. Incidit in Phu Dioscoridis,  
 quod Valerianam officinalem significare credidit  
 (*phytobaf.* 97.) eaque a morbo per aliquod tempus  
 liberatus fuit. De ea planta postea contentio orta  
 est inter Columnam et Evangelistam Quatramium  
 (*ecphraf.* 1, 210.), ubi noster defendit suam sen-  
 tentiam, licet a veritate alienam. Haec tamen stu-  
 dia adeo iuvenem delectarunt, ut in iis etiam aeta-  
 tem consumeret ac confenseret. Edidit enim pri-  
 mum, quum annum XXV ageret, „Phytobasanum“  
 quem Iani Planci castigatione Mediolani 1744. 4

editum coram habeo. Pingendi arte ipse Columna peritus, aeri incidi icones primus curavit, quae quidem artis initia satis speciosa palmam tamen ligneis iconibus Camerarii haudquaquam praeripiunt. Quum postea Aeqnicolorum iudex et proprinceps nominatus esset, otium omne in Campoclarensum montibus et Apuliae campis plantarum feracissimis consumpsit; multo curatius, Gesneri et Caesalpini exemplo accensus, ad partes essentielles consilium transferre didicit; immensam rariorum vegetabilium copiam collegit, quarum praecipuas et novas in „Ecphrasi stirpium“ tom. 1. 2. Rom. 1616. 4. descripsit ac delineavit. Eodem fere tempore Io. Bapt. Portae successor, seu prof. Neapolitanus vocatus fuit, fractus autem paene viribus ac animum despondens vitam protraxit ad annum usque 1640. ubi vivere desit.

Quum de veterum plantis agerem, saepius iam Columnam citavi, unde patet, eum operam praepimis dedisse, ut Dioscoridem et Theophrastum explicaret, haud satis felix initio: namque in phytobasano pluries labitur, sibi quae ipse contradicit. Multo maturius ac vere eximium opus est ecphrasis, quae climatis florae perquam faventis plantas innumeras fere continet, quae nec antea nec etiam post studiosius observatae fuerunt. Indicem adiungo plantarum novarum aut Columnae peculiarium:

Circaea alpina (*minima ecphr.* 2, 80.).

#### 440 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*Veronica montana* (*Alyssum montanum* *ecphr.* 1, 288.).

*Fedia echinata* (*Valerianella* *ecphr.* 1, 206.).

*F. coronata* (*femine scabiosae* *ib.* 209.); *F. dentata* (*altera* *ib.*).

*Scabiosa palaeftina* (*Phyteuma minus phytob.* t. 22.). . . *Sherardia muralis* (*Asperula* *ecphr.* 1, 300.). . . *Asperula cynanchica* (*Galium τετραφύλλον* 1, 297.). . . *Valantia muralis* (*Cruciata* *ib.*).  
*Plantago Serraria* (*pilosa laciniata apula*, *ecphr.* 1, 259.).

*Lithospermum apulum* (*Echioides lutea minima*, *ecphr.* 1, 185.). . . *Cynoglossum apenninum* (*ecphr.* 1, 170.). *C. Columnae mihi* (*ib.* 178.). . .  
*Aretia Vitaliana* (*Sedum alpinum* 1. *ecphr.* 2, 65.). . .  
*Androsace carnea* (*Sed. alpin.* 11. *ib.*). . . *Campanula graminifolia* (*Trachelium montanum phytob.* t. 34.). . .  
*Phyteuma orbiculare* (*Rapuntium corniculatum*, *ecphr.* 1, 224.). . . *Chironia maritima* (*Centaureum luteum novum*, *ecphr.* 2, 77.). . .  
*Gentiana ciliata* (*Gentianella coerulea fimbriata*, *ecphr.* 1, 221.). *G. utriculosa* (*altera coer. cordata*, *ib.*). . . *Bupleurum tenuissimum* (*minimum*, *ecphr.* 1, 247.). . .  
*Echinophora tenuifolia* (*Pastinaca echinophora*, *ecphr.* 1, 101.). . .  
*Tordylium apulum* (*ib.* 124.). . . *Caucalis latifolia* (*Echinophora* 14. *ecphr.* 1, 97.). *C. platycarpus* (*Echinophora πλατύκαρπος*, *ib.* 94.). . . *Dan-*

## INVENTORUM. COLUMNA, 441

eus muricatus (*Echin. πυρρὸς*, *ib.*). . . La-  
serpitium hirsutum (*Panax Asclepium apulum*,  
*ecphr.* 1, 86.).

Allium pallens (*Gethyoides sylvestre*, *ecphr.* 2,  
7.). . . A. Chamaemoly (1, 326.). . . Rumex  
bucephalophorus (*Acetosa*, *ecphr.* 1, 150.).

Saxifraga bryoides (*Sedum alpinum* iv. *ecphr.*  
2, 67.). S. androfacea (iii. *ib.*). S. bulbifera  
(*ecphr.* 1, 317.). . . Saponaria bellidifolia (*Glo-*  
*bularia lutea montana*, *ecphr.* 1, 153.). . . Se-  
dum stellatum (*Sempervivum* iii. *phytob.* t. 11.).  
. . Ceraftium repens (*Oximoides Lychnitis phytob.*  
t. 31.).

Agrimonia Agrimonoides (*ecphr.* 1, 144.). . .  
Refeda Phyteuma (*Eruca* *apula*, *ecphr.* 1, 269.).  
. . Euphorbia Epithymoides (*Tithymalus*, *ecphr.*  
2, 51.). E. sylvatica (*lunato flore*, *ib.* 57.). . .  
Sempervivum arachnoideum (*ecphr.* 1, 291.).

Ranunculus chaerophyllus (*montanus leptop-*  
*hyllus*, *ecphr.* 1, 311.). R. parvulus (*minimus*  
*apulus* 316.).

Teuerium Pseudhyssopus (*Hyssopus apulus*,  
*ecphr.* 1, 67.). . . Sideritis montana (*ecphr.* 1,  
196.). . . Scutellaria Columnae (*Cassida*, *ecphr.*  
1, 189.). . . Rhinanthus Elephas (*ecphr.* 1, 188.).  
R. Trixago (*ib.* 197.). . . Euphrasia latifolia (*ec-*  
*phr.* 1, 202.). . . Tozzia alpina (*Anonyma S. Gre-*  
*gorii*, *ecphr.* 2, 50.).

#### 442 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*Lepidium petraeum* (*Cardamine pufilla faxatilis*, *ecphr.* 1, 273.). . . *Draba muralis* (*ib.* 272.). . . *Thlaspi perfoliatum* (*ib.* 276.). *T. faxatile* (*Ionthlaspi montanum* 277.). . . *Alyffum deltoideum* (*Litoreo-leucoium supinum*, *ecphr.* 1, 284.). . . *Biscutella auriculata* (*Leucoium montanum flore pedato*, *ecphr.* 2, 61.). *B. apula* (*Iondraba apula*, *ecphr.* 1, 285.). *B. laevigata* (*Leucoium alyffoides*, *ib.*). . . *Sifymbrium Irio* (*ecphr.* 1, 265.). *S. Columnae* (*Rapistrum fylvestre*, *ib.* 268.).

*Erodium ciconium* (*Geranium apulum* *ecphr.* 1, 235.).

*Spartium radiatum* (*ecphr.* 1, 290.). *Ononis Columnae* (*ecphr.* 1, 301.). . . *Orobis vernus* (*Astragalus phytob. t.* 14.). . . *Hippocrepis comosa* (*Ferrum equinum capitatum*, *ecphr.* 1, 301.). . . *Astragalus sesameus* (*Vicia sesamea apula*, *ib.*).

*Hypericum hirsutum* (*Androsaeum*, *ecphr.* 1, 74.). *H. montanum* (*ib.*).

*Geropogon hirsutus* (*Tragopogon*, *ecphr.* 1, 231.). . . *Tragopogon crocifolius* (*ib.* 230.). . . *Scorzonera hirsuta* (*Tragopogon apulum*, *ib.* 233.). . . *Prenanthes viminea* (*Chondrilla viscosa*, *ecphr.* 1, 240.). *P. hieracifolia* (*Hieracium leptomacrocaulon* 1, 249.). . . *Thrinicia hirta* (*Hieracium montanum faxatile*, *ecphr.* 1, 243.). . . *Hieracium cymosum* (*Pilosella macrocaulos*, *ec-*

*phr.* 1, 249.). *H. aurantiacum* (*germanicum* 1, *ecphr.* 2, 30.). . . *Crepis scariosa* (*Cichorium pratense vesicarium*, *ecphr.* 1, 257.). *Tolpis barbata* (*Hieracium calyce barbato*, *ecphr.* 2, 27.). . . *Lapsana foetida* (*Hieracium* III, *ecphr.* 2, 31.). . . *Carlina lanata* (*Acanthoides*, *ecphr.* 1, 27.). *C. corymbosa* (*Acarna apula umbellata*, *ib.*). . . *Artemisia coerulescens* (*Abfinthium latifolium*, *ecphr.* 2, 76.). . . *Carpesium cernuum* (*Aster*, *ecphr.* 1, 252.). . . *Anthemis montana* (*Abfinthium montanum phytob.* t. 33.). . . *Helianthus tuberosus* (*Flos solis Farnefianus*, *ecphr.* 2, 13.). . . *Centaurea Crupina* (*Senecio-Carduus apulus*, *ecphr.* 1, 34.). *C. solstitialis* (*Spina solstitialis mitior*, *ecphr.* 1, 31.). *C. centauroides* (*Iacea laevis maxima*, *ecphr.* 1, 35.).

*Orchis anthropophora* (*ecphr.* 1, 320.). *O. tephrosanthes* (*cercopithecophora*, *ib.*). . . *Serapias Lingua* (*Orchis macrophylla*, *ecphr.* 1, 322.).

\* \* \*

Systematicum transire nequeo, qui naturalem Lebelii methodum ulterius elaborare studuit, Adamum ZALUZANIUM a ZALUZANIIS, Bohemum, cuius „Methodus herbaria libr. 5.“ Frkf. 1604. 4. coram est. De sexu plantarum c. 24. longe aliam ac priores profert sententiam: plurimas enim hermaphroditas esse et androgynas, nonnullas vero sexum separatum habere. *Ligulam ap-*



#### 444 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

pellat filamentum, *apicem* antheram: *stamen* autem pistillum. Familias naturales ordine satis congruo percurrit, ab imperfectis ordiens: Fungos, Muscos, Lichenes, Gramina, Scitamina, Lilia, Hyacinthos, post eos Orchides tractat, quas memorabili elencho complectitur: Orchides enim sunt:

1. Satyria legitima, nobis minus nota, Monorchides, quorsum Erythronium et Hyacinthus orientalis.
2. Cynosorchides, polydactylae.
  - a. Oreades, folio laevi et maculoso (*Orchis maculata*).
  - b. Nereides, palustres.
    - α. folio acuto, laeves et maculosae.
    - β. folio lato et lacinioso.
3. Serapiades, rotundis testibus.
  - a. Duobus (*Orchis variegata, militaris: Ophrys myodes etc.*).
  - b. Tribus aut quatuor.
4. Mediae, Dactylides.

Sequuntur Leguminosae, quibus et Rutam et Sesamum adnumerat: Ferulaceae, inter quas Umbelliferae, Filices, Artemisia, Filipendula: Compositae: tum congeries quaedam, ubi Sempervivum cum Plantagine, Rheum cum Oxalide coniungit. Ranaceae plantae dicuntur Aroideae, et Caltha et Ranunculus Thora etc.

\* \* \*

Claudent agmen „fratrum Bauhinorum fydera lucida“, quorum tot tantaque sunt in promovenda et perficienda re herbaria merita, ut ab uno fere Linnaeo superentur. Basileae, patre Ioanne medico, natus uterque, alter natu maior Ioannes anno 1541, minor alter Casparus 1550. Ioannes a Fuchio primum, dein a Conr. Gesnero hausit disciplinam, huius comes indefessus in itineribus helveticis. Post Galliam Narbonensem, Italiam ipsam, Alsatiam totam et sylvam Martiam peragravit, Ebroduni per aliquod tempus commoratus est, donec Basileam 1566 vocaretur; quatuor vero post annos princeps Montisbeligardenfis medicum sibi eum elegit, Montebeligardi etiam denatus est 1613.

Edidit is primum „historiam admirabilis fontis et balnei Bollenfis“, Montebelig. 1598. 4. cuius liber quartus, seorsim editus, stirpes plerasque in vicinis montibus et sylvis provenientes tractat. Inter eas paucae quidem novae, ut Peplis Portula (*Alfine minima* p. 194.), Alnus incana p. 144. etc., quae redeunt in historia plantarum. Molitus enim erat ab ineunte aetate vir doctissimus et studiosissimus ingens opus, Gesneriani aemulum, in quo colligere ex omnibus auctoribus, quaecunque innotuerant, melius describere, icones repetere et synonyma diiudicare fategit. Prodrum eius operis, in quo a Io. Henr. Cherlero genero adiutus fuerat, posthumum editum habemus Ebrodun. 1619. 4., ubi classes na-

#### 448 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*pitio Lobelii similis angustifolia* 3, 137.). . . *Sefeli glaucum* (*Daucus glauco folio* 3, 16.).

*Scilla unifolia* (*Bulbus monophyllus flore albo* 2, 622.). . . *Calamus Zalacca* (*Baly insulae fructus* 1, 401.). . . *Iuncus acutus* (*pungens* 2, 520.).  
*I. maximus* (*Gramen Luzulae maximum* 2, 493.).  
*I. capitatus* (*foliatus minimus* 2, 523.). . . *Rumex pulcher* (*Lapathum pulcrum bononiense* 2, 988.). *R. Lunaria* (594.).

*Andromeda polifolia* (*Viti idaeae adfinis polifolia* 1, 527.). . . *Saxifraga stellaris et cuneifolia* (*Cotyledon altera* 3, 684.). *S. moschata* Wulf. (*Tridactylites alpina* 3, 762.). *S. aspera* (*Sedum alpinum hispidum* 3, 695.). . . *Arenaria trinervia* (*Alfine plantaginis folio* 3, 364.). *A. tenuifolia* (*Alfine, ib.*). *A. striata* (*Auricula muris pulcro flore* 3, 360.). . . *Sedum saxatile* (*luteum minimum non acre* 3, 695.).

*Lythrum Thymifolia* (*Hyssopifolia minor* 3, 792.).

*Prunus semperflorens* (*Cerasus racemosa* 1, 223.). . . *Pyrus Pollveria* (1, 59. A patria Pollwiler Alfatiae dicta.) *P. dioica* (*Malus non florida* 1, 21.). . . *Rosa tomentosa* Smith. (2, 44.).

*Cistus nummularius* (2, 20.). *C. samplicifolius* (*ib.*). ? *C. glutinosus* (*thymi folio incano* 2, 19.). . . *Ranunculus plantagineus* (*angustifolius bulbosus* 3, 866.). *R. pyrenaeus* (*pumilus gra-*

*minets foliis, ib.*). *R. glacialis* (3, 861.). *R. montanus* (*minimus alpinus luteus ib.*).

*Teucrium Marum* (3, 243.). . . *Nepeta nuda* (*Mentha Cataria hispanica* 3, 226.). . . *Sideritis romana* (*Sideritis genus spinosis verticillis* 3, 428.). . . *Ocimum monachorum* (3, 260.). . . *Scutellaria albida* (*teucrii facie* 3, 291.). . . *Antirrhinum Pelisserianum* (*Linaria coerulea calcarius longis* 3, 461.).

*Thlaspi peregrinum* (2, 927.). *T. alliaceum* (*folio alliariae* 2, 932.). . . *Sisymbrium obtusangulum* (*Eruca inodora* 2, 862.). . . *Cheiranthus maritimus* (*Leucoium* 2, 877.).

*Spartium purgans* (1, 404.). . . *Genista sylvestris* (*Genistella montis ventosi spinoza* 1, 400.). . . *Ononis Cherleri* (2, 394.). . . *Orobus canescens* (*Araci vel Apios leguminosae species* 2, 326.). . . *Lathyrus sylvestris* (*maior narbonensis* 2, 304.). *L. hirsutus* (2, 305.). *L. Nissolia* (*Catananche leguminosa* 2, 309.). . . *Vicia platycarpus* (*Aracus fabaceus* 2, 286.). . . *Cytisus biflorus* (*glaber, filiqua angusta* 1, 373.). *Coronilla iuncea* (*Colutea caule genistae fungoso* 1, 383.). *Astragalus monspessulanus* (2, 338.). *Trifolium tomentosum* (2, 379.). *T. resupinatum* (*folliculaceum ib.*). *Lotus angustissimus* (2, 356.). . . *Medicago coronata* (2, 386.). *M. tuberculata* (*magna turbinata* 2, 385.). *M. turbinata* (*scu-*

450 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*tellata* 2, 384.). *M. rigidula* (*hirsuta*, *echinis rigidioribus* 2, 385.).

*Lactuca angustana* (*longo et angusto folio* 2, 999.). *Hieracium staticae-folium* (*Chondrilla folio non dissecto* 2, 1041.). . . *Crepis Sprengiana* (*Hieracium pulcrum ramosum* 2, 1026.). *Rhagadiolus edulis* (*Hierac. stellatum* 2, 1014.). *Carduus crispus* (3, 159.). *C. tenuiflorus* Sm. (*acanthoides* 3, 56.). *Cnicus canus* (*Cirsium tomentosum* 3, 44.). *C. ferox* (*Carduus lanceolatus ferocior* 3, 58.). *Conyza ficula* (*foliis virgaureae* 2, 1049.). *Inula spiraeaefolia* (*Conyzae mediae monspel. adfinis* 2, 1049.). *Senecio nemorensis* (*Virgaurea latifolia* 2, 1063.). *S. aquaticus* (*Iacobaea latifolia* 2, 1057.). *Cotula aurea* (*Chamaemelum aureum* 3, 119.). *Anthemis repanda* (*Chrysanthemum latifolium* 3, 105.). *Achillea herba rota* (3, 144.). *A. nana* (*Millefolium alpinum* 3, 138.). *Centaurea galactites* (*Carduus* 3, 54.). *C. nigrescens* (3, 28.).

*Epipactis cordata* (*Bifolium minimum* 3, 534.). *Caulinia fragilis* et *Naias monosperma* Willd. (*Fluvialis pisana* 3, 779.).

*Salix Amaniana* Willd. (*latifolia non hirsuta* 1, 216.). *S. arbutifolia* (*pumila folio utrinque glabro* 1, 217.). *S. reticulata* (*pumila folio rotundo ib.*).

Asplenium Trichomanes ramosum (3, 755.).  
 Pteris crispa (*Adiantum album tenuifolium* 3,  
 743.). . . Aspidium spinulosum Sm. (*Filix te-  
 nuissime secta* 3, 739.).

Fucus salicifolius Gmel. (*Salix marina* 3, 805.).  
 Fuc. Erica marina (3, -99.). Ulva Linza (3, 789.).

Eius operis compendium edidit Domin. Cha-  
 braeus „sciagraphiae“ titulo Genev. 1677. fol. ubi  
 p. 389. Selinum Chabraei nomine Carvifoliae pri-  
 mum occurrit.

---

Fratre multo superior et divitiis herbariis et  
 amicorum liberalitate et egregii pictoris arte fuit  
 natu minor Casparus BAUHINUS. Is Italiae mon-  
 tes, agros et hortos multo diligentius perscrutatus  
 erat, adierat Monspelium et Galliam narbonensem;  
 Helvetiae alpes et Germaniae feracissimas regiones  
 bene cognovit; redux iuvenis disciplinae graecae  
 et anatomiae, denique botanicae etiam provinciam  
 in academia Basileensi suscepit († 1624.).

Commercium aluit assiduum et summe pro-  
 ficuum cum fratre, cum Nic. Agerio, prof. Argen-  
 tinenfi, Ferr. Imperato Neapolitano, Honor. Bello  
 Cretenfi, Franc. Pona Veronenfi, cum Ioach. Bur-  
 fero Camentia-Lufato, qui per totam fere Euro-  
 pam peregrinatus erat, \*) cum Io. Fleisiero Vra-

\*) Burferus, deim in Academia Sorana stationem obtinuit,  
 reliquit autem vigintiquinque volumina plantarum sicca,

## 2452 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

tislaviensi, Iac. Albino Hamburgensi, Iacobo Cargillo Scoto, Fabio Columna, Basil. Beslero Noribergensi, Vespasiano Robino. Parifino, multisque aliis. Notandum vero, patriam plantarum non rite indigitari. E Brasilia enim et Topinambutorum regione derivat, quae ex America boreali sunt.

Immenfum opus et immortale moliebatur, omnium, quotquot innotuerant, plantarum collationem et in certos quosdam ordines digestionem: hactenus diversum a fratris opere, ut multo curatius ne ullum quidem omittere scriptorem vellet. Eius operis prodromum exhibuit in „phytopinace, s. enumeratione plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptarum“, Basil. 1596. 4. cum figuris 8 et descriptionibus 160 plantarum novarum, quae redeunt in „prodrómo theatri botanici“, Frcf. 1620. 4. et in editione Matthioli, quam citavimus, et in „theatri botanici parte prima,“ quam posthumam filius Io. Caspar, Basil. 1658. fol. edidit. Prodrómus ducentas fere et quinquaginta novas continet plantas cum iconibus ligno incisís iisque praestantissimis: theatrum erat initium magni operis et absolutissimi, quod ad ordines naturales plantas omnes complecti

tarum, quae, e dono Coijet ad academiam Upsaliensem transierunt, ubi tria volumina magno incendio 1703. perierunt. In cineres reductae etiam sunt tabulae, quas ex thesauro paraverant Rudbekii. Linnaeus tandem rariores stirpes huius herbarii determinavit (*Amoen. acad.* 2, 144. f.).

debat. Sed praematura morte interceptum fuit: pars haec prima nil continet nisi gramina, cyperoidaeas et liliaceas. Tandem edidit „Pinacem theatri botanici“, Basil. 1623. 4. indicem locupletissimum synonymorum fere omnium, quae apud maiores ipsius occurrunt. Non negandum, multa praestitisse doctissimum virum, neque tamen exhaust omnes literaturae botanicae fontes, neque, quos novit, ubique bene exposuit, cum characterum vera sedes nondum innotesceret. Summo autem botanicorum commodo is liber inservit: namque ex eo inde tempore multo facilius fuit, plantas determinare, synonymis collatis et recensitis. Primus etiam „catalogum plantarum circa Basileam nascentium“, Basil. 1671. 8. ditissimum dedit.

Ut autem innotescant plantae, quas Caspar detexit ac descripsit, ordine systematico eas tractemus:

Blitum capitatum (*Atriplex sylv. lappulas habens, ad Matth. 365.*) . . . Syringa perfica (*Ligustrum II, prodr. 158.*) . . . Veronica bellidioides (*prodr. 116.*) . . . V. scutellata (*Anagallis aquatica, ib. 119.*) . . . Salvia syriaca (*Horminum prodr. 114.*) . . . S. grandiflora (*1, prodr. 113.*).

Valeriana Tripteris (*alpina prima, prodr. 86.*) . . . V. montana (*alpina profulariae folio, ib. 87.*) . . . Fedia Cornucopiae (*Valeriana peregrina phytop. p. 293. t. 1. prodr. 87.*) . . . Cladium germanicum Schrad. (*Cyperus longus inodorus theatr.*



#### 454 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

221.). *Schoenus mucronatus* (*Gramen cyperoides maritimum*, *theatr.* 91.). . . *Scirpus caespitosus* (*Gramen iunceum, foliis et spica iunci minus*, *theatr.* 79.). *Sc. acicularis* (*Iuncus inutilus*, *ib.* 183.). *Sc. lacustris* (*Iuncus maximus*, *ib.* 178.). *Sc. Holoschoenus* (*Iuncus acutus maritimus*, *ib.* 174.). *Sc. triqueter* (*Iunc. acut. marit. caule triangulo*, *ib.* 175. *prodr.* 22.). *Sc. fluitans* (*Iuncellus* 27. *prodr.* 23.). . . *Eriophorum caespitosum* *Host.* (*Iuncus alpinus capitulo lanuginoso*, *theatr.* 188. *prodr.* 23.). *E. latifolium* (*Gramen tomentosum pratense panicula sparsa*, *ib.* 61.). . . *Alopecurus agrestis* (*Gramen typhoides spica angustiore*, *theatr.* 53.). . . *Phleum pratense* (*Gramen typhoides maximum*, *theatr.* 49.). . . *Aira caryophyllea* (*Caryophyllus* xi, *prodr.* 105.). . . *Andropogon distachyos* (*Festuca iunceo folio*, *prodr.* 19.). *A. Gryllus* (*Festuca dumetorum*, *theatr.* 149.). *A. Ravennae* (*Gramen plumosum album*, *prodr.* 14.). . . *Holcus lanatus* (*Gramen pratense paniculatum*, *theatr.* 27.). . . *Arando epigeios* (*Gramen arundinaceum spicatum*, *theatr.* 94.). . . *Polypogon monspeliensis* (*Gramen alopecuroides*, *theatr.* 58.). . . *Lagurus ovatus* (*Gramen alopecuros spica rotundiore*, *ib.* 56.). . . *Sesleria coerulea* (*Gramen spica varia*, *theatr.* 158.). *S. echinata* (*Gramen spica subrotunda echinata*, *prodr.* 16.). . . *Poa compressa*

(*Gramen* v, *prodr.* 2.). *P. bulbosa* (*Gramen arvense panicula crispa*, *prodr.* 6.). . . *Cynosurus cristatus* (*Gramen pratense*, *prodr.* 8.). *C. echinatus* (*Gramen alopecuroides, spica aspera, theatr.* 59.). . . *Briza maxima* (*prodr.* 5.). . . *Bromus velutinus* Schrad. (*Festuca graminea glumis hirsutis, theatr.* 143.). . . *Triticum rigidum* Schrad. (*Gramen angustifolium spica tritici muticae simili, prodr.* 17.). *T. pinnatum mihi* (*Gramen spica brizae maius, ib.* 18.).

*Globularia spinosa* (*Bellis spinosa coerulea, prodr.* 121.). . . *Scabiosa graminifolia* (*argentea angusto fol. phytopin.* 528. t. 4. *prodr.* 127.). . . *Asperula pyrenaica* (*Rubia* VIII, *prodr.* 146.). *A. laevigata* (*Rubia* III, *ib.* 145.). . . *Galium pusillum* (*Rubeola* VI, *prodr.* 145.). *G. glaucum* (*Rubia* I, *ib.*). *G. boreale* (*Rubia* II, *ib.*). . . *Valantia glabra* (*Galium latifolium glabrum, prodr.* 146.). . . *Crucianella spicata* (*Rubia* IV, *prodr.* 145.). . . *Cornus canadensis* (*Pyrola alfinis folio brasiliiana, prodr.* 101.). . . *Alchemilla pentaphylla* (*prodr.* 138.). . . *Potamogeton peetinatus* (II, *prodr.* 101.). *P. setaceus* (I, *ib.*). *P. pusillus* (III, *ib.*). . . *Ruppia maritima* (*Gramen maritimum fluitans cornutum, theatr.* 41.).

*Pulmonaria suffruticosa* (*Lithospermum angustifolium umbellatum, pin.* 521.). . . *Lyfimachia*  
*Linum stellatum* (*Linum* III, *prodr.* 107.). . .

## 456 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*Anagallis tenella* (*Nummularia purpurascens*  
*flore, prodr. 136.*) . . *Convolvulus copticus* (III,  
*prodr. 134.*) . *C. tricolor* (II, *ib.*) . . *Campanula*  
*stylosa Lam. (foliis subrotundis, prodr. 35.)*.  
*C. caespitosa Scop. (v, ib. 34.)*. *C. barbata (fo-*  
*liis echii floribus villosis, prodr. 36.)* . . *Lobelia*  
*urens (Draba II, prodr. 53.)* . . *Mirabilis dictio-*  
*toma (Solanum IV, prodr. 91.)* . . *Chironia spi-*  
*cata (Centaureum minus spicatum, prodr. 130.)*.  
 . . *Rhamnus alpinus (Frangula altera, prodr.*  
*160.)* . . *Ribes alpinum (montana, ib.)* . . *Her-*  
*niaria lenticulata (Polygonum IV, prodr. 131.)* . .  
*Chenopodium ambrosioides (Botrys ambrosioides*  
*mexicana pin. 520.)* . . *Velezia rigida (Lychnis*  
*II, prodr. 103.)* . . *Afrantia minor (Hellebo-*  
*rus niger saniculæ folio, prodr. 97.)* . . *Bupleu-*  
*rum stellatum (Perfoliata III, prodr. 129.)*. *B.*  
*petraeum (Perf. IV, ib.)*. *B. angulosum (II, ib.)*.  
*B. ranunculoides (v, ib.)* . . *Caucalis nodosa*  
*(prodr. 80.)* . . *Cachrys ficula (Hippomarathrum*  
*creticum, prodr. 76.)* . . *Laserpitium aquilegifo-*  
*lium (Libanotis I, prodr. 83.)* . . *Heracleum*  
*angustifolium (Sphondylium I, ib.)*. *H. austria-*  
*cum (II, ib.)*. *H. alpinum (III, ib.)* . . *Sese-*  
*li pyrenaicum (Carvi alpinum, prodr. 84.)* . . *Rhus*  
*typhinum (virginianum pin. 517.)*. *Rhus gla-*  
*brum (Sumach angustifolium, prodr. 158.)* . .  
*Corrigiola litoralis (Polygonum III, prodr. 131.)*.

. *Statice cordata* (*Limonium* I, *prodr.* 99.). *St. minuta* (II, *ib.*). . . *Linum viscosum* (VI, *pin.* 214.). *L. narbonense* (II, *prodr.* 107.). . . *Craffula rubens* (*Sedum* VI, *prodr.* 132.). . . *Sibbaldia procumbens* (*Fragariae adfinis*, *prodr.* 139.).

• *Tradescantia virginica* (*Allium* f. *Moly virgin.* *pin.* 516.). . . *Uvularia perfoliata* (*Polygonatum* II, *prodr.* 136.). . . *Iuncus glaucus* (*acumine reflexo maior*, *theatr.* 183.). *I. trifidus* (*acumine reflexo trifidus*, *ib.* 184.). *I. albidus* (*Gramen* XLVII, *prodr.* 16.). *I. triglumis* (II, *prodr.* 22.). . . *Frankenia hirsuta* (*Polygonum* II, *prodr.* 131.). . . *Rumex vesicarius* (*Acetosa*, I, *prodr.* 54.). *R. tingitanus* (*Lapathum maritimum*, *prodr.* 56.). *R. digynus* (*Acetosa* II, *prodr.* 55.). *R. spinosus* (*Beta cretica* 57.). *R. aculeatus* (*Acetosa* IV, *prodr.* 55.). . . *Scheuchzeria palustris* (*Iuncus* IX, *prodr.* 23.). . . *Trillium erectum* (*Solanum* III, *prodr.* 91.).

• *Epilobium angustissimum* (*Lyfimachia* III. *pr.* 116.). *E. parviflorum* (*Lyfimachia* I. *ib.*). . . *Daphne Thymelaea* (*Sanamunda viridis* *pr.* 160.). . . *Elatine Alfinastrum* (*Equisetum* I. *pr.* 24.). . . *Monotropa Hypopitys* (*Orobanche* III. *pr.* 31.). . . *Saxifraga Cotyledon* (*Cotyledon minor*. *pr.* 133.). *S. oppositifolia* (*Sedum* III. *pr.* 132.). *S. petraea* Vahl. (I. I. *pr.* 131.). *S. caespitosa* (II. *ib.*). . . *Dianthus sylvestris* (*Caryophyllus* III. *pr.* 104.).

# 458 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

*D. arborescens* (i. *ib.*). . . *Silene rupestris* (*Caryophyllus* vii. *ib.*). . . *Arenaria tetraquetra* (*Caryophyllus* xii. *ib.* 105.). *A. juniperina* (*Alfine* iv. *ib.* 118.). . . *Sedum atratum* (vii. *ib.* 132.). . . *Cerastium latifolium* (*Caryophyllus* iv. *ib.* 104.). *C. tomentosum* (*Caryophyllus* ix. *ib.*). . . *Spergula nodosa* (*Alfine* viii. *ib.* 118.).

*Euphorbia rubra* (*Tithymalus* iii. *ib.* 133.).

*Spiraea hypericifolia* (*Pruno sylv. similis* pia. 517.). . . *Potentilla intermedia* (*Quinquefolium* iii. *pr.* 139.). *P. caulescens* (i. *ib.*).

*Papaver alpinum* (*Argemone alpina* *pr.* 93.).

*P. cambricum* (*erraticum pyrenaicum* *ib.* 92.).

. . . *Delphinium peregrinum* (*Consolida regalis latifolia* *pr.* 74.). . . *Aquilegia viscosa* (ii. *ib.* 75.).

*A. alpina* (i. *ib.*). . . *Nigella hispanica* (i. *ib.*).

*N. orientalis* (ii. *ib.*). . . *Anemone patens* (*Pulsatilla* v. *pr.* 94.).

*A. vernalis* (iv. *ib.*). *A. baldensis* (ii. *ib.*). . . *Clematis maritima* (*pr.* 135.). . .

*Thalictrum angustifolium* (*pr.* 146.). *T. foetidum* (*ib.* 147.). . . *Ranunculus lanuginosus* (vii. *pr.* 96.).

. . . *Isopyrum aquilegioides* (*Aquilegia* ii. *pr.* 75.).

*Teucrium spinosum* (*Chamaedrys spinosa* *pr.* 117.). . .

*Stachys cretica* (*Pseudostachys* i. *pr.* 113.). *St. arvensis* (*Sideritis* ii. *pr.* 111.). . .

*Scutellaria alpina* (*Teucrium alpinum inodorum* *pr.* 116.). . . *Melampyrum cristatum* (*luteum* *pr.*

112.). . . *Antirrhinum monspeffulanum* (iv. pr. 106.). *A. arvense* (v. 107.). *A. organifolium* (*Antirrhinum saxatile* 106.). *A. dalmaticum* (i. ib.). *A. linifolium* (ii. ib.). . . *Scrofularia vernalis* (i. pr. 112.). . . *Linnaea borealis* (*Camp-nula serpyllifolia* pr. 35.).

*Myagrum perenne* (*Rapistrum monospermum* pr. 37.). *M. perfoliatum* (iv. 52.). *M. paniculatum* (iii. ib.). . . *Bunices Erucago* (*Eruca* vii. pr. 41.). . . *Draba stellata* (*Bursa pastoris* iii. pr. 51.). . . *Thlaspi hirtum* (iii. pr. 47.). . . *Alyfsum montanum* (*Thlaspi* vii. pr. 49.). . . *Cardamine resedaefolia* (*Nasturtium* iv. pr. 45.). *C. parviflora* (ii. 44.). . . *Silymbrium terrestre* (*Raphanus aquaticus fol. laciniat.* pr. 38.). *S. amphibium* (*alter ib.*). *S. arenosum* (*Eruca* v. 40.). *S. asperum* (*Sinapi parvum filiqua aspera* 41.). . . *Erysimum hieracifolium* (*Leucoium* iii. pr. 102.). . . *Cheiranthus trilobus* (*Leucoium* vi. pr. 105.). . . *Helperis verna* (*Rapistrum* i. pr. 37.). . . *Arabis Halleri* (*Nasturtium* vii. pr. 46.). . . *Turritis hirsuta* (*Eryfimo similis hirsuta* pr. 42.).

*Lavatera trimestris* (*Malva* ii. pr. 132.).

*Genista hispanica* (*Genistella monspeliaca spinosa* pr. 157.). . . *Orobis luteus* (*alpinus latifolius* 149.). . . *Lathyrus fetifolius* (pr. 148.). . . *Vicia onobrychioides* (pr. 149.). . . *Hedysarum Caput galli* (*Onobrychis* ii. ib.). . . *Oxytropis pi-*

#### 460 LIB. IV. CAP. V. INSTAURATIO

lofa Decand. (*Cicer* II. 148.). . . *Astragalus incanus* (*Onobrychis* III. 149.). *A. exscapus* (*Cicer* I. 147.). . . *Trifolium creticum* (xiv. pr. 14.).  
*T. Cherleri* (xviii. 143.). *T. saxatile* (vii. 140.).  
*T. scabrum* (viii. *ib.*). *T. spumofum* (iv. *ib.*).  
*T. lappaceum* (*phytopin. t. 5.*). *T. spadiceum* (III. pr. 140.). . . *Lotus diffusus* (*Trifolium* xxi. pr. 144.). . . *Medicago orbicularis* (*Trifolium* ix. pr. 140.).

*Hypericum Ascyrum* (pr. 130.). *H. nummularium* (*ib.*).

*Arnopogon picroides* (*Sonchus* I. pr. 60.). . .  
*Sonchus maritimus* (iv. pr. 61.). *S. tenerimus* (III. *ib.*). . . *Lactuca faligna* (*Chondrilla* II. pr. 68.). . . *Hieracium florentinum* (xxii. pr. 67.).  
*H. chondrilloides* (xii. 64.). *H. grandiflorum* (xvi. 65.). *H. glutinosum* (iv. 63.). . . *Crepis foetida* (*Chondrilla* xxi. pr. 68.). . . *Andryala cheiranthifolia* (*Sonchus* vi. pr. 61.). . . *Hyoseris radiata* (*Dens leonis* III. pr. 62.). . . *Hypochoeris helvetica* (*Dens leonis* I. *ib.*). . . *Carduus Perso-nata* (I. pr. 155.). . . *Artemisia glacialis* (*Ab-sinthium* III. pr. 71.). . . *Gnaphalium orientale* (*Helichryson* pr. 123. . . *Conyza saxatilis* (*Helichryso sylv. similis* *ib.*). . . *Erigeron alpinum* (*Conyza* I. pr. 124.). . . *Senecio linifolius* (*Linariae aureae adfinis* pr. 107.). . . *Aster alpinus* (pr. 124. *ad Matthiol.* 818.). . . *Solidago mexicana*

(pin. 517.). . . *Cineraria cordifolia* (*Iacobaea alpina* pr. 69.). . . *Inula britannica* (*Conyza* III. pr. 124.). *I. provincialis* (*Iacobaea* II. pr. 69.). . . *Chrysanthemum atratum* (*Bellis* I. pr. 120.). . . *Pyrethrum Halleri* (*Bellis* II. *ib.*). . . *Anthemis mixta* (*Bellis* v. 121.). *A. altissima* (*Chamaemelum* I. 70.). . . *Achillea magna* (*Millefolium* I. 72.). *A. tanacetifolia* (II. *ib.*). *A. macrophylla* (*Dracunculus alpinus* pr. 39.). . . *Rudbekia laciniata* (*Doronicum americanum* pin. 516.). . . *Centaurea alpina* (pr. 56.). *C. pectinata* (*Iacea* v. pr. 128.). *C. Cineraria* (*Iacea* VII. *ib.*). *C. fonticholia* (IV. *ib.*). *C. axillaris* (II. 127.). . . *Filago pygmaea* (*Gnaphalium roseum* 122.).

*Orchis viridis* (VIII. *ib.*). . . *Ophrys alpina* (*Chamaeorchis* IV. pr. 29.).

*Zannichellia palustris* (*Potamogeton* IV. pr. 101.). . . *Chara hispida* (*Equisetum foetidum sub aqua repens* pr. 25.). *Carex baldensis* (*Gramen* XXXVI. pr. 13.). *C. digitata* (XXIII. 9.). *C. ornithopoda* (XXII. *ib.*). *C. ampullacea* (*Gramen cyperoides* IV. *theatr.* 84.). . . *Myriophyllum spicatum* (*Millefolium* IV. pr. 73.). . . *Thelygonum Cynocrambe* (pr. 59.). . . *Bryonia cretica* (pr. 135.).

*Salix herbacea* (VII. 159.). *S. retusa* (v. *ib.*).

*Aspidium aculeatum* (*Filix* II. 151.). . . *Adian-*



#### 462 LIB. IV. CAP. V. COMPILATORES.

tum pedatum (*fruticosum brasilianum* 150.). . *Salvinia natans* (*Lenticula palustris phytopin. t. 7. multo melius pr. 153.*). . . *Neckera pennata* (*Muscous* 1. 151.). *Trichostomum ericoides* (*Muscus* VII, *ib.*). *Mnium roseum*, (VIII. *ib.*). . . *Fuci* a Cargillo Scoto accepti, inter quos *F. bulbosus* Turn. (II. 154.). *F. saccharinus* (IV. *ib.*). *F. palmatus* (VI. 155.). *F. Filum* (VIII. *ib.*). *Ulva pavonia* (*Fucus* VII. *ib.*).

---

#### COMPILATORES.

Tandem, ne omisisse aliquid videamur, enumerandi sunt scriptores, qui saeculo decimo sexto aliorum labores in suos converterunt usus, neque proprii aliquid addiderunt.

Eorum primus fere est Iul. Caes. *Scaliger*, Veronensis, natus 1484. Stipendia multa iuvenis habuit, quibus confectis ad bonarum artium disciplinam et ipse artis medicae se contulit, quam dein Agenae exercuit, † 1558. Quum Hieron. *Cardanus* in libr. 21. de subtilitate, plantas novi orbis, ex Oviedo, Monarde et aliis descripserit, noster, pariter alienus ab ipsa naturae cognitione, illum refutare conatus est in libro XV. „exercitationum „exotericarum de subtilitate“ Frcf. 1582. 8. Ceteri libri non prodierunt, neque quidquam, licet celebris admodum sit, ad augendam rem herba-

## LONICER. CASTAEUS. DURANTES. 463

tiam hic contulit. In erroribus enim versatur, quoties de plantis veterum disceptat. Epithymum credit flores Thymi, Nardum indicam Crocum esse: in quo refutatur a Io. *Fabro*. disp. de Nardo et Epithymo. Rom. 1607. 4. Commentarii Scaligeri in Theophrastum de causis plantarum grammatici solummodo nequaquam rem herbariam ipsam complectuntur.

Adamus LONICER, poliater Francofurtanus, Iocero Egenolfio obtemperavit, quum antiquum herbarium, ab Euchar. Rhodione emendatum (p. 297.), et a Dorstenio commentariis auctum, iterum recuderet ac variis nuperiorum observationibus illustraret. Sic prodiit „Kräuterbuch“ Frcf. 1573. fol., quod et 1737. fol. iterum a Balth. Io. *Ehrharto* editum est; inutile opus et erroribus plurimis refertum.

Io. COSTAEUS, Laudi-Mediolanensis, Augustae Taurinorum medicinam docuit, † 1503. Adnotationes edidit in Mesuen, Venet. 1602. fol., parum utiles, quum neque arabice doctus esset, neque plantas ipsas omnes cognosceret. „De universali stirpium natura Aug. Taurin. 1578. 4.“ opus e Theophrasto potissimum haustum, peripateticas causas plantarum, absque naturae cognitione enucleat.

Castor DURANTES, Gualdo-Italus, pontificis maximi medicus, † 1599. historiam plantarum

#### 464 LIB. IV. CAP. V. COMPILATORES.

e turbidis fontibus, antiquis herbariis, Matthiolo tamen etiam, haustam edidit. „Herbario nuovo.“ Venet. 1636. 4. Ordo alphabeticus, icones fere pessimae eius aevi, meliores e Matthiolo, plurimae ex herbariis, aliae fictae; descriptiones mancae, fufissimae virtutum enumerationes. Fumaria minore p. 194. est Umbellifera, Phalaride p. 366. est Iris, repetita p. 507. sub Xiride, Phillirea ib. Oxyacantha, Zaccon d'Hierico p. 510. planta forte fictitia, Cortusa p. 148. quam potuisset e Matthiolo omnino cognoscere, est Umbellifera, Amomo p. 24. est forte Chenopodium, Ammi ib. Crucianella etc.

Io. Bapt. PORTA Neapolitanus, nat. 1545. † 1615., in patria urbe physicam docuit, miraculorum studiosus et mysticarum comparisonum, cuius documentum praeprimis est „Phytognomonica.“ Neapol. 1588. fol. A Paracelsi *ψευδοσοφία* haud longe abest, dum similitudines ubique plantarum cum animalibus earumque partibus quaerit, ac inde earum vires deducit. Nostri omnino aevi est, has nugas sapere, summamque putare sapientiam.

Marcus URZEDOWA polonicum herbarium „Herbarz Polski“ Cracov. 1595. fol. conscripsit e veteribus. Icones pleraeque e Matthiolo: nomina corrupta. Sic p. 25. Antipater est Dianthus Caryophyllus: p. 41. After atticus — Ranunculus bulbosus: p. 114. Cuminum idem ac Carum Carvi: p. 124. Filix femina loco Dryopteridis: p. 136,

Epaticus flos est Alchemilla vulgaris: p. 138. Fab-a aegyptia est Zygophyllum Fabago: p. 238. Parietaria est Melampyrum nemorosum: p. 293. Staphis agria est Bryonia. Fictitia plura, ut Levisticum p. 186. Lanaria herba p. 180. Paliurus p. 251. Sinapis p. 286. . . Rarissimum librum in Göttingensi bibliotheca vidi.

IOANN. GERARDUS, Nantvicha-Anglus, nat. 1545. † 1607. Chirurgus fuit Londini, sed praefuit etiam Burleighiano horto, ipseque Holborni hortum aluit. Edidit plantarum historiam titulo: „the herball or general historie of plantes. Lond. 1597.“ fol., quam Thom. *Johnfonius* dein novis additamentis insigniter auxit Lond. 1633. fol. Manifesto e Dodonaeo hausta, neque ipsa interpretatio Gerardum habet auctorem, sed *Priestium*, quo defuncto noster suam fecit (*Lobel. illustr. p. 100.*). Ipse Lobelius plures correxit errores, vel invito Gerardo, literarum rudi homine: icones ipsae e Tabernaemontano, qui iterum e Dodonaeo mutuo eas acceperat. Neque tamen plane alienus a peculiaribus observationibus: utile praeprimis id opus reddidit Johnfonius, primum seplasiarius, tum miles, denique medicus Oxoniensis, qui Bauhinorum ipsiusque Besleri labores adhibuit, ut perfectius redderet Gerardi opus.

Quae peculiare aut novae Gerardo emendato unt, sequuntur:

466 LIB. IV. CAP. V. COMPILATORES.

Rynchospora alba Vahl. (*Grameniunceum leucanth.* 30.). . . Panicum verticillatum (15, f. 1.).  
P. viride (17.). . . Festuca Myurus (29.). . .  
Arundo arenaria (*Spartum anglicanum* 42.). . .  
Hordeum fecalinum (29.).

Campanula latifolia (448.). C. hybrida (*Speculum veneris minus* 439.). . . Chenopodium polyspermum (325.). . . Asclepias variegata (*Vincetoxicum indicum* 100.). . . Bunium flexuosum With. (*Bulbocastanum minus* 1064.). . . Sifon fegetum (*Selinum fii folio* 1018.). . . Drosera longifolia (1556.).

Polygonum minus (*Perficaria pusilla repens* 446.). . . Arenaria peploides (*Anthyllis lentifolia* 622.). . . Rosa rubiginosa (1269.).

Mentha gracilis (680.). . . Stachys sylvatica (*Galeopsis vera* 784.). St. palustris (*Panax Coloni* 1005.). . . Scutellaria minor (*Gratiola latifolia* 581.). . . Iberis nudicaulis. (*Bursa pastoria minima* 276.). . . Trifolium maritimum (*stellatum glabrum* 1208.). T. filiforme (1186.).

Cnicus eriophorus (1152.). . . Gnaphalium minimum (*Filago minor* 641.). . . Salix aurita et acuminata (1390.).

---

INDEX I.  
VOCES HEBRAEAE.

17. אבטחים	12. הבנים
17. אכרז	14. הדם
18. ארליים	7. זיח
14. אזוב	11. הבצלה
7. אחר	10. חרק
15. אלגמים	9. חטה
18. אלה	11. חלבנה
17. 18. אלון	12. חציר
16. ארז	10. חרול
14. ארן	
15. בד	11. כמון
18. בדלח	9. כסמח
15. בויץ	12. כסר
18. בטנים	7. כרכם
12. בכא	12. 18. לבנה
12. בצלים	13. לה
16. ברוש	14. למ
12. בשם	16. לענה
11. גר	
7. גמא	14. מלוח
10. גפן	15. נעמץ
17. גפר	8. נרד
17. דודאים	14. סנה
9. דחן	
13. דרדר	15. עדשים

16. עץ השמן

18. ערבים

15. מול

17. מקעוה

11. משחה

18. יצרי

12. קרה

17. קיקיון

15. קמוש

11. 7. קנה

13. קנמין

14. קצח

12. קציעות

17. קשאים

15. רמון

18. רחם

12. שומים

11. שושנה

18. שטה

8. שעררה

13. שקר

9. שקמים

9. חאנה

16. חאשור

16. חדרר

19. חמר

13. חפוח

17. חרזה

## INDEX II.

## VOCES ARABICAE, UT ENUNCIANTUR.

Abdelavi 269.

Adchar 246.

Agalluchi 261. 271.

Aklilil almelech 267.

Akul 266.

Albahh 266.

Alvah 272.

Andschedan 253.

Aran 14.

Ardafui 261.

Aud 271.

Aumeli 268.

Azaderacht 261.

Badendschan 250.

Baderudsch 265.

Badischfan 266.

Bahman 243. 267.

Bakam 260.

Bakhah 257.

Balafan 257.

Balut 267.

Bamiah 265.

Ban 261.

Bafcham 257.

Batikh 269.

Bedeward 267.

- Bel 256.  
 Beladher 254.  
 Beliledsch 263.  
 Befabefa 272.  
 Bifch 264.  
 Bondsch 259.  
 Bonduk 261.  
 Bufiden 267.  
  
 Daffi 252.  
 Dar fchifchgan 268.  
 Deleb 244.  
 Dem alachvin 257.  
 — alifoaban 256.  
 Dend 250. 268.  
 Diudar 256.  
 Dochn 9. 246.  
 Dsal 252.  
 Dfchaus 267. allaki 250. hap-  
 dem 263.  
 Dfchebalahenkh 252.  
 Dfchedowar 241.  
 Dfchommeis 244.  
 Dum 272.  
 Durrah 246.  
  
 Emledsch 267.  
 Esfaunedsch 270.  
  
 Fagarah 247.  
 Fakilafus 248.  
 Faufel 269.  
 1 268.  
 1 244.  
 dfchemofchkh 265.

- Gabriah 251.  
 Garb 270.  
 Gufchnah 273.  
  
 Heliledsch 262.  
 Hhab al kelkel 260.  
 Hhadak 10. 250.  
 Hhaltits 253.  
 Hhamamah 247.  
 Hhandakuk 267.  
 Hhantal 269.  
 Hharmal 263.  
 Hhafchifch 279.  
 Hhatsmi 265.  
 Hhelaf 279.  
 Hhennah 268.  
 Hhornang 257.  
  
 Iabruhh 250.  
 Iafmin 242.  
  
 Kahweh 249.  
 Kakelah 265.  
 Kakelath 242.  
 Kali 253.  
 Kankham 252.  
 Kannab 270.  
 Karonfal 263.  
 Kafab 256.  
 Kest 254.  
 Khadi 270.  
 Kbasur 253.  
 Khalidumenon 242.  
 Kharpas 265.  
 Kharab 260.



- Khasf 267.  
 Kheiseran 256.  
 Khescht ber khescht 266.  
 Khesrudaru 242.  
 Khlar-dichambar 260.  
 Khobbas 265.  
 Khobebah 243.  
 Khoqdor 257.  
 Khalendschan 242.  
 Khusnedsch 273.  
 Koton 265.  
  
 Lebakh 251.  
 Leben 257.  
 Lebleb 266.  
 Lefan alafafir 243.  
 Loabah 249.  
 Lohiah 249.  
 Lubiah 266.  
 Lufibhah 250.  
  
 Maheredsch 271.  
 Mahhaleb 264.  
 Mahhruts 253.  
 Makal 272.  
 Mamitfa 264.  
 Marbas 250.  
 Masch 266.  
 Matfal 249.  
 Maus 254.  
 Mechel 244.  
 Mehudenah 263.  
 Meisch 252.  
 Meluch 253.  
  
 Meluchith 264.  
 Merkh 252.  
 Miah 268.  
 Misam 270.  
 Murdesafam 251.  
  
 Nabkah 251.  
 Nardsches 255.  
 Nasrin 256.  
 Nerdschil 268.  
 Nermalschkh 251.  
 Nil 266.  
  
 Ofcher 252.  
 Ofnan 253.  
  
 Reabah 269.  
 Ribas 259.  
 Rihhan affoliman 248.  
 Riwand 259.  
  
 Sabar 255.  
 Sakhr 245.  
 Sanbak 242.  
 Sanbal 246.  
 Sandal 248. 266.  
 Sarmak 253.  
 Sarnab 270.  
 Saronbad 241.  
 Scharbin 267.  
 Schehedenedsch 270.  
 Schekakul 254.  
 Scherzehre 283.  
 Schihh 267.  
 Schbir kheschkh 254.

## VOCES ARABICAE.

471

Sebestan 251.	Surendschan 244.
Sedar 251.	Sulan 258.
Seffef 270.	Talesfar 272.
Segar 268.	Tamar hendi 265.
Sel 263.	Tanub 268.
Selem 252.	Tebarfed 245.
Selichah 258.	Tebaschir 256.
Sendfchebil 240.	Telhh 270.
Sennah 260.	Tenbul 243.
Sent 270.	Terendschabin 266.
Senubar 268.	Torbed 249.
Seradsch alketrob 265.	Tsfah 264.
Sittah 19.	Ufedsch 252.
Such 267.	Wirs 258.
Sufa 15. 265.	
Sukutun 267.	

## INDEX III.

## VOCES GRAECAE.

*Αβρότονον 102. 186.	αἰγίπυρον 127.
αἰγκυλλίς 166.	αἰγόκερας 46.
αἰγούρια 217.	αἰθίωπις 157.
αἰήρατον 188.	αἰμόδωρον 96.
αἰνός 45. 181.	αἶρα 80.
αἰριορίγανος 130. 179.	αἰσάκαλις 174.
αἰρωστίς 81. 159. 168.	αἰκακία 183. 191.
αἰχουσα 38. 82. 129. 160.	αἰκαλύφη 47. 190.
αἰδιαντον 49. 108. 192.	αἰκάνδιον 186.
αἰζίωον 92. 174. 176.	αἰκανθα 101. 181. 185. 186.
αἰγίρος 28. 48. 106.	αἰκανθος 49. 97. 107. 181.
αἰγίλωψ 80. 159. 104.	αἰκανος 100.

- ἄκινος 180.  
 ἀκόνιτον 43. 77. 130. 177.  
 ἄκορον 102.  
 ἄκορον 170.  
 ἄκορος 102.  
 ἄκτῇ 41. 87. 168.  
 ἄκυλα 27.  
 ἀλθαῖα 97. 182.  
 ἀλικιάκαθος 127. 162.  
 ἄλιμον 97.  
 ἄλιμος 164.  
 ἄλισμα 171.  
 ἀλίφλοιος 104.  
 ἀλκία 182.  
 ἀλκιβιάδιον 160.  
 ἀλόη 169.  
 ἀλσίνη 174.  
 ἄλυπον 159.  
 ἄλυsson 131. 182.  
 ἀλωπέκουρος 80.  
 ἀμαμηλὶς 42.  
 ἀμάρακος 95.  
 ἀμβρωσία 190.  
 ἄμμι 164.  
 ἀμπειλόπρασσον 168.  
 ἄμπελος 48. 106. 108. 191.  
 ἄμωμον 140. 247.  
 ἀνάγαλλις 38. 161.  
 ἀνάγυρις 173.  
 ἀνάξυρις 171.  
 ἀνδράφαξις 40.  
 ἀνδράχνη 90. 97.  
 ἀνδρόσαιμον 185.  
 ἀνδρόσακας 193.  
 ἀνεμυχόρτος 218.  
 ἀνεμώνη 32. 43. 94. 95. 177.  
 ἀνηθον 86. 167.  
 ἀνθεμὶς 188.  
 ἀνθεμον 47.  
 ἀνθέρικον 88.  
 ἀνθυλλίς 164. 178.  
 ἀνητσον 40. 167.  
 ἀντιῆξιον 96. 181.  
 ἄνωις 183.  
 ἀπαρήνη 82. 101. 160.  
 ἄπιος 175.  
 ἀπάκυιον 163.  
 ἄρακος 98.  
 ἀράχιδνα 98.  
 ἀρηγμάνη 177.  
 ἀρία 93.  
 ἀρίσαρον 190.  
 ἀριστολογία 47. 103. 190.  
 ἀρεῖον 185.  
 ἀρκευθας 106.  
 ἄρκτιον 162.  
 ἀρκευθρος 162.  
 ἀρμηνακὰ μῆλα 176.  
 ἀρνώγλωσσον 82. 160.  
 ἄρον 47. 103. 190.  
 ἀρτεμισία 46. 187.  
 ἄσασον 127. 174.  
 ἀσκληπιδίς 163.  
 ἄσκυρον 185.  
 ἀσπάλαθος 45. 183.  
 ἀσπάλαξ 89.

ἀσπάργωγος 88.  
 ἀσπλῆνον 192.  
 ἀστήρ 188.  
 ἀστράγαλος 183.  
 ἀσφόδελος 24. 41. 88. 169.  
 ἀφάκη 98. 100. 183.  
 ἀφάρεκη 78.  
 ἀφία 95.  
 ἄχερδος 25.  
 ἄχερwaίς 28.  
 ἀχίλλεια 188.  
 ἀψύνδιον 46. 186. 187.

Βάκχαρις 46. 187.  
 βάλανος 27. 90. 173.  
 βαλλωτή 180.  
 βάλασμον 89. 172.  
 βαμβάκιον 218.  
 βάτος 25. 93. 176.  
 βατράχιον 44. 178.  
 βερίσκακα 54.  
 βερόνικη 218.  
 βεττονική 171.  
 βηχίον 46. 186.  
 βλίτου 37.  
 βόλβος ἐδωδιμός 169. ἐμετι-  
 κός 168.  
 βόλβου κώθιον 87.  
 βότρυς παντίου 109.  
 βότρυς 163.  
 βουβώνιον 205.  
 βουγλωσσον 160.  
 βουκίρας 46.

βούκινος 177.  
 βουνίης 128.  
 βούνιον 164.  
 βούπρηστις 38. 84.  
 βούτομος 90.  
 βούφθαλμον 188.  
 βραδύς 191.  
 βρεταννική 171.  
 βρύου 47. 193.  
 βρωμός 80. 159.

Γαλίοψις 179.  
 γάλλιον 160.  
 γεντιανή 164.  
 γεράνειον 109. 182.  
 γητύεν 87.  
 γιγγίδιον 164.  
 γίζυ 172.  
 γλαυξ 184.  
 γλήχων 44. 189.  
 γλῆνον 89.  
 γλυκοκάλαμος 218.  
 γλυκυερίζα 98. 184.  
 γλυκυσιδή 43. 177.  
 γναφάλιον 186.  
 γογγυλῖς 97.

Δαῦκος 39. 85. 165. 168.  
 δάφνη 107. 109. 192.  
 δαφνειδές 178.  
 δελφίνιον 177.  
 δενδρολίβανος 217.  
 δίκταμνος 45. 96. 180.  
 διός ἄνθος 91.

- διόσπυρος 89.  
 δίψακος 159.  
 δόλιχος 97.  
 δόναξ 20. 159.  
 δορύκνιον 127. 129.  
 δραβή 182.  
 δρακόντιον 47. 103. 190.  
 δροσιοβότανος 218.  
 δρυόπτερις 192.  
 δρυπίς 86.  
 δρύς 27. 109.  
 Ήβήνη 97.  
 ἑβένος 46. 89. 183.  
 ἑλαία 19.  
 ἑλαίαγνος 105.  
 ἑλάτη 28. 105. 108.  
 ἑλατήριον 191.  
 ἑλατίνη 181.  
 ἑλαφοβόσκον 166.  
 ἑλελίσφακον 37. 77.  
 ἑλειοσέλιον 168.  
 ἑλένιον 47. 95. 179. 188.  
 ἑλίχρυσον 102. 187.  
 ἑλλεβορίνη 189.  
 ἑλλέβορος 44. 95. 49. 88.  
 175. 171. 178.  
 ἑλξίνη 89. 159. 172.  
 ἑλυμος 208.  
 ἑμπετρον 164.  
 ἐπιθύμον 163.  
 ἐπιμήθιον 192.  
 ἐπίπακτις 189.  
 ἐπίπτερον 42. 56. 91.  
 ἐρεβινθος 25. 46. 98.  
 ἑρείκη 41. 89. 172.  
 ἐρίνθος 29.  
 ἑρνος 129. 161.  
 ἑρμοδάκτυλος 218.  
 ἑρπυλλος 96. 180.  
 ἑρυθρόδακτος 38. 81. 160.  
 ἑρύσιμον 45. 97. 182.  
 ἑσπερις 97.  
 εὐάνθεμον 47.  
 εὐζωμον 97. 182.  
 εὐπατώριον 174.  
 εὐφρόβιον 175.  
 εὐώνυμος 53.  
 ἐφήμερον 89. 129. 169.  
 ἔχιον 129. 161.  
 ἐχινόπους 134.  
 Ζάρεναβι 217.  
 ζέα, ζεία 20. 81. 159.  
 ζεντογάλη 217.  
 ζέρνα 139.  
 ζιγγίβερι 157.  
 ζιγείρ 172.  
 ζυγία 103.  
 ζυγίς 108.  
 Ἡδύοσμον 44. 179.  
 ἡδύσκαρον 183.  
 ἡλεκτρον 218.  
 ἡλιοτρόπιον 82. 160. 191.  
 ἡμερις 105.  
 ἡμεροκαλὲς 87.

ἡμεροκαλλίς 168.

ἡμιόνιον 108.

ἡμιονίτις 192.

ἡπατίτις 170.

ἡράνθεμον 47.

ἡρήγγιον 83. 164.

ἡριγερόν 102. 188.

Θάλικτρον 178.

Θαλασσοκράμβη 216.

Θαψία 86. 167.

Θερηπίδιον 127.

Θερμός 46.

Θηλυκράνεια 81.

Θηλύπτερις 107. 192.

Θηλύφονον 102.

Θησεῖον 75.

Θλάσπι 127. 181. 208.

Θραύπαλος 107.

Θριδακίνη 99.

Θριδαξ ἀγρία 185.

Θρύαλλις 129.

Θρύμβη 216.

Θρύον 27.

Θύα, θυία 26. 105.

Θύμβρα 45. 95. 180.

Θυμέλαια 172.

Θύον 26.

Ἰασίωνη 82.

Ἰβήρις 181.

Ἰθαία ῥίζα 168.

Ἰερὰ βοτάνη 179.

Ἰερήκιον 185.

Ἰκμη 75.

Ἰνδικον 37. 184.

Ἰξία 106.

Ἰξίνη 101.

Ἴον 23. 163.

Ἴπνον 76.

ἱππόγλωσσον 192.

ἱππομανές 127.

ἱππομάραθρον 39. 165. 167.

ἱππουρις 192.

ἱπποσίλινον 39. 59. 86. 167.

ἱπποφαίς 48. 191.

ἱππόφαιστον 186.

Ἰρις 37. 77. 158.

Ἰσατις 181.

ἰσόπυρον 178.

Ἰσχαίμων 79.

ἰτία 28. 105.

Ἰφυσον 96.

Ἰψος 92.

Κάγκκαμον 172. 252.

καθύτας 90.

κακκλία 164.

κάκτος 101.

καλαμάγρωστις 159.

καλαμίνθη 95. 130. 180. 181.

κάλαμος 41. 78. 79. 88.

170. 171.

κάμμαρον 43.

κάνναβις 182. 191.

καπνός 182.

καρεδαμίνη 182.

- καρδαμῖς, κάρδαμον 45. 181.  
 καρθάμων 37. 157.  
 καρδιοβοτάνη 218.  
 καρναβάλιον 166. 217.  
 κάρος 167.  
 καρπήσιον 209.  
 καρύα περσικά 104.  
 καρυόφυλλον 217.  
 κασσία 42. 172.  
 κατανάγκη 183. 184.  
 καύκαλις 129. 164.  
 καφουρά 217. 218.  
 καχρύς 39.  
 κεινωδός 101.  
 κέγχρον 38. 79.  
 κεδρίς, κέδρος 106. 191.  
 κενταύριον 47. 162.  
 κεντρομυρρίνη 106.  
 κέρασος 92.  
 κερατώνια 83.  
 κεραύνιον 109.  
 κερκίς 90.  
 κέστρον 179.  
 κήλαστρον 76.  
 κηπαία 174.  
 κίκι 48.  
 κιννάρμων 41. 172.  
 κισκάια 163.  
 κίρσιον 131. 186.  
 κισθός 43. 94. 177.  
 κισσάνδεμον 161.  
 κιττός 83. 163.  
 κιχώριον 100.  
 κλήθρη 27. 103.  
 κληματίς 163.  
 κληματίτις 178.  
 κλινοπόδιον 180.  
 κλύμενον 183.  
 κνέωρον 89.  
 κνήκος 46. 100.  
 κνηστρον 41.  
 κνίδη 47.  
 κωδιμέντον 216.  
 κοκαλῖς 218.  
 κοκκαλός 48.  
 κόκκος 41. 91. 191.  
 κοκκυγία 91.  
 κοκκυμηλία 82. 92.  
 κόκκωνε 42.  
 κολοκύνθη 191.  
 κολοκύνθις 48. 59. 105. 191.  
 κολυτέα 98.  
 κολυμβάς 190.  
 κολυτέα 92.  
 κολχικόν 171.  
 κόμαρος 90.  
 κονδρίλλη 185.  
 κονίλη 130. 179.  
 κόναρος 134.  
 κόνυζα 46. 102. 188.  
 κορίαννον 84.  
 κόριον 129. 166.  
 κόρις 161.  
 κόρχορος 94.  
 κορώνοπους 82. 182.  
 κόστος 156.

πόντιος 92.  
 ποτυλιδων 42.  
 κουκιοφορα 103.  
 κραμβη 161. 182.  
 κρανεία 21. 81.  
 κράταιγος 93.  
 κραταιόγονον 41. 172.  
 κριθῆ 20. 38. 80.  
 κριθμον 39. 165.  
 κρινάνθειον 42.  
 κριῶν 87. 88. 168.  
 κριός 46. 98.  
 κροκοδείλιον 189.  
 κρόκος 158.  
 κρόμμυον 30. 168.  
 κρότων 48. 191.  
 κύαμος 25. 30. 43. 46. 94.  
 98. 177.  
 κυδώνιον 92.  
 κυκὰς 106.  
 κυνόγλωσσαν 160.  
 κυνοκράμβη 163.  
 κύμνον 39. 164. 166.  
 κυνόςβητος 43. 176.  
 κύνωψ 82.  
 κυπάριστος 128.  
 κύπειρον 20. 37. 78. 158.  
 κύπρος 171.  
 κύτισος 99. 184.  
 κώνειον 39. 165.

Λαγώπτερος 184.

λαγώπτερος 47.

λάθυρις 175.  
 λάθυρος 98.  
 λακάδη 76.  
 λαμψάνη 185.  
 λάπαθον 89. 171.  
 λῆδον 177.  
 λείριον 87. 88.  
 λειχήν 192.  
 λεοντοπέταλον 171.  
 λεοντοπόδιον 187.  
 λεπίδιον 181.  
 λευκάκανθος 100. 186.  
 λευκάς 179.  
 λευκσίον 38. 45. 87. 182.  
 λιβανωτὶς 86. 100. 157. 165.  
 167.  
 λιβανωτός 69. 172.  
 λιγυστικόν 166.  
 λιθόσπερμον 160.  
 λινεζώστις 48. 191.  
 λινόςπαρτον 79.  
 λογχίτις 189. 192.  
 λύκαψος 129.  
 λύκιον 162. 191.  
 λύκοψις 160.  
 λυσιμαχία 174.  
 λύχνις 174.  
 λωτός 22. 26. 49. 83. 177.  
 184.

Μαγύδαρις 85.

μακεδωνίσιον σπέρμα 218.

μαλαβάθρον 194.



- ποταμογείτων 163.  
 ποτήριον 184.  
 πραικόκια 176.  
 πράσιον 45. 95. 180.  
 πράσον 87. 168.  
 πρίνος 103.  
 πταρμική 188.  
 πτελέα 23.  
 πτίρις 192.  
 πτίρηνιξ 101.  
 πυνκνόκομοι 180.  
 πύξος 106. 109.  
 πύρεθρον 188.  
 πυρός 21. 80.  
  
 'Pā 173.  
 ῥάκμος 38. 83. 162.  
 ῥαφανίς 97. 182.  
 ῥῆον 208.  
 ῥίζα λευκή 41. μέλαινα 45.  
 ῥοδία ῥίζα 191.  
 ῥοιὰ 25. 92.  
 ῥοιὰς 93. 177.  
 ῥοῦς 41. 86. 168.  
 ῥυτή 130.  
 ῥυτρός 102.  
  
 Σαγαπηνὸν 165.  
 σάμψυχον 180.  
 σαντώνιον 186.  
 σαῦρι 178.  
 σατύριον 168, 189.  
 σέλιον 22. 40. 86. 168.  
  
 σεράπιας 189.  
 σέρις 185.  
 σερίφιον 187.  
 σείεσι 39. 85. 164. 166.  
 σευλαμόλοχος 216.  
 σεῦτλον 40.  
 σησαμοειδές 175. 184.  
 σήσαμον 45. 96.  
 σίδειον 42.  
 σίδη 94.  
 σιδηρίτις 159. 166. 180.  
 σικύη 48. 105.  
 σίκυος 48. 59. 105. 191.  
 σιλλικύπρια 48.  
 σίλμβον 186.  
 σίλφιον 39. 84. 165.  
 σίνηπι περσικόν 127.  
 σίον 40. 166.  
 σίσαρον 167.  
 σισύμβριον 95. 179. 182.  
 σισυρίγχιον 77.  
 σίσων 166.  
 σκάλιον 102.  
 σκαμμώνιον 38. 161.  
 σκάνδυξ 166.  
 σκίλλη 41. 169.  
 σκόρδιον 44. 179.  
 σκολοπένδρον 108.  
 σκόροδον 87. 168.  
 σκοροδάπρασον 168.  
 σκορπισειδές 184.  
 σκορπίσεις 130.  
 σκόρπιος 97.

- πύριδον 45.  
 σμῶξ 105. 106. 161. 183.  
 191.  
 σμύρνον 167.  
 σόκος 100.  
 σπάρτιον 183.  
 σπάρτον 80.  
 σπείραξ 93.  
 σπείρας 92.  
 σταφίς ἀγρία 43. 177.  
 σταφυλίνος 128. 164.  
 στᾶχυς 179.  
 στελεφούρος 80.  
 στῆλις 88.  
 στιχάς 179.  
 στειβή 103. 190.  
 στρατιώτης 161. 182.  
 στρουθίον 42. 92. 174.  
 στρύχνον 38. 82. 162.  
 στύραξ 173.  
 συκάμινος 105.  
 σύκη 92.  
 σύκος 83.  
 σύμφυτον 160. 174.  
 σφέδαμνος 89.  
 σχῖνος 41. 106.  
 σχοῖνος 20. 38. 78. 158.  
 159.  
 Τέρμυθος 48. 106. 191.  
 τεύκριον 179.  
 τεῦτλον 40. 83.  
 τευτλόριζον 216.  
 ΤΟΜ. L  
 τηλίφιον 42. 174.  
 τιθύμαλλος 91. 175.  
 τίφι 80. 133.  
 τρεγάκανθα 99. 184.  
 τραγίον 167. 185.  
 τραγον 173.  
 τραγοπύγων 100. 185.  
 τραγορέγανος 130.  
 τράγος 164.  
 τρέβολος 82. 91. 160. 174.  
 τριπόλιον 161.  
 τριφυλλον 46. 184.  
 τριχόμενες 107. 192.  
 Ίάκινθος 32. 169. 177.  
 ὕδνον 109.  
 ὕδροπέπερι 172.  
 ἰσχύαμος 38. 162.  
 ὑπέρικον 46. 185.  
 ὑπήκοον 160.  
 ὑποκίστις 47. 190.  
 ὑποχοῖρις 100.  
 ὕσσωπος 44. 179.  
 Φάκος 46. 190.  
 φαλάγγιον 169.  
 Φάλαρις 159.  
 Φάσανον 77.  
 Φέλλος 104.  
 Φηγός 27. 104.  
 Φιλλυρέα 157.  
 Φίλυρα 94.  
 Φιστάκη 128.  
 Φλαιά 79.

- φλέως 103.  
 φλόγιον 88.  
 φλομῖς 180.  
 φλόμος 38. 82. 126. 161.  
     180.  
 φλόξ 91.  
 φλοῦς 79.  
 φοίνιξ 106. 109. 159.  
 φόνος 100.  
 φοῦ 157.  
 φῦκος 103. 108. 134. 193.  
 φυλίχη 83.  
 φυλλίτις 192.  
 φύλλον 103. 190.  
  
 Χαλβάνη 40.  
 χαμαιιάκτη 168.  
 χαμαιιδάφη 192.  
 χαμαίδρυς 95. 179.  
 χαμαιίκισσος 181.  
 χαμαιιλία 129.  
  
 χαμαιιλίων 47. 101. 102.  
     186. 189.  
 χαμαιιπέυκη 186.  
 χαμαιπίτυς 130. 178.  
 χαμαιριφῆς 106.  
 χαμαισύκη 175.  
 χαρακίας 79. 176.  
 χείρωνος ῥίζα 129.  
 χελιδόνιον 94. 177. 178.  
 χερυδάνθεμον 178. 188.  
 χερυσεβλάκνος 209.  
 χερυσόγονον 171.  
 χερυσοκόμη 186.  
  
 Ψευδοβούνιον 165.  
 ψευδοδίκταμνος 95. 180.  
 ψιλώθριον 48.  
 ψύλλον 160.  
 Ωκιμαυθῆς 174.  
 ὠκιμον 45. 96.  
 ὠχρὸς 98.

## INDEX IV.

## NOMINA PLANTARUM SYSTEMATICA.

- Abrus precatorius* 366. 383.  
*Acacia vera* 4. *arabida* 18. 49.  
     107. 147. 191. 279. 344. 377.  
     Senegal 107. 383. *Catechu*  
     107. 191. 381. *latronum*  
     206. *gummifera* 270.  
  
*Acanthus* *Dioscoridis* 379.  
     *mollis* 35. 145. 181. *spi-*  
     *nosus* 97. 181. 397.  
*Acarna gummifera* 101. 385.  
     *cancellata* 101. 385.  
*Acer monspellulanum* 345.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 483

- campestre praef.* Pseudo-platanus 89. creticum 89. 384. Opalus 151. 282. platanoides 203.
- Achillea* aegyptiaca 343. cretica 386. moschata 392. Herba rota 450. nana 450. magna. 461. macrophylla 461. Clavennae 421. atrata 421. nobilis 181. Agratum 188. 320. tomentosum 188. 421. tanacetifolia 188. 421. 461. Ptarmica 188. 320.
- Aconitum* Anthora 341. pyrenaicum 341. volubile 341. variegatum 405. tauricum 416. neomontanum 416. cernuum 416. Cammarum 43. 417. Napellus 130. 144. 341. Lycocotonum 177. 319. 341. album f. ochroleucum 264. 351.
- Acorus* Calamus 11. 41. 83. 170.
- Acrostichum* Marantae 344.
- Actaea* spicata 204. 391.
- Adansonia* digitata 366. 383.
- Adiantum* pedatum 462. Capillus 49. 108. 192.
- Adonis* vernalis 341.
- Adoxa* Moschatellina 343.
- Aecidium* Euphorbiae 355.
- Aegle* Marmelos 263. 381.
- Aegopodium* Podagraria 318.
- Aesculus* Hippocastanum 340.
- Aethusa* Cynapium 318. Medium 331. 330. Bunias 434.
- Agaricus* deliciosus 109.
- Agave* americana 431.
- Agrimonia* Agrimonoides 441. Eupatoria 174.
- Agrostemma* flos Iovis 91. Coronaria 91. 174. Githago 218. 327.
- Agrostis* Spica venti praef.
- Aira* canescens 400. caryophylla 454.
- Aiuga* reptans 327. genevensis praef. alpina praef. Chamaepitys 130. 178. 221. Iva 178. 222. 401.
- Alchemilla* vulgaris 313. 326. alpina 334. Aphanes 400. pentaphylla 455.
- Aleurites* moluccana 269.
- Alisma* Damasonium 404. parnassifolium 171. ranunculoides 405.
- Allium* ursinum 327. vineale 327. 413. carinatum 404. rotundum 413. oleraceum 413. paniculatum 413. senescens 413. angulosum 413. Clusianum 413. Moly 413. pallens 441. Chamaemoly 441. ascalonicum 12. 87.

220. Cera 12. 168. Por-  
zum 12. 168. 220. 87. ni-  
grum 23. 87. 108. 413. 441.  
sativum 87. 168. Scorodo-  
prafum 87. 168. Schoeno-  
prafum 87. 168. 220. Am-  
peloprafum 168. 395. are-  
narium 168. Victorialis 339.  
subhirsutum 339.
- Alnus* incana 445. oblongata  
27. 103.
- Aloë* perfoliata 166. 235.
- Alopecurus* geniculatus 403.  
utriculatus. Schrad. 447.  
agrestis 454.
- Alpinia* Galanga 242.
- Althaea* hirsuta 435. offici-  
nalis 97. 146. 220. canna-  
bina 182. 418. rosea 220.  
305. ficifolia 265. 437.
- Altingia* excelsa Noronae 268.
- Alyssum* creticum 365. cly-  
peatum 397. maritimum  
401. spinosum 406. cam-  
pestre 306. deltoideum 442.  
montanum 459. sativum 97.  
182. 227. alpestre 182.
- Amarantus* tricolor 206. 227.  
Blitum 220.
- Amaryllis* formosissima 413.  
lutea 413.
- Ambrosia* maritima 190. 407.
- Ammi* glaucifolium 447. co-  
pticum 164. maius 220. 326.
- Anemum* Cardamomum 39.  
157. Zingiber 37. 157. 240.  
hirsutum 156. Zerumbes  
241. Zedoaria 241.
- Amygdalus* communis 13. 92.  
Perfica 176.
- Amyris* ballamifera 369. 375.  
gileadensis 12. 89. 172. 257.  
Opobalsamum 257. 340.  
383. Kataf 12. 89. 144. 172.  
257. 380.
- Anubasis* aphylla 253. 379.
- Anacardium* occidentale 375.
- Anacyclus* aureus 402.
- Anagallis* arvensis 38. 161.  
Monelli 412. tenella 447.  
456.
- Anagyris* foetida 173. 340.
- Anamenia* Venten. 407.
- Anarrhinum* bellidifolium  
397.
- Anchusa* angustifolia 318. of-  
ficinalis 38. sempervirens  
400. tinctoria 82. 160. 334.  
italica 129. 160. 326.
- Andromeda* polifolia 448.
- Andropogon* Ischaemum 437.  
dilitachyos 454. Gryllus 454.  
Ravennae 454. arundina-  
ceus 8. Nardus 8. 38. 159.  
246. Schoenanthus 159. 246.
- Androsace* Chamaejasme 411.  
lactea 411. carnea 440.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 487

- Septentrionale* 321. lanceo-  
 latum 398. marinum 407.  
 ramosum 451.  
*Aster* Amellus 146. 183. 323.  
*Tripolium* 398. acris 402.  
 alpinus 460.  
*Astragalus* creticus 99. 184.  
*Poterium* 184. 342. pugni-  
 formis 184. sesamoides 184.  
 442. Glaux 184. 419. smar-  
 ginatus 267. Cicer 342. mi-  
 crophyllus 335. christianus  
 379. densifolius 379. co-  
 luteoides 379. echiioides  
 385. Erianthus 391. gly-  
 cyphyllos 394. aristatus 397.  
 monspessulanus 435. 449.  
 incanus 460. exscapus 460.  
 hamosus 419.  
*Astrantia* maior 318. Epi-  
 pactis 339. minor 456.  
*Athamanta* cretensis 39. 85.  
 165. 326. 351. Meum 39.  
 Matthioli 165. 333. Liba-  
 notis 326.  
*Athyrium* Filix foemina 107.  
 192. fragile 422.  
*Atriplex* hortenensis 40. 149.  
 220. 252. Halimus  
 53. portulacoides  
 38. 82.  
 38.  
 159.  
*fatus* 80. 227. *fativa* 159.  
 nuda 403.  
*Averrhoa* Carambola 55. 381.  
*Azalea* pontica 291. pro-  
 cumbens 412.  
*Baobab* Dioscoridis 188.  
 379.  
*Bactris* maior 370.  
*Ballota* alba 431. nigra 180.  
*Balsamita* ageratifolia 586.  
 vulgaris 219. 340.  
*Bambusa* arundinacea 170.  
 256. Guadua Humb. 372.  
*Bartisia* alpina 352.  
*Bellis* perennis 205. 305.  
*Berberis* vulgaris 203.  
*Beta* vulgaris 40. 83.  
*Betonica* Alopecuroides 417. of-  
 ficinalis 179. orientalis 218.  
*Betula* pubescens 356.  
*Bixa* Orellana 416.  
*Bidens* tripartita præf.  
*Biscutella* coronopifolia 401.  
 auriculata 442. apula 442.  
 laevigata 443.  
*Biserrula* Pelecinus 98.  
*Blechnum* boreale 321. 344.  
 357.  
*Blitum* capitatum 37. 453.  
*Boletus* suaveolens 206.  
*Bombax* Ceiba 369. gossy-  
 pinum 15. 146. 265.  
*Borago* officinalis 160. 326.

- Areca* Catechu 269. 381. oleacea 371.
- Arenaria* bavarica 352. tenuifolia 448. trinervia 448. striata 448. iuniperina 458. tetraquetra 468. peploides 466.
- Aretia* Vitaliana 440.
- Argemone* mexicana 353.
- Aristolochia* cretica 47. 102. Clematidis 190. rotunda 190. longa 190. Piftolochia 205. baetica 377. 421. maurorum 380.
- Arnica* cordata 351. fcorpioides 351. montana 420. Doronicum 420. glacialis 420.
- Arnopogon* Dalechampii 435. picroides 460.
- Artedia* Squamata 379.
- Artemisia* iudaica 16. 267. 379. Apfynthium 46. 187. chamaemelifolia 46. 187. Santonica 186. 226. 343. campestris 187. gallica 431. camforata 187. 218. 398. pontica 187. 343. fragrans 187. glacialis 460. maritima 187. 398. Dracunculus 217. 220. fcoparia 420. indica 267. Abrotanum 16. 186. coerulescens 343. 443. Mutellina 352. vallesiaca 392. arborefcens 406.
- Arum* matulatum 47. 226. Dracunculus 47. 103. 190. 290. 306. Colocasia 103. 147. italicum 190. 206. 344. Arifarum 190. 206. 344. 351. tenuifolium 206. 344. proboscideum 344.
- Arundo* Donax 8. 21. 159. Calamiagrostis 159. arenaria 411. 456. epigeios 454.
- Afarum* europaeum 174. 220. 227.
- Asclepias* procera 83. 252. 383. Vincetoxicum 163. 218. 222. 314. nigra 163. gigantea 252. variegata 466.
- Asparagus* aphyllus 88. 414. albus 414. acutifolius 414.
- Asperugo* procumbens 201.
- Asperula* odorata 313. arvensis 394. taurinensis 403. tinctoria 437. cynanchica 440. pyrenaica 455. laevigata 455.
- Asphodelus* ramosus 24. 41. 88. 169. 414. albus 414. fistulosus 414.
- Aspidium* Lonchitis 192. 344. alpinum 352. spinulosum 451. aculeatum 461.
- Asplenium* Trichomanes 107. 192. 222. 227. Hemionitis 108. 192. Ceterach 192. 321. Buta muraria 314. 290. 328.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 487

- Septentrionale* 321. lanceo-  
 latum 398. marinum 407.  
 ramosum 451.  
*Aster* *Amellus* 146. 182. 328.  
*Tripolium* 398. acris 402.  
 alpinus 460.  
*Astragalus* *creticus* 99. 184.  
*Poterium* 184. 342. pugni-  
 formis 184. lesamoides 184.  
 442. *Glauz* 184. 419. smar-  
 ginatus 267. *Cicer* 342. mi-  
 crophyllus 355. *christianus*  
 379. *densifolius* 379. co-  
 luteoides 379. *echioides*  
 385. *Erianthus* 391. gly-  
 cyphyllos 394. *aristatus* 397.  
*monspessulanus* 435. 449.  
*incanus* 460. *exscapus* 460.  
*hamulos* 419.  
*Astrantia* *maior* 318. *Epi-*  
*paetis* 339. *minor* 456.  
*Athamanta* *cretensis* 39. 85.  
 165. 326. 351. *Meum* 39.  
*Matthioli* 165. 338. *Liba-*  
*notis* 326.  
*Athyrium* *Filix foemina* 107.  
 192. *fragile* 422.  
*Atriplex* *hortensis* 40. 149.  
 202. 220. 252. *Halimus*  
 164. 253. *portulacoides*  
 395.  
*Atrape* *Mandragora* 38. 82.  
 250. *Belladonna* 338.  
*Avena* *sterilis* 80. 143. 159.  
 fatua 80. 227. *fatua* 159.  
 nuda 403.  
*Averrhoa* *Carambola* 55. 381.  
*Azalea* *pontica* 291. *pro-*  
*cumbens* 412.  
*Baccharis* *Dioscoridis* 188.  
 379.  
*Bactris* *maior* 370.  
*Ballota* *alba* 431. *nigra* 180.  
*Balsamita* *ageratifolia* 586.  
*vulgaris* 219. 320.  
*Bambusa* *arundinacea* 170.  
 256. *Guadua* *Humb.* 372.  
*Bartsia* *alpina* 352.  
*Bellis* *perennis* 205. 305.  
*Berberis* *vulgaris* 203.  
*Beta* *vulgaris* 40. 83.  
*Betonica* *Alopecuroides* 417. *of-*  
*ficinalis* 179. *orientalis* 218.  
*Petula* *pubescens* 356.  
*Biza* *Orellana* 416.  
*Bidens* *tripartita praef.*  
*Biscutella* *coronopifolia* 401.  
*auriculata* 442. *spula* 442.  
*laevigata* 442.  
*Biferrula* *Pelecinus* 98.  
*Blechnum* *boreale* 321. 344.  
 357.  
*Blitum* *capitatum* 37. 453.  
*Boletus* *luaveolens* 206.  
*Bombax* *Ceiba* 369. *gossy-*  
*pinum* 15. 146. 265.  
*Borago* *officinalis* 160. 226.



- Borassus flabelliformis* 18. 272.  
*Botrychium Lunaria* 321. ru-  
 taceum 422  
*Brassica arvensis* 418. Eru-  
 ca 97. 132. Napobrassica  
 97. 122. Napus 222.  
*Briza media* 318. maxima 455.  
*Bromelia Ananas* 369.  
*Bromus velutinus* 455.  
*Brotrea corymbosa* 47. 102.  
 189. 216. 343. 377.  
*Bryonia alba* 191. cretica  
 461. dioica 191.  
*Bubon gummiferum* 11. 143.  
 166. Galbanum 40. ma-  
 cedonicum 218. 339.  
*Bulbocodium vernum* 87. 413.  
*Bunias spinosa* 385. Eruca-  
 go 391. 459. lyriaca 432.  
*Bunium Bulbocastanum* 164.  
 aromaticum 164. 404. ste-  
 xuosum 466.  
*Buptharum spinosum* 343.  
 maritimum 421. salicifo-  
 lium 421.  
*Bupleurum perfoliatum* 318.  
 falcatum 318. 395. grami-  
 nifolium 352. iuncum 395.  
 rigidum 395. Odontites  
 434. tenuissimum 440. stel-  
 latum 456. petraeum 456.  
 ranunculoides 456. angu-  
 losum 456. rotundifolium  
 38. 84. longifolium 164.  
 431. fruticosum 164. 339.  
 baldense 202.  
*Butomus umbellatus* 90.  
*Buzus sempervirens* 16. 29. 196.  
*Cacalia alpina* 343. 420. Ant-  
 euphorbium 398. Kleinh  
 420. albifrons 420.  
*Cachrys cretica* 39. sicula 39.  
 456. panacifolia 86. Mori-  
 soni 165. Libanotis 165. 339.  
*Cactus coccinellifer* 372.  
 mammillaris 401. peruvia-  
 nus 405. Opuntia 92. Tu-  
 na 372.  
*Cassalpinia pulcherrima* 203.  
 Sappan 260. 288.  
*Cakile maritima* 265. 434.  
*Caladium esculentum* 375.  
*Calamus Rotang* 171. 256.  
 Zalacca 256. 448. ruden-  
 tum 256.  
*Calendula officinalis* 147. 205.  
*Caltha palustris* 204. 319.  
*Campanula saxatilis* 351. Cer-  
 vicaria 352. thyrsioidea 354.  
 glomerata 354. Alpini 384.  
 Speculum 395. patula 437.  
 graminifolia 440. spicata  
 447. linifolia 447. rhom-  
 boidea 447. bononiensis  
 447. hederacea 447. bar-  
 bata 456. caespitosa 456.  
 stylosa 456. Trachelium

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 489

- praeef.* perficifolia *praeef.*  
 rapunculoides *praeef.* Ra-  
 punculus 129. 326. latifo-  
 lia 466. hybrida 466. Me-  
 dium 161. 838. Erinus 161.  
*Camphorosma* monspeliaca  
 334. acuta 402. glabra 433.  
*Canarium* commune 270.  
*Camilla* alba 372. 376.  
*Canna* indica 390.  
*Cannabis* lativa 191. 222. 270.  
*Capparis* ovata 396. spinosa  
 14. 43. 176. 319.  
*Capsicum* annuum 201. 326.  
 376. baccatum 326. gros-  
 sum 326. frutescens 376.  
*Cardamine* pratensis 314. 320.  
 Impatiens 385. resedaefo-  
 lia 459. parviflora 459. tri-  
 folia 418. hirsuta 431.  
*Cardiospermum* Halicacabura  
 319.  
*Carduus* stellatus 288. leu-  
 cographus 100. 185. 205.  
 arvensis 101. acanthoides  
 402. Personata 460. par-  
 vislorus 131. 186. desflora-  
 tus 420. mollis 420. ara-  
 bicus 186. crispus 450. pan-  
 nonicus 420. marianus 186.  
 tenuiflorus 450.  
*Carex* elongata 407. tovalis  
 407. Pseudocyperus 407.  
 vulpina 407. baldensis 461.  
 digitata 461. ornithopoda  
 461. ampullacea 461. acu-  
 ta 147.  
*Caricai* cauliflora 371. Pa-  
 paya 422.  
*Carissa* Carandas 381.  
*Carlina* corymbosa 443. ra-  
 cemosa 420. acaulis 101.  
 186. vulgaris 328. lana-  
 ta 443.  
*Carpesium* cernuum 443.  
*Carpinus* Betulus 103. 151.  
*Carthamus* Carduncellus 402.  
 coeruleus 420. tinctorius  
 46. 100. mitissimus 100.  
 186. arborescens 100. la-  
 natus 100. 186. 343.  
*Carum* Carvi 167. 220.  
*Cassia* Fistula 218. 260. 307.  
 372. Senna 218. 260. To-  
 ra 260. Absus 383. So-  
 phera 383.  
*Cassine* capensis 413.  
*Cassyta* filiformis 91.  
*Catananche* lutea 385. coe-  
 rulea 397.  
*Caucalis* orientalis 129. 164.  
 377. grandiflora 318. nodosa  
 339. 456. Anthriscus 347.  
 daucoides 354. pumila 412.  
 latifolia 440. platycarpus 440.  
*Caulinia* fragilis 430.

- Cenropia peltata* 372.  
*Celosia cristata* 202. coccinea 395. castrensis 431.  
*Celsia* Arcturus 385.  
*Celtis australis* 49. 83.  
*Cenchrus frutescens* 384.  
*Centaurea* Centaurium 47. 147. 221. benedicta 102. 328. Cyanus 102. 189. 320. 295. Crocodilium 189. nigra 205. 398. Behen 267. 380. Rhapontica 208. 309. 352. Calcitrapa 226. 421. montana 320. 356. phrygia 356. paniculata 356. spinosa 386. muricata 398. conifera 402. pullata 402. Crupina 443. Centauroides 443. solstitialis 443. galactites 450. nigrescens 450. alpina 461. pectinata 461. Cineraria 461. fonchifolia 461. axillaris 461. erucifolia 421. splendens 421. Verutum 421. salmantica 421.  
*Cerastium* aquaticum 174. 437. viscosum 396. vulgatum 396. dichotomum 415. repens 441. latifolium 458. tomentosum 458.  
*Ceratonia* Siliqua 83.  
*Cerbera* Maughas 252. 382. Ahovai 375.  
*Cercis* Siliquastrum 90.  
*Cerinthe* maior 143. minor 411. aspera 411.  
*Chaerophyllum* sylvestre 327. hirsutum 355. 434. aureum 404. bulbosum 412. temulatum 437.  
*Chamaedorea* gracilis 371.  
*Chamaecrops* humilis 406.  
*Chara* hispida 461.  
*Cheiranthus incanus* 146. 182.  
 Choiri 45. 296. annuus 296. sinuatus 401. maritimus 449. trilobus 459. erysimoides 418. litoreus 418. tricuspidatus 432.  
*Chelidonium* maius 94.  
*Chenopodium* glaucum *praef.* album 165. 326. Bouys 163. Scoparia 202. hybridum 318. murale 437. ambrosioides 456. Bonus Henricus 313. olidum *praef.* rubrum *praef.* polyspermum 466. maritimum *praef.*  
*Cherleria* Sedoides 352.  
*Chironia* Centaurium 129. 162. maritima 440. spicata 456.  
*Chlora* perfoliata 414.  
*Chondrilla* iuncea 356.  
*Chrysanthemum* coronarium 188. 420. monspeliense 188. legetum 205. Leucanthemum 328. italicum 343.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 491

- trifurcatum 386. Myconi  
 435. atratum 461.  
*Chrysobalanus* Icaco 371.  
*Chrysocoma* Linofyris 186. 320  
*Chrysosplenium* oppositifoli-  
 um 396.  
*Cicer* aristinum 98. Lens 15. 46.  
*Cichorium* Intybus 100. 146.  
 185. Endivia 146. 185. spi-  
 nosum 353. 386.  
*Cicuta* virofa 143. 354. 395.  
*Cineraria* maritima 402. cam-  
 pestris 407. palustris 407.  
 cordifolia 461.  
*Circaea* alpina 439. lutetia-  
 na praef.  
*Cissus* vitiginea 142. 247. ro-  
 tundifolia 248.  
*Cistus* creticus 14. 43. 94.  
 385. ladaniferus 177. vil-  
 losus f. incanus 177. 340.  
 416. salvifolius 177. 340.  
*Helianthemum* 340. Le-  
 don 340. guttatus 352. 391.  
 halimifolius 391. linearis  
 391. lavandulifolius 416.  
 ocimoides 416. thymifolius  
 416. oelandicus 416. ca-  
 nus 416. Clusii 416. pi-  
 losus 416. Fumana 416.  
 ledifolius 416. laurifolius  
 416. populifolius 416. la-  
 rus 416. montpelienfis 416.  
 Libanotis 416. umbellatus  
 416. crispus 416. albidus  
 416. Tuberaria 434. num-  
 mularius 448. lampucifo-  
 lius 448. glutinosus 448.  
*Citrus* medica 99. 146.  
*Cladium* germanicum Schrader  
 158. 453.  
*Clathrus* ruber 422.  
*Clematis* Vitalba 178. 327.  
 Viticella 178. Flammula  
 277. 282. 341. maritima  
 458. cirrhosa 417. inte-  
 grifolia 417.  
*Cleome* pentaphylla 385.  
*Clinopodium* vulgare 180.  
*Clusia* lanceolata 277.  
*Clypeola* Ionthlaspi 401.  
*Cnicus* Calabonae 186. 406.  
 Erisithales 205. 435. Acar-  
 na 353. monspessulanus  
 398. tuberosus 402. erio-  
 phorus 402. dissectus 406.  
 pratensis 406. ferox 450.  
 syriacus 432. canus 450.  
*Coccoloba* uvifera 405.  
*Cochlearia* Armoracia 181.  
 Draba 182. 342. anglica  
 406. danica 406.  
*Cocos* nucifera 103. 268. 371.  
 fusiformis 371.  
*Coffea* arabica 249. 380.  
*Coix* Lacrima 392.  
*Colchicum* autumnale 89. 129.  
 171. 319. montanum 414.

- Colutea cruenta* 38.  
*Comarum palustre* 348. fragarioides 391.  
*Conserva glomerata* 206.  
*Conium maculatum* 39. 63. 165. 226.  
*Convallaria latifolia* 169. 414. bifolia 202. multiflora 294. maialis 309. 314. verticillata 319.  
*Convolvulus Scammonia* 38. 161. sepium 82. 161. Imperati 161. 216. Dorycnium 127. 129. Turpetum 249. 381. Cantabrica 201. 412. Soldanella 338. Batatas 372. platanifolius 375. Mechoacantha 376. paniculatus 384. Nil 390. althaeoides 412. saxatilis 434. copticus 456. tricolor 456.  
*Conyza squarrosa* 356. fordida 435. sicula 450. saxatilis 460.  
*Copaifera officinalis* 375.  
*Corchorus olitorius* 14. 94. 264. 383. aestuans 264.  
*Cordia Myxa* 30. 82. 162. 251. 338. Sebestena 82. 251. 338.  
*Coriandrum testiculatum* 129. lativum 11. 84. 166.  
*Coriaria myrsifolia* 402.  
*Coris monspeliensis* 160. 338.  
*Cornus mascula* 21. 81. 143. sanguinea 81. 282. suecica 411. canadensis 455.  
*Coronilla Securidaca* 183. argentea 385. globosa 385. Emerus 406. valentina 419. glauca 419. coronata 419. Sesban 383. minima 436. iuncea 459.  
*Coronopus Ruellii* 182.  
*Corrigiola litoralis* 456.  
*Cortusa Manthioli* 338.  
*Corylus Avellana* 47. 103. 134. tubulosa 103. Calurna 421.  
*Cotyledon Umbilicus* 129. 174. 213. 340. 377. ferrata 174. 340.  
*Crambe maritima* 394.  
*Crassula rubens* 457.  
*Crataegus Azarolus* 25. 42. 93. Oxyacantha 318.  
*Crepis virens* 185. 438. biennis 185. tectorum 356. 397. Dioicoidis 438. nemausensis 438. scariosa 443. Sprengeriana 450. foetida 460.  
*Crescentia Cujete* 371.  
*Cressa crotica* 164. 338.  
*Critium alaticum* 87.  
*Critium maritimum* 39. 165. 282.  
*Crocus sativus* 7. 20. 77. 143. 158.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 495

437. tetragonum 437. angustifolium 340. palustre 434. parviflorum 457. *Epimedium alpinum* 338. *Epipactis*. *Nidus avis* 320. ovata 344. latifolia 348. pallens 356. cordata 450. *Equisetum sylvestre* 192. pratense 192. *Erica arborea* f. *scoparia* 41. 89. 172. cinerea 396. 414. medieterranea 396. 414. viridipurpurea 414. *Cheradrea* 415. purpureascens 415. *Linaria* 415. vulgaris *praeef.* *Brigandea* acre 320. tuberosum 396. graveolens 402. glutinosum 436. alpinum 460. *Ranunculus alpinus* 434. *Eriophorum angustifolium* 200. alpinum 354. caespitosum 454. latifolium 454. *Erodium cicutarium* 182. 342. 343. 323. cicutarium 328. gruinum 406. alpinum 437. cicutarium 442. *Asperula* *Brillia* 99. 146. 183. 254. hirsutum *praeef.* *Bryngium plantum* 85. 164. maximum 339. alpinum 349. 391. pusillum 412. anethyllum 431. *Boursieri* 434.

*Erythraea officinale* 45. *Alitaria* 320. *Barbarea* 320. diffusum 406. hieracifolium 459. *Erythrina* *Corallo dendron* 418. *Erythronium Dens Canis* 89. 168. 350. *Erythroxylon* *Coca* 374. *Eugenia caryophyllata* 217. 222. 263. 340. *Jambos* 381. *Euonymus europaeus* 338. latifolius 412. verrucosus 412. *Euphorbia* *Characias* 42. 176. 340. 416. *Apios* 42. 175. 340. 397. *Peplis* 42. 91. 175. *Paralias* 42. 91. 130. 175. 340. *orientalis* 91. antiquorum 91. officinarum 175. *Chamaelyce* 175. *Peplus* 176. 348. *Lathyrus* 175. *Pityusa* 175. *helioscopia* 175. *platyphyllus* 175. *Cyparissias* 176. 335. *Myrsinites* 176. 340. *dendroides* 176. *nereifolia* 263. *mauritanica* 353. *amygdaloides* 355. *aleppica* 384. *dulcis* 391. *terrata* 415. *hibernica* 416. *Cajogala* 429. *Gerardiana* 432. *verrucosa* 434. *epithymoides* 441. *sylvestrica* 441. *rubra* 458. *Euphrasia* *Odontites* 208.

355. officinalis 314. lutea  
 355. latifolia 441.  
*Evonymus europaeus* 83. 147.  
*Excoecaria Agallocha* 18. 271.  
 381.  
*Fagara Avicennae* 247. 411.  
*Fagonia arabica* 13. cretica 91.  
*Fagus sylvatica* 206. Casta-  
 nea 16. 104.  
*Fedia coronata* 440. dentata  
 440. echinata 440. Cor-  
 nucopiae 453.  
*Ferula tingitana* 35. 39. 84.  
 165. Asa foetida 40. 84.  
 165. 253. 384. communis  
 et meodes 84. 143. 165.  
 339. glauca 85. 447. per-  
 fica 165. 253. nodiflora 351.  
*Ferulago* 395.  
*Festuca Myurus* 466.  
*Ficus Carica et Sycomorus*  
 9. 21. 81. 244. religiosa  
 244. Benjamina 244. ben-  
 galensis 245.  
*Filago pygmaea* 461.  
*Forstera mucifolia* 421.  
*Fragaria vesca* 204. 218.  
*Frankenia laevis* 401. pul-  
 verulenta 414. hirsuta 457.  
*Fraxinus excelsior* 19. Or-  
 nus 76. 112. 243. rotan-  
 difolia 76.  
*Friillaria Imperialis* 396.  
*Maleagris* 395. persica 395.  
 pyrenaica 414.  
*Fusus aculeatus* 108. 193. ala-  
 tus 127. bulbosus 108. 462.  
 cartilagineus 108. 193. mem-  
 branifolius 109. natans 353.  
 402. barbatus 353. 407.  
 lumbricalis 353. loreus 398.  
 nodosus 398. acinaris 407.  
*Erica marina* 451. Filum  
 462. palmatus 108. 462.  
*Palmetta* 127. Plocamium  
 353. 422. saccharinus 108.  
 193. 462. salicifolius 451.  
 sanguineus 193. filiquosus  
 108. 398. tamariscifolius 108.  
 turbinatus 109. vesiculosus  
 422. volubilis 108.  
*Fumaria officinalis* 182. bul-  
 bosa 203. 528.  
*Galeandra nivalis* 314.  
*Galega officinalis* 342.  
*Galeopsis Ladanum praef.*  
 Tetrabit 277.  
*Galium Aparine* 82. 160. 201.  
 verum 160. sylvaticum 318.  
 graecum 584. rubrum 411.  
 rotundifolium 447. pubil-  
 lum 455. glaucum 455. bo-  
 reale 455. uliginosum praef.  
 Mollugo praef.  
*Garcinia Mangostana* 381.  
*Gardenia gummifera* 252.

- Genista* aspalathoides 45. 183.  
lufitanica 134. 385. angli-  
ca 406. sylvestris 449. hi-  
spanica 459. florida 418.  
sagittalis 418. canariensis  
419. tinctoria 317. pilo-  
la *praef.* germanica *praef.*  
*Gentiana* lutea 164. 290. 326.  
Cruciata 318. 396. bavari-  
ca 390. 431. asclepiadea  
390. punctata 390. pur-  
purea 390. Pneumonanthe  
338. pannonica 412. ver-  
na 412. nivalis 412. ci-  
liata 441. utriculosa 441.  
imbricata 431.  
*Geranium* molle 183. 328.  
tuberosum 183. 342. Ro-  
bertianum 314. 328. dis-  
sectum 328. pratense 328.  
sanguineum 328. rotundi-  
folium 342. reflexum 342.  
argenteum 352. lucidum  
355. phaeum 418. nodo-  
sum 418. sylvaticum 418.  
*Geropogon* hirsutus 442.  
*Geum* rivale 204. 222. ur-  
banum 204. montanum  
352.  
*Gladiolus* communis 20. 77.  
142. 158.  
*Glaucium* phoeniceum 94.  
396. violaceum 396. lu-  
teum 177. 264.  
*Glauz* maritima 353.  
*Globularia* Alypum 159. 338.  
vulgaris 334. nudicaulis  
433. cordifolia 411. spi-  
nosa 455.  
*Glycyrrhiza* asperima 98.  
glabra 184. 226. 342. echi-  
nata 342.  
*Gnaphalium* sanguineum 46.  
187. 379. Stoechas 102.  
187. Leontopodium 187.  
343. gallicum 205. are-  
narium 320. montanum 320.  
germanicum 320. dioicum  
320. arvense 398. sylv-  
ticum 402. alpinum 406.  
asterisciflorum 407. orien-  
tale 460. margaritaceum  
420. minimum 466.  
*Gomphrena* globosa 319.  
*Gossypium* arboreum 15.  
146. 383. herbaceum 265.  
328.  
*Gratiola* officinalis 288.  
*Guaiacum* officinale 372. 376.  
*Guilandina* Bonduc 281.  
*Gypsophila* Struthium 42. 174.  
353. fastigiata 174. 355.  
Saxifraga 401. rigida 434.  
*Hedera* Helix 83. 143. 163.  
*Hedwigia* balsamifera 372.  
*Hedysarum* Alhagi 15. 205.  
266. 379. Onobrychis 184.



- coronarium 397. Capurgali 459.  
*Helianthus annuus* 376. indicus 438. multiflorus 438. tuberosus 443.  
*Heliconia Bibai* 372.  
*Heliotropium europaeum* 82. 160. lupinum 395.  
*Helleborus orientalis* 44. 95. 178. niger 226. foetidus praef. hyemalis praef.  
*Helminthia echioides* 100. 406.  
*Helvella esculenta* 109.  
*Hemerocallis flava* 396. fulva 396.  
*Heracleum Spondylium* 166. gummiferum 166. tauricum 401. angustifolium 456. austriacum 456. alpinum 456.  
*Herniaria glabra* 318. fruticosa 404. hirsuta 447. lenticulata 456.  
*Hesperis tristis* 97. matronalis 328. verna 459.  
*Hibiscus ficulneus* 265. 383. esculentus 265. Trioenum 320. 379. Abelmoschus 385. palustris 397. Sabdariffa 418. syriacus 432.  
*Hieracium alpinum* 356. cy-mosum 356. 442. murorum 356. paludosum 356. 438. sabaudum 356. praemorsum 356. bulbosum 402. sylvaticum 438. auranticum 442. staticae-folium 450. florentinum 460. chondrilloides 460. grandiflorum 460. glutinosum 460. villosum 419. dubium 432. umbellatum praef.  
*Hippocrepis uniflora* 342. comosa 442.  
*Hippomane Mancinella* 372.  
*Hippophae rhamnoides* 48. 191. 349.  
*Hippuris vulgaris* 76.  
*Holcus Sorghum* 9. 79. 246. 326. bulbosus Schrad. 402. lanatus 454.  
*Holosteum umbellatum* praef.  
*Hordeum vulgare* 8. 20. 38. 80. hexastichon 80. 151. nudum 80. Zeocrithon 80. distichon 80. 151. murinum 201. secalinum 466.  
*Hottonia palustris* 161. 338.  
*Humulus Lupulus* 151. 206. 226.  
*Hura crepitans* 421.  
*Hyacinthus comosus* 169. 319. orientalis 149. 169. botryoides 319. racemosus 327. Muscari 339. non scriptus 396. cernuus 414. romanus 414.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 499

- Hydrocharis* Morfus ranae 344.  
*Hydrocotyle* vulgaris 395.  
*Hymenaea* Courbaril 376.  
*Hyoscyamus* albus 38. 162.  
     reticulatus 162. 250. au-  
     reus 162. pusillus 250.  
     muticus 250. Scopolia 338.  
*Hyoseris* lucida 100. radia-  
     ta 460.  
*Hypocoum* procumbens 160.  
     338. 350.  
*Hyperanthera* Moringa 90.  
     173. 261. 382.  
*Hypericum* Coris 46. 183.  
     342. Androsaemum 185.  
     342. hircinum 185. mon-  
     tanum 185. 320. 442. hir-  
     sutum 320. 442. pulcrum  
     320. elodes 406. serpylli-  
     folium 406. Ascyrum 460.  
     nummularium 460. balea-  
     ricum 419. humifusum 419.  
*Hypochoeris* glabra 356. ma-  
     culata 356. radicata 397.  
     helvetica 460.  
*Hyssopus* officinalis 179.  
  
*Iambolifera* pedunculata 381.  
*Iasione* montana praef.  
*Iasminum* Sambac 242. hu-  
     mile 242. fruticans 395.  
*Iatropha* Manihot 370. Cur-  
     cas 376. multifida 376.  
*Iberis* umbellata 342. 397.  
     pinnata 401. sempervirena  
     435. odorata 418. nudi-  
     caulis 466.  
*Ignatia* amara 251.  
*Ilex* Aquifolium 201. 337.  
*Illecebrum* Paronychia 165.  
     capitatum 401.  
*Impatiens* Noli tangere 318.  
*Imperatoria* Ostruthium 318.  
     sylvestris 323.  
*Indigofera* tinctoria 184. 266.  
     Anil 381.  
*Inga* fagifolia 372.  
*Inula* viscosa 46. 102. 343.  
     Helenium 47. 150. 188.  
     Pulicaria 102. 188. 343.  
     spiraeifolia 188. 450. Bu-  
     bonium 205. 420. germa-  
     nica 320. dysenterica 328.  
     crithmifolia 343. 398. odo-  
     ra 343. britannica 461.  
     provincialis 461. Oculus  
     420. ensifolia 420.  
*Ipomoea* Bona nox 412. Quam-  
     oclit 412.  
*Iris* florentina 37. 77. Sisy-  
     rinchium 77. 410. tubero-  
     sa 77. 218. 244. germani-  
     ca 158. foetidissima 158.  
     luliana 256. 410. grami-  
     nea 395. variegata 410.  
     aphylla 410. Pseudacorus  
     289. 313. juncea 410. lu-  
     tescens 410. pallida 437.

- Isatis tinctoria* 45. 181.  
*Isopyrum fumarioides* 178.  
   thalictroides 417. aquile-  
   gioides 458.  
*Juglans regia* 17. 104. 267.  
*Luneus maximus* 203. 448.  
   effusus 319. bufonius 339.  
   trigulum 355. 457. ad-  
   scendens 404. conglome-  
   ratus 404. pilosus 404. glau-  
   cus 404. 457. campestris  
   404. sylvaticus 437. acu-  
   tus 448. capitatus 448. al-  
   bidus 457. trifidus 457.  
*Juniperus Oxycedrus* 18. 106.  
   191. Sabina 191. com-  
   munis 106. nana 106.  
   phoenicea 344. lycia 344.  
*Ixia Bulbocodium* 410.  
  
*Kaempferia Galanga* 242.  
*Kernera oceanica* 404.  
*Knappia agrostiidea* Sm. 436.  
  
*Lachenalia serotina* 414.  
*Lactuca fativa* 99. perennis  
   185. 397. virofa 185. quer-  
   cina 343. saligna 348. 460.  
   angustana 450.  
*Lagoecia Cuminoides* 164.  
   339.  
*Lagurus ovatus* 454.  
*Lamium album* 179. purpu-  
   reum 179. maculatum 204.  
   laevigatum 314. incisum  
   434. Orvala 417. ample-  
   xicaule *praef.*  
*Lanaria plumosa* 396.  
*Lappago racemosa* 390.  
*Lapsana communis* 185. foe-  
   tida 443. pusilla 419.  
*Laserpitium hirsutum* 40. 85.  
   166. 441. Chironium 40.  
   149. 165. 395. formosum  
   85. latifolium 85. 165. 354.  
   serulaceum 85. Libanotis  
   165. 339. 351. filiaefolium  
   165. 290. Siler 318. 339.  
   pruthenicum 354. Archang-  
   gelica 412. angustissimum  
   447. aquilegifolium 456.  
*Lathraea Squamaria* 342. 348.  
*Lathyrus sativus* 98. Aphaca  
   98. 183. 392. amphicar-  
   pos 183. tuberosus 183.  
   328. Clymenum 183. la-  
   tifolium 355. setifolius 392.  
   459. angulatus 392. syl-  
   vestris 449. hirsutus 449.  
   Nissolia 449. pratensis *praef.*  
*Laurus Cassia* 12. 41. 90. 172.  
   195. 258. Cinnamomum  
   13. 41. 90. 172. nobilis  
   172. Camfora 217. 258.  
   indica 368. montana 369.  
   Persea 371. 415. Sassafras  
   376.  
*Lavandula Spica* 96. Stoe-

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 501

- chas* 179. *dentata* 417. *multifida* 417.  
*Lavatera arborea* 97. 182. *olbia* 182. 401. *maritima* 418. *trimestris* 459.  
*Lawsonia inermis* 12. 171. 258. 377. 379.  
*Ledum palustre* 340.  
*Lenina minor* 190. *trifulca* 405.  
*Leonurus Marrubiastrum* 180. *Cardiaca* 314. *Galeobdolon* 396.  
*Leontice Leontopetalum* 171. 340. *Chrysogonum* 171. 379.  
*Leontodon Taraxacum* 100.  
*Lepidium latifolium* 45. 181. 226. 328. *sativum* 181. *Iberis* 181. *ruderalis* 320. *alpinum* 454. *perfoliatum* 391. *petraeum* 442.  
*Leucoium vernum* 87. 314. *aestivum* 413. *autumnale* 413.  
*Ligusticum peloponnesense* 39. 166. 339. 351. 391. *Levisticum* 166. *austriacum* 404.  
*Ligustrum vulgare* 76. 142.  
*Lilium candidum* 11. 88. 144. 168. 256. *chalcedonicum* 88. 202. 413. *Martagon* 168. 327. *pomponium* 413. *pyrenaicum* 413.  
*Limodorum abortivum* 421.  
*Limonis acidissima* 572. *Limofella aquatica praef.*  
*Linnaea borealis* 459.  
*Linum usitatissimum* 11. *maritimum* 339. *tenuifolium* 339. 413. *catharticum* 355. *arborescens* 384. *strictum* 404. *campanulatum* 404. *hirsutum* 413. *alpinum* 413. *austriacum* 431. *narbonense* 457. *viscosum* 457.  
*Lithospermum officinale* 160. *fruticosum* 160. 384. *purpureo-coeruleum* 354. *apulum* 440.  
*Lobelia Dortmanna* 390. *urens* 456.  
*Lodoicea sechellensis* Labillard. 368.  
*Lolium temulentum* 80. 143. 227. *perenne* 159.  
*Lonicera Caprifolium* 161. *Periclymenum* 161. *alpigena* 390. *nigra* 412. *Xylosteum praef.*  
*Loranthus europaeus* 88.  
*Lotus corniculatus* 143. 184. *rectus* 184. *edulis* 385. 386. *hirsutus* 401. *siliquosus* 401. *angustissimus* 449. *diffusus* 460. *ornithopodioides* 432. *tetragonolobus* 419.  
*Lunaria annua* 127. *rediviva* 355. 397.  
*Lupinus albus* 46. 146.

*Lychnis chalcidonica* 91. 396.  
*sylvestris* 203. Flos cuculi  
 319. *Viscaria* 355.

*Lycium barbarum* f. euro-  
 paeum 82. 162. 383. afrum  
 412.

*Lycopodium Selago* 206. 357.  
*clavatum* 321. *complana-*  
*tum* 321. *denticulatum* 422.

*Lycopsis pulla* 338.

*Lycopus europaeus* 318. 337.

*Lygeum Spartum* 410.

*Lyfimachia Nummularia* 288.  
 326. *Ephemérum* 338. ne-  
 morum 390. *punctata* 412.  
*thyrsiflora* 412. *Linum stel-*  
*latum* 455.

*Lythrum Salicaria* 174. *Thy-*  
*mifolia* 448.

*Madrepora Acetabulum* 193.

*Malopè malacoides* 182.

*Malva rotundifolia* 45. 265.  
*sylvestris* f. *mauritiana* 182.  
*Alcea* 182. 314.

*Mammea americana* 370. 371.

*Mangifera indica* 381.

*Manicaria sacifera* 421.

*Marchantia conica* 192. po-  
*lymorpha* 321.

*Marrubium Pseudodictamnus*  
 45. 95. 180. 341. *creti-*  
*cum* 45. 95. 401. *Alysson*

131. *album* 180. *peregr-*  
*num* 417.

*Marsilea quadrifolia* 192. 344.  
 435.

*Matricaria Parthenium* 47.  
*Chamomilla* 47.

*Medicago sativa* 99. 184. 394.  
*arborea* 99. 146. 184. 342.  
*lupulina* 328. *marina* 402.  
*turbinata* 402. 449. *radia-*  
*ta* 406. *minima* 435. *ca-*  
*ronata* 449. *tuberculata*  
 449. *rigidula* 450. *orbicu-*  
*laris* 460. *maculata* 432.

*Melampyrum arvense* 96.  
*praeef.* *cristatum* 353. 458.  
*nemorosum praeef.* *sylvati-*  
*cum praeef.*

*Melia Azedarach* 261. 340.

*Melica uniflora* 400. *ciliata*  
 411. *nutans praeef.*

*Melissa cretica* 95. 130. 180.  
 405. *Nepeta* 130. *offici-*  
*nalis* 130. 145. 180. *Ca-*  
*lamintha* 180.

*Melittis Melissophyllum* 327.

*Memecylon tinctorium* 258.

*Menispermum Cocculus* 271.

*Mentha Pulegium* 44. 179.  
*sativa* 44. 95. 179. *sylve-*  
*stris* 95. 179. *cervina* 179.  
 391. *aquatica* 226. *crispe*

## PLANTARUM SYSTEMATICA. 503

- 227. rubra* 314. *rotundifolia* 396, *gracilis* 466.  
*Menyanthes trifoliata* 82. 348.  
*Merulius lobatus* 422.  
*Mercurialis annua* 48. 191.  
*perennis* 328, *tomentosa* 422.  
*Mespilus* *Cotoneaster* 93. *Pyra-  
 cantha* 93. 176. *Chamaeme-  
 spilus* 391. *germanica praef.*  
*Michauxia campanuloides*  
 379.  
*Micropus erectus* 421.  
*Mimosa polyacantha* 55. 107.  
*pubida* 372. 382.  
*Mirabilis dichotoma* 456.  
*Mitridatia quadrisida* 125.  
*Mnium roseum* 462.  
*Moechringia muscosa* 434.  
*Moluccella laevis* 341. *spi-  
 nosa* 401.  
*Momordica Elaterium* 191.  
 269. *Balsamina* 398.  
*Monotropa Hypopitys* 457.  
*Montia fontana* 431.  
*Morchella esculenta* 109. 422.  
*Morus nigra* 105.  
*Musa paradisiaca* 88. 257.  
 338. *sapientum* 375.  
*Mussaenda frondosa* 249.  
*Myagrurn saxatile* 352. *per-  
 enne* 459. *perfoliatum* 459.  
*paniculatum* 459.
- Myosotis scorpioides* 160.  
*Lappula* 201. 318. *palu-  
 stris* 354.  
*Myosurus minimus* 319.  
*Myrica* *Gale* 206. 398.  
*Myriophyllum spicatum* 190.  
 461. *verticillatum* 421.  
*Myristica molchata* 192. 272.  
 344.  
*Myrtus communis* 14. 42. *Pi-  
 menta* 367.  
*Najas monosperma* 450.  
*Narcissus orientalis* 11. 87.  
 168. 255. *calathinus* 11.  
 87. 306. 413. *Ionquilla*  
 11. 255. *poeticus* 35. 41.  
 144. 168. *serotinus* 144.  
 413. *biflorus* 306. *Pseu-  
 donarcissus* 168. 314. *mi-  
 nor* 413. *triandrus* 413.  
*Tazetta* 413. *molchatus*  
 413.  
*Nardus stricta* 403.  
*Neckera pennata* 462.  
*Nelumbium speciosum* 29. 43.  
 94. 177.  
*Neottia spiralis* 189. 314. *re-  
 pens* 432.  
*Nepenthes destillatoria* 374.  
*Nepeta Nepetella* 181. *nu-  
 da* 181. 449. *italica* 204.  
*Scordotis* 204. 385. *tube-  
 rosa* 417. *Cataria praef.*

- Nerium* Oleander 10. 163.  
252.
- Nicotiana* Tabacum 369. 373.  
375. fruticosa 373. glutinosa 373. rustica 373.
- Nigella* lativa 14. 43. 177.  
341. arvensis 341. damascena 341. hispanica 458. orientalis 458.
- Nicotianhes* Arbor tristis 380.
- Nymphaea* alba 94. 177. Lotus 94. 177. 384. lutea 94. 177.
- Ocimum* Basilicum 49. 96. 181.  
222. 227. 265. monachorum 265. 449.
- Oenanthe* pimpinelloides 86.  
166. 339. crocata 339. fistulosa 339. peucedanifolia 434.
- Oenothera* biennis 384.
- Olea* europaea 7. 19. 37.
- Ononis* antiquorum 97. 127.  
130. 183. 406. Natix 205. rotundifolia 406. pinguis 435. Columnae 442. Cheraleri 449.
- Onopordon* Acanthium 100.  
186.
- Onosma* orientalis 129. echinoides 160. 338. simpliciflora 384.
- Ophiorrhiza* Mungos 247.
- Ophioxylon* serpentinum 381.
- Ophrys* myodes 344. anthropophora 344. 443. apifera 407. aranifera 407. Monorchis 407. alpina 461.
- Orchis* Morio 102. 131. 189.  
267. 344. pyramidalis 189. bifolia 189. 356. mascula 343. conopsea 344. maculata 344. coriophora 344. nigra 344. odoratissima 349. hircina 398. variegata 406. militaris 406. globosa 435. tephrosanthes 443. viridis 461. sambucina 421.
- Origanum* creticum 44. 95.  
180. Dictamnus 45. 96. 145. 180. 341. aegyptiacum 383. heracleoticum 95. 180. 341. maioranoides 95. 180. Tournefortii 96. Onites 130. 180. 341. Maru 385. syriacum 405.
- Ornithogalum* stachyoides 163.  
396. nutans 168. 414. lateum 327. narbonense 395. comosum 414. arabicum 414. pyrenaicum 414. latifolium 434.
- Ornithopus* compressus 183.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 505

- 435. scorpioides* 342. *per-*  
*pufillus* 435.  
*Orobanche tinctoria* 96. *ela-*  
*tior* 181. 341.  
*Orabus vernus* 183. 355. 442.  
*tuberosus* 355. *niger* 397.  
*canescens* 449. *luteus* 459.  
*Ortegia hispanica* 411.  
*Oryza sativa* 88. 171. 339.  
*Osmunda regalis* 321.  
*Ostrya vulgaris* 105.  
*Ostrya alba* 402.  
*Oxalis Acetosella* 130. 222.  
*stricta* 203.  
*Oxytropis pilosa* 459.  
*Paeonia officinalis* 43. 177.  
*227. corallina* 177.  
*Pancratium maritimum* 87.  
*413. illyricum* 168. 339.  
*Pandanus odoratissimus* 270.  
*Panicum Dactylon* 201. 227.  
*411. verticillatum* 201. 437.  
*sanguinale* 227. 411. *itali-*  
*cum* 38. 200. 208. *milia-*  
*ceum* 200. *viride* 466.  
*Papaver somniferum* 25. 144.  
*176. Rhoeas* 93. 176. *du-*  
*bium* 176. *hybridum* 177.  
*Argemone* 177. 405. *alpi-*  
*num* 458. *cambricum* 458.  
*Parietaria officinalis* 159. 213.  
*Paris quadrifolia* 319. 327.  
*Parmelia iubata* 193. *pul-*  
*monacea* 328. *Roccella* 353.  
*luciformis* 353.  
*Parnassia palustris* 168. 348.  
*Passerina hirsuta* 415.  
*Passiflora coerulea* 372. *in-*  
*carnata* 376.  
*Pastinaca Opopanax* 40. 86.  
*167. 338. sativa* 128. 149.  
*167. Secacul* Ruff. 254. 379.  
*Pavetta indica* 382.  
*Pedicularis sylvatica* 319. *flam-*  
*mea* 391. *fasciculata* 397.  
*foliolosa* 418. *rostrata* 418.  
*Peganum Harmala* 174. 263.  
*Peltaria alliacea* 418.  
*Penaea mucronata* 159.  
*Peplis Portula* 445.  
*Periploca angustifolia* 163.  
*graeca* 338. *Secamone* 383.  
*Peucedanum officinale* 39. 85.  
*165. Silaus* 164. 202. *arc-*  
*narium* 412. *alsaticum* 447.  
*Peziza Auricula* 422.  
*Phuca baetica* 419.  
*Phalangium ramosum* 348.  
*Liliago* 348.  
*Phalaris aquatica* 159. *ca-*  
*nariensis* 217. *arundina-*  
*cea* 437.  
*Phallus impudicus* 422.  
*Phaseolus vulgaris* 97. 183.  
*226. 266. multiflorus* 266.  
*Mungo* 266. 381.  
*Phellandrium Mutellina* 127.



166. 339. 349. aquaticam  
*praeef.*  
*Philadelphus coronarius* 134.  
 410  
*Phillyrea latifolia* 76. 157.  
 337. angustifolia 76. 337.  
*Phleum Michellii* 447. pra-  
 tense 454.  
*Phlomis fruticosa* 180. 341.  
 italica 180. 401. *Lychni-*  
*tis* 180. 396. *Herba venti*  
 405.  
*Phoenix dactylifera* 19. 29.  
*Phucagrostis maior* 29. 105.  
 148.  
*Phyllanthus Emblica* 218.  
 267.  
*Physalis Alkekengi* 162. som-  
 nifera 82. 162. angulata  
 431.  
*Phyteuma comosum* 352. pin-  
 natum 353. orbiculare 440.  
 pauciflorum 447. spica-  
 tum *praeef.*  
*Picris hieracioides* 320.  
*Pimpinella Anisum* 40. 167.  
*Saxifraga* 167. 221. dioica  
 167. peregrina 167. 413.  
 nigra 326. 437.  
*Pinguicula alpina* 410. vul-  
 garis 411.  
*Pinus Cedrus* 16. 266. Com-  
 bra 16. 206. 268. 344. pi-  
 cea 16. 27. 105. 147. La-  
 rix 28. 105. *Abies* 28. 105.  
*Pinea* 48. 105. 147. 268.  
*halepensis* 105. 265. 344.  
*maritima* 105. 344. *orien-*  
*talis* 268. *Pinastr* 206.  
*Mughas* 344. *Pumilio* 421.  
*Piper nigrum* 37. 77. 157.  
 244. *Betle* 195. 337. *Cu-*  
*beba* 217. 243. *Malageta*  
 217. 243. *longum* 244.  
*Pistacia vera* 18. 123. 130.  
*Lentiscus* 18. *Terebinthus*  
 18. 48. 148. 191. 344. re-  
 ticulata 402.  
*Pistia Stratiotes* 182. 383.  
*Pisum Ochrus* 98. *fativum*  
 25. 46. 98.  
*Plantago maior* 82. 213. 400.  
*Cynops* 82. *Coronopus* 82.  
 160. *media* 160. *altissima*  
 160. *Psyllium* 160. *afra*  
 334. *Wulfenii* 337. 351.  
*Lagopus* 379. *squarrosa*  
 383. *albicans* 400. *suba-*  
*lata* 403. *Bellardi* 411. *cre-*  
*tica* 411. *alpina* 433. *Ser-*  
*raria* 440. *lanceolata praeef.*  
*serpentina Vill. praeef.*  
*Platanus orientalis* 17. 27.  
 377.  
*Plumbago europaea* 161. 202.  
*Poa alpina* 400. *dura* 400.  
*megastachya* 411. *aquatica*

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 507

403. *Suitans* 403. com-  
pressa 454. bulbosa 455.
- Polemonium* coeruleum 161.
- Polianthes* Tuberosa 382. 414.
- Polycarpon* tetraphyllum 433.
- Polycnemum* arvense 437.
- Polygala* amara 183. vulga-  
ris 320. *Chamaebuxus*  
591. maior 418. monspe-  
liaca 435.
- Polygonum* Persicaria 41. 172.  
227. 314. maritimum 89.  
130. 172. 405. *Hydropiper*  
172. incanum 172. du-  
metorum 172. *Convolvulus*  
214. aviculare 222. 437.  
amphibium *praeef.* divari-  
catum 89. *Bistorta* 313.  
lapathifolium 405. vivipa-  
rum 415. minus 466.
- Polypodium* vulgare 107. 192.  
*Filix mas* 192. *Dryopteris*  
192. quercifolium 422.  
calcareum 422. ilvense 435.
- Polypogon* monspeliensis 454.
- Populus* alba 18. 28. 148. ni-  
gra 28. graeca 48. bal-  
samifera 376.
- Portulaca* oleracea 97.
- Potamogeton* serratus 82. 390.  
atans 160. pusillus 201.  
5. crispus 318. 'perfo-  
atus 354. densus 411.
- setaceus 455. pectinatu  
455.
- Potentilla* argentea 43. *praeef.*  
reptans 222. recta 287.  
314. alba 319. aurea 416.  
Clusiana 416. opaca 416.  
supina 416. caulescens  
458. intermedia 458. An-  
serina *praeef.* verna *praeef.*  
ruepstris *praeef.*
- Poterium* spinosum 103. 190.  
330.
- Prenanthes* purpurea 100. 356.  
muralis 435. hieracifolia  
442. viminea 442.
- Prinula* vulgaris 201. 228.  
Auricula 338. 390. veris  
305. 326. elatior 326. mar-  
ginata 390. farinosa 349.  
412. integrifolia 349. 411.  
glutinosa 412. minima 412.
- Prunus* Cerasus 92. dome-  
stica 92. insititia 92. Pa-  
dus 92. *Chamaecerasus*  
203. 340. 351. Mahaleb  
203. 263. Armeniaca 54.  
176. spinosa 293. Lauro-  
cerasus 377. lusitanica 340.  
semperflorens 448.
- Prunella* grandiflora 417.
- Psidium* pomiferum et pyrife-  
rum 371.
- Psoralea* bituminosa 46. 184.  
542. americana 406.

- Pteris longifolia* 386. cretica 392. crispata 451.  
*Pterocarpus fantalinus* 15. 266.  
*Pulmonaria officinalis* 201. 227. suffruticosa 455.  
*Punica Granatum* 13. 25. 42. 92.  
*Pyrethrum corymbosum* 320. Halleri 461. Parthenium 188. alpinum 420.  
*Pyrola rotundifolia* 319. secundata 415. uniflora 415. umbellata 415.  
*Pyrus Cydonia* 13. 92. 228. Malus 25. communis 25. Amelanchier 92. 416. cretica 92. 384. torminalis 92. 203. Aria 92. 228. 401. dioica 448. Pollveria 448.  
*Quercus Aegilops* 104. 334. Ballota 104. 267. Cerris 104. coccifera 104. 190. Esculus 17. 27. 104. 334. faginea 104. Ilex 17. 27. 103. 147. Pseudosuber 104. 344. Robur 147. Suber 104. Tournefortii 104. falicifolia 371. humilis 421. austriaca 421.  
*Radiola Millegrana* Smith. 401.  
*Ranunculus creticus* 44. 417. grandiflorus 44. Ficaria 95. 178. hirsutus 145. 178. 341. aconitifolius 178. 355. sceleratus 178. 327. Seguieri 178. Thora 204. 227. 341. polyanthemus 204. 327. 341. acris 327. auricomus 327. bulbosus 327. 348. arvensis 348. Flammula 348. 396. rutaefolius 352. illyricus 353. 417. muricatus 385. Gouani 341. gramineus 405. faicatus 405. hederaceus 434. platanifolius 434. chaerophyllus 441. parvulus 441. plantagineus 418. pyrenaeus 448. glacialis 449. montanus 449. lanuginosus 458. amplexicaulis 417. bullatus 417. alpestris 417. aquatilis *praeef.* fluviatilis *praeef.* repens *praeef.* Lingua *praeef.*  
*Raphanus sativus* 97. 220.  
*Reaumuria vermiculata* 379.  
*Reseda Luteola* 144. 340. Phytolacca 174. 350. alba 175. 405. Clusii 415.  
*Rhagadiolus edulis* 450.  
*Rhamnus infectorius* 202. 163. 390. saxatilis 163. 202. Alternans 83. 202. 412. lycioides 83. 412. divaricans

## PLANTARUM SYSTEMATICA. 509

383. alpinus 456. *Frangula*  
*praef.* catharticus *praef.*  
*Rheum* Rhaponticum 173. 210.  
 222. 227. Rhabarbarum 215.  
 259. palmatum 259. Ri-  
 bel 259. 379.  
*Rhinanthus* Crista galli 204.  
 Elephas 441. Trixago 441.  
*Rhizobolus* butyrosus Gärtner.  
 417.  
*Rhizophora* Mangle 91. 382.  
*Rhodiola* rosea 191. 320.  
*Rhododendron* ponticum 90.  
 ferrugineum 391. hirsutum  
 405. Chamaecistus 415.  
*Rhus* Coriaria 41. 86. 168.  
 Cotinus 91. 202. glabra  
 456. typhina 456.  
*Ribes* nigrum 202. rubrum  
 297. alpinum 456.  
*Ricinus* communis 17. 48. 191.  
*Rosa* canina 43. 176. mo-  
 schata 59. centifolia 93.  
 damascena 144. 203. ar-  
 venis 348. sempervirens  
 416. spinosissima 416. to-  
 mentosa Sm. 448. rubigi-  
 nosa 466.  
*Rosmarinus* officinalis 157.  
*Rubia* tinctorum 38. 81. 160.  
 220.  
*Rubus* sanctus 14. frutico-  
 sus 93. 176. 228. caesius  
 93. 222. idaeus 93. 176.
- laxatilis 355. Chamaemo-  
 rus 416.  
*Rudbeckia* laciniata 461.  
*Rumex* Patientia 89. 171.  
 319. acutus 171. 220. 227.  
 obtusifolius 171. *praef.* di-  
 varicatus 171. aquaticus 171.  
*praef.* scutatus 396. tu-  
 berosus 396. bucephalo-  
 phorus 441. Lunaria 448.  
 pulcher 448. digynus 457.  
 tingitanus 457. vesicarius  
 457. aculeatus 457. spi-  
 nosus 457. crispus *praef.*  
 alpinus *praef.* sanguineus  
*praef.*  
*Rupia* maritima 334. 455.  
*Ruscus* aculeatus 48. 106. 148.  
 192. Hypophyllum 107. 192.  
 208. racemosus 107. 192.  
 Hypoglossum 192. 222.  
*Ruta* graveolens 42. 130. 173.  
 montana 415.  
*Rynchospora* alba 466.  
*Saccharum* cylindricum 8. 80.  
 433. officinarum 245.  
*Sagittaria* sagittataefolia 348.  
*Salicornia* fruticosa 334. her-  
 bacea *praef.*  
*Salix* alba 105. babylonica  
 270. 380. Helix 270. riparia  
 270. vitellina 151. 148.  
 viminalis 151. caprea 147.

- argentea* 148. *egyptiaca* 270. 380. *myrtilloides* 349. *reticulata* 349. 450. *fusca* 398. *Amaniana* 450. *arbutifolia* 450. *herbacea* 461. *retusa* 461. *aurita* 466.  
*Salfolia* *Tragus* 164. 338. *polyclonos* 164. *fruticosa* 253. *Soda* 338.  
*Salvia* *cretica* 76. 37. *triloba* 76. 37. 410. *Horminum* 76. 157. 337. *argentea* 157. *Verbenaca* 200. 313. *haematodes* 243. *Sclarea* 318. *pomifera* 334. 377. *ceratophylla* 390. *calycina* 390. *glutinosa* 402. 410. *austriaca* 410. *sylvestris* 410. *verticillata* 410. *hispanica* 436. *pratensis praef. officinalis praef.*  
*Salvinia* *nataus* 462.  
*Sambucus* *Ebulus* 41. 144. 168. 228. *nigra* 87. 168. *racemosa* 319.  
*Samolus* *Valerandi* 202. 404.  
*Sanguisorba* *officinalis* 159.  
*Sanicula* *europaea* 314.  
*Santalum* *album* 248.  
*Santolina* *Chamaecyparissus* 102. 186. *maritima* 186. 343. *squarrosa* 420. *rosmarinifolia* 420.  
*Saponaria* *ocimoides* 274. 340. *Vaccaria* 203. 348. *officinalis* 327. *cretica* 384.  
*Sarracenia* *purpurea* 416. *flava* 434.  
*Satureia* *capitata* 45. 95. 145. 150. 341. *Thymbra* 95. 145. 179. *graeca* 130. 179. 385. *montana* 341. *juliana* 341. *spinosa* 387.  
*Saxifraga* *Cotyledon* 42. 340. 457. *Hirculus* 173. *Aizoon* 348. 434. *granulata* 314. 327. *adscendens* Vahl. 351. 352. *tridactylites* 355. *autumnalis* 391. *Burseria* 405. *caesia* 415. *Hirculus* 415. *aizoides* 415. *bryoides* 441. *androsacea* 441. *bulbifera* 441. *stellaria* 448. *cuneifolia* 448. *mofchata* Wulf. 448. *aspera* 448. *oppositifolia* 457. *petraea* Vahl. 457. *caespitosa* 457.  
*Scabiosa* *Columbaria* 313. 354. *arvensis* 354. *ochroleuca* 354. *limonifolia* 384. *prolifera* 390. *alpina* 400. *sylvatica* 411. *stellata* 411. *atropurpurea* 411. *palaestina* 440. *graminifolia* 455. *Succisa praef.*  
*Scandix* *Cerofolium* 149. 166. 326. *odorata* 166. *Pecten* 202. *australis* 339.

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 511

- Scheuchzeria palustris* 457.  
*Schinus* Molle 422.  
*Schoenus nigricans* 77. 158.  
     *mucronatus* 78. 158. 400.  
     451.  
*Scilla maritima* 30. 41. 51.  
     169. *hyacinthoides* 88. 414.  
     *amoena* 319. *bifolia* 327.  
     *Liliohyacinthus* 404. *autumnalis* 414. *peruviana* 414.  
     *verna* 414. *unifolia* 449.  
*Scirpus articulatus* 8. *maritimus* 8. *præf.* *Tabernaemontani* Gmel. 437. *acicularis* 454. *caespitosus* 454. *Holoschoenus* 454.  
     *triqueter* 454. *fluitans* 454.  
     *lacustris* *præf.* *sylvaticus* *præf.*  
*Scleranthus polycarpus* 434.  
     *annuus* 437. *perennis* 437.  
*Scolopendrium officinale* 108.  
     192.  
*Scolymus maculatus* 101. 420.  
     *hispanicus* 420.  
*Scorpiurus sulcata* 184. 397.  
*Scorzonera tuberosa* 185. 379.  
     *glastifolia* 343. 356. *hispanica* 343. *purpurea* 419.  
     *rosea* 419. *humilis* 419.  
     *hirsuta* 442.  
*Scrofularia aquatica* 328. *sambucifolia* 385. *canina* 405.  
     *tanacetifolia* 418. *peregrina* 432. *vernalis* 459. *nodosa* *præf.*  
*Scutellaria galericulata* 355.  
     *Columnae* 441. *alpina* 458.  
     *minor* 466.  
*Secale villosum* 80. *cereale* 80. 151.  
*Sedum Anacampseros* 42. 174.  
     91. 415. *album* f. *acre* 42.  
     *præf.* *Cepaea* 174. 340.  
     *stellatum* 174. 441. *dasyphyllum* 340. 454. *reflexum* 394. *villosum* 415.  
     *saxatile* 448. *atratum* 458.  
     *Telephium* 313.  
*Selinum Oreoselinum* 165.  
     348. 395. *Carvifolia* 318.  
     *Cervaria* 326. 355. *palustre* 348. *Chabraei* 451.  
*Semecarpus Anacardium* 209.  
     253.  
*Sempervivum tectorum* 42.  
     92. 176. *arboreum* 176.  
     340. *sediforme* 176. *arachnoideum* 441.  
*Senecio vulgaris* 102. 314.  
     *Iacobaea* 188. *incanus* 352.  
     *sarracenicus* 356. *paludosus* 356. *viscosus* 398. *nemorensis* 450. *aquaticus* 450. *linifolius* 460. *abrotanifolius* 420. *carniolicus* 420. *alpinus* 420. *Doronicum* 420. v

- Serapias* Lingua 189. 443.  
*Serratula* alpina 343. tinctoria 356. discolor 420.  
*Sesamum* orientale 45. 95. 383.  
*Seseli* elatum 166. 434. tortuosum 167. 431. Turbith 249. Ammoides 339. 429. annuum 355. montanum 404. Hippomarathrum 412. glaucum 448. pyrenaicum 456.  
*Sesleria* coerules 454. echinata 454.  
*Sherardia* arvensis 431. muralis 440.  
*Sibbaldia* procumbens 457.  
*Sida* indica 432.  
*Sideritis* lyriaca 341. scor-dioides 401. hirsuta 417. hyssopifolia 417. mentana 441. romana 449.  
*Silene* baccifera 203. Saxifraga 340. acaulis 552. conoidea 405. maritima 405. conica 415. Muscipula 415. quinquevulnera 415. alpestris 415. Armenia 415. polyphylla 415. Pumilio 415. fruticosa 432. noctiflora 432. rupestris 458.  
*Sinapis* nigra 452.
- Sison* Ammi 166. 395. verticillatum 434. legetum 466.  
*Sisymbrium* Nasturtium 182. 227. Sophia 320. Löselii 328. tenuifolium 328. polyceratum 342. obtusangulum 449. amphibium 459. strictissimum 342. 431. Irio 401. 442. Columnae 442. arenosum 459. asperum 459. terrestre 469.  
*Sium* Silarum 149. 166. 202. 226. 319. angustifolium 220. 127. 166. 326. Falcaria 319.  
*Smilax* alpera 106. 191. 320. Sarsaparila 344. 376. nigra 422. Pseudochina 422. China 375. 376. 381.  
*Smyrniun* Olus atrum 39. 86. 149. 167. 220. perfoliatum 167. 339.  
*Solanum* insanum 10. 82. 162. 227. 250. nigrum 38. 162.  
*Melongena* 82. 228. 250. 379. Dulcamara 227. 319. aethiopicum 250. Lycopersicon 334. tuberosum 369. 372. 412. sanctum 379. Pseudocapficum 390.  
*Solidago* mexicana 460.  
*Sonchus* maritimus 100. 460. oleraceus 185. alpinus 356. coeruleus Sm. 431. arvensis praef. tenerimus

# PLANTARUM SYSTEMATICA. 513

460. *picroides* 435. *palustris praef.*  
*Sorbus domestica* 43. 93.  
*Sparganium* *ramosum* 222.  
*Spartium* *scoparium* 80. *praef.*  
*Scorpius* 96. 418. *horridum* 134. 385. *juncum* 150. 146. 183. 266. *spinosum* 183. 266. 342. *monospermum* 328. *sphaerocarpum* 418. *multiflorum* 438. *radiatum* 442. *purgans* 449.  
*Spergula* *nodosa* 458. *arvensis praef.*  
*Spinachia* *oleracea* 216. 270.  
*Spiraea* *falicalia* 93. 416.  
*Ulmaria* 204. *Filipendula* 277. 327. *hypericifolia* 458.  
*Spondias* *Mombin* 371.  
*Stachys* *germanica* 179. *heliacalea* 180. *recta* 342. *palustris* 391. 466. *hirta* 417. *cretica* 458. *arvensis* 458. *sylvatica* 466.  
*Stachelina* *Chamaepeuce* 186. *arborescens* 385. *dubia* 402. *fruticosa* 406.  
*Staphylea* *pinnata* 202. 319.  
*Statice* *Armeria* 202. 226. *sinuata* 379. *Echinus* 384. *oleaeifolia* 401. *cordata* 457. *minuta* 457. *Limonium praef.*  
*Stellaria* *nemorosum* 174. *me-*  
*dia* 226. *Holostea* 327. *uliginosa* 437.  
*Scallera* *Pallerina* 319.  
*Sternbergia* *colchiciflora* 414.  
*Stillingia* *sebifera* 268.  
*Stipa* *tenacissima* 79. 200. 411. *pennata* 411. *capillata* 437.  
*Stratiotes* *aloides* 353. 398.  
*Strychnos* *Nux vomica* 250. 380. *celubrinus* 250. 380.  
*Sweetia* *perennis* 390.  
*Styrax* *officinale* 173. 340.  
*Symphytum* *officinale* 160. *tuberosum* 404.  
*Syringa* *vulgaris* 337. *persica* 345. 453.  
*Tagetes* *patula* 188. 320. 328.  
*Tamarindus* *indica* 218. 265.  
*Tamarix* *gallica* 22. 143. 168. *orientalis* 254.  
*Tamus* *communis* 48. 106. 191.  
*Tanacetum* *vulgare* 220. 276. *annuum* 420.  
*Targionia* *hypophylla praef.*  
*Taxus* *baccata* 106. 191.  
*Telephium* *Imperati* 353. 413.  
*Terminalia* *Obbbula* 262. 381. *Vernix* 283. *latifolia* 370. *Benzoin* 381.  
*Teucrium* *Scordium* 44. 179.  
*Pleudhyssopus* 44. 179. 441.  
*Polium* 44. 95. 179. *Cha-*  
Tom. I.



# 514 INDEX IV. NOMINA

- maedryi* 95. 179. 222. 319.  
*creticum* 95. 127. 179. 385.  
*Scorodonia* 204. *Betys*  
 178. 319. 327. *Pseudo-*  
*Chamaepitys* 178. *Marum*  
 179. *lucidum* 179. *mon-*  
*tanum* 179. 541. 417. *ca-*  
*pitatum* 341. *brevifolium*  
 387. *Achaemenis* 396. *gna-*  
*phalodes* 396. *lupinum* 396.  
*spinosum* 458. *fruticans* 417.  
*Thalictrum minus* 178. 348.  
*angustifolium* 458. *foeti-*  
*dum* 458. *asquilegifolium*  
*praef.* *flavum praef.*  
*Thapsia Asclepium* 40. 86.  
 167. 339. *garganica* 288.  
 351. 353. *foetida* 339. *vil-*  
*losa* 413.  
*Thea viridis* 264.  
*Thelygonum Cynocrambe*  
 103. 190. 461.  
*Theobroma Cacao* 372.  
*Thesium Linophyllum* 202.  
 354.  
*Thlaspi campeltre* 181. 320.  
*Bursa* 326. *saxatile* 342.  
 442. *alliaceum* 449. *per-*  
*foliatum* 442. *peregrinum*  
 449. *hirtum* 459. *monta-*  
*num* 418. *alpestre* 418.  
*Thrinax parviflora* 371.  
*Thrinicia hirta* 442.  
*Thuia articulata* 105. *occi-*  
*dentalis* 398.  
*Thymbra spicata* 14. 45. 265.  
*verticillata* 265.  
*Thymus vulgaris* 96. 145.  
 180. *Zygis* 130. 180. 417.  
*Tragoriganum* 130. 180. 341.  
*Serpyllum* 145. 180. *Ac-*  
*inos* 180. *Mastichina* 396.  
*alpinus* 417. *pannonicus*  
 417.  
*Tilia europaea* 94. 144. *al-*  
*ba* 94.  
*Tillandsia utriculata* 404.  
*Tofieldia palustris* 414.  
*Tolpis barba* 443.  
*Tolvisera Ballamum* 372. 376.  
*Tordylium officinale* 39. 85.  
 164. 351. *syriacum* 404. *ma-*  
*ximum* 412. *peregrinum* 432.  
*Tormentilla erecta* 43. 93. 176.  
*Tozzia alpina* 441.  
*Tradescantia virginica* 457.  
*Tragopogon crocifolius* 100.  
 185. 442. *lanatus* 380. *e-*  
*rientalis* 431. *pratensis*  
*praef.*  
*Trapa natans* 160.  
*Trianthema fruticosum* 174.  
*Tribulus terrestris* 91. 174.  
*Trichostomum ericoides* 462.  
*Tricentalis europaea* 355.  
*Trifolium arvense* 46. 184.  
*creticum* 230. 184. 460. *ita-*

## PLANTARUM SYSTEMATICA. 515

- Licum* 205. 431. indicum 267. fragiferum 307. 419. ochroleucum 328. alpinum 352. clypeatum 385. uniflorum 385. rubens 397. agrarium 397. angustifolium 401. alpestre 419. squarrosum 419. montanum 419. resupinatum 449. tomentosum 449. Cherleri 460. saxatile 460. scabrum 460. spumosum 460. spadiceum 460. lappaceum 460. filiforme 466. maritimum 466.
- Triglochin* palustre 319. maritimum 404.
- Trigonella* Foenum graecum 46. polycerata 342. 397. hamosa 383. corniculata 397.
- Trillium* cernuum 457.
- Triticum* Spelta 9. 21. 81. 151. 159. Zea 21. 81. 159. aestivum 9. 80. hybernum 20. 80. repens 81. 159. 227. rigidum 455. pinnatum 455.
- Trollius* europaeus 341.
- Tropaeolum* maius et minus 376.
- Tuber* cibarium 109.
- Tulipa* Gesneriana 391. sylvestris 395. suaveolens 404.
- Turritis* hirsuta 459. glabra *praef.*
- Tussilago* Farfara 47. 188.
- Petalites* 188. alpina 343. alba 431.
- Typha* latifolia 103. 147. 190. minor 402.
- Ulex* nanus 392. europaeus 397.
- Ulmus* campestris 23.
- Ulua* Lactuca 109. 407. intestinalis 353. umbilicalis 407. plicata 431. Linza 451. Pavonia 462.
- Urtica* dioica 47. urens 190. balearica 320.
- Utricularia* vulgaris 403.
- Uvularia* amplexifolia 168. 339. perfoliata 457.
- Vaccinium* Oxycoccus 548. 355. uliginosum 355. Myrtillus *praef.* Vitis idaea *praef.*
- Valantia* muralis 440. Cruciata *praef.*
- Valeriana* celtica f. tuberosa 129. 142. 158. 227. 337. 351. Saliunca 142. Spica 159. Dioscoridis 157. italica 200. 353. officinalis 326. dioica 337. 437. montana 351. 453. Tripteris 453.
- Velesia* rigida 456.
- Vella* Pseudocytisus 405. annua 418.

## 516 INDEX IV. NOMINA PLANT. SYST.

- Veratrum* album 49. 83. 171.  
 318. nigrum *præf.*  
*Verbascum* Boerhaavii 38. ni-  
 grum 82. 338. *Lychnitis*  
 129. 162. 338. ferrugineum  
 162. sinuatum 161. 338.  
*Thapsus* 161. phlomisoides  
 318. pulverulentum 338. spi-  
 nosum 387. virgatum With.  
 404. Myconi 434.  
*Verbena* officinalis 127. 145.  
 179. supina 179. 200. no-  
 diflora 353.  
*Veronica* serpyllifolia 313.  
 Beccabunga 318. 326. Cha-  
 maedrys 318. agrestis 326.  
 436. saxatilis 352. triphyl-  
 los 354. 436. longifolia  
 395. maritima 395. aphyll-  
 la 410. dentata 410. la-  
 tifolia 410. prostrata 410.  
 alpina 410. spicata 410.  
 spuria 410. urticaefolia  
 433. hederæfolia 436. ar-  
 venfis 436. montana 440.  
 austriaca 447. bellidioides  
 453. scutellata 453.  
*Viburnum* Lantana 143. Ti-  
 nus 202. Opulus 339.  
*Vicia* Faba 15. 25. 46. 98.  
 dumetorum 320. 438. la-  
 thyroides 328. narbonen-  
 sis 397. platycarpa 449.  
 onobrychioides 449. oro-  
 boides 419. amphicarpa  
 419. fordida 419. pififor-  
 mis 419. *Cracca præf.*  
*Vinca* maior et minor 163.  
*Viola* odorata 22. 38. 83. 163.  
 313. tricolor 313. palu-  
 stris 313. biflora 349. pin-  
 nata 412. grandiflora 412.  
*Viscum* album 106.  
*Vitex* Agnus 45. 181. 228.  
 trifolia 204. Negundo 381.  
*Vitis* vinifera 10. 22. indica 371.  
*Wulffenia* Buonarota 352.  
*Xanthium* orientale 47. stru-  
 marium 190.  
*Xeranthemum* annuum 343.  
 orientale 407.  
*Yucca* Draconis 414.  
*Zacyntha* verrucosa 345.  
*Zamia* fursfuracea 375.  
*Zannichellia* palustris 461.  
*Zea* Mays 320. 328. 369.  
*Zingiber* Malaguetta 367.  
*Zizyphus* vulgaris 10. 58. 83.  
 162. 252. 338. Paliurus 10.  
 83. 143. 162. 252. Lotus  
 23. 85. 143. 215. 251. 338.  
 Iuuba 134. Spina Christi 383.  
*Zosteria* marina 29. 49.  
*Zygophyllum* Fabago 261. 379.

## INDEX V.

## SYNONYMA.

- Abies 147. 353.  
 Abrotanum 398. 420.  
 Absinthium 343. 398. 407.  
     443. 420. 431. 460.  
 Abutilon 432.  
 Acacia 276. 293. 342.  
 Acanthoides 443.  
 Acanthus 147.  
 Acarna 407. 445.  
 Acetosa 441. 457.  
 Acinaria 553.  
 Aconitum 327. 341. 343. 416.  
     *præf.*  
 Acorus 293.  
 Acus mosehata 323.  
 Adiantum 451.  
 Adoreum frumentum 151.  
 Adropia 220.  
 Aegilops 318. 437.  
 Aegolethron 201.  
 Affodillus 293.  
 Agalloehum 288.  
 Ageratum 434. 435.  
 Agrifellum 287.  
 Agrostis 327.  
 Agul 377.  
 Aizoon 434.  
 Alant 215.  
 Alcea 320. 418. 432. 435.  
 Alecterolophus 204. 418.  
 Alga 148. 138. 353. 404. *præf.*  
 Alisma 320. 343. 348. 366.  
 Alleluja 222.  
 Allium 457.  
 Aloë 293. 431.  
 Alsinanthemum 355.  
 Alsiue 326. 396. 415. 454.  
     436. 437. 448. 458.  
 Althaea 397. 401. 418.  
 Alum 213.  
 Alyssum 395. 405. 446.  
 Amarantus 202. 320. 395. 431.  
 Ambrosia 293. 343.  
 Ammi 339. 395. 404.  
 Amomum 140. 293. 421.  
 Ampeloprasum 404.  
 Anagallis 405. 453.  
 Anagyris 352.  
 Anblatum 348.  
 Anchusa 358. 384.  
 Androsæmum 442.  
 Angelica vitium 318.  
 Anime 376.  
 Anisum 51.  
 Anonyma S. Gregorii 441.  
 Anthemis 402.  
 Anthora 287.  
 Anthyllis 403. 414. 466.  
 Aphace 328.  
 Aphyllanthus 334. 433.  
 Apios 328. 449.  
 Apium 293. 326.

- Apocynum 338. 412.  
 Apollinaris 213.  
 Aquilegia 458.  
 Arabia 342. 397. 431.  
 Aracus 449.  
 Argemone 458.  
 Aristolochia 293. 328.  
 Armerius floe 396. 405.  
 Arthetica 355.  
 Arundo 334.  
 Asarina 343.  
 Aspalathus 418.  
 Asperula 440.  
 Asphodelus 327. 396.  
 Asplenon 321.  
 Assyria radix 149.  
 Aster 205. 319. 343. 402. 420.  
     421. 443.  
 Astragaloides 397.  
 Astragalus 355. 419. 442.  
 Athanasa 276.  
 Atractylis 328. 343.  
 Atriplex 326. 453. *prae f.*  
 Auricula 411. 434. 448.  
 Ayellana 376. 421.  
 Avornus 282.  
  
 Baccar 142.  
 Baccharis 341. 377.  
 Badija 214.  
 Ballote 434.  
 Balsamum alpinum 405.  
 Baly insulae fructus 448.  
 Baptifecula 320.  
  
 Barbula hirci 431. *prae f.*  
 Barometz 280.  
 Baruce 421.  
 Batatas 331.  
 Baucia 276.  
 Behen 378.  
 Bellan 378.  
 Bellis 328. 386. 455. 461.  
 Bellium 205.  
 Bernice 283.  
 Belle 195.  
 Beta 457.  
 Betonica 327.  
 Bifolium 450.  
 Bistorta 415.  
 Blida 220.  
 Blitum *prae f.*  
 Bona sylvestris 397.  
 Botrys 456.  
 Branca ursina 290.  
 Brasilicum lignum 261.  
 Brassica 51. 64. 385. 394.  
     *prae f.*  
 Britta 220.  
 Buenas noches 412.  
 Buglossa 318.  
 Buglossum 338. 400. 406.  
 Bulbocastanum 434. 468.  
 Bulbus eriophorus 396. 414.  
     monophyllus 448. sylve-  
     stris 327. vomitorius 339.  
 Buphthalmum 320. 386.  
 Burdunculus 214.  
 Bursa pastoris 459. 466.

- Calabrica 202.  
 Calamagrostis 319.  
 Calamintha 328. 405.  
 Calceolus 398.  
 Calcifraga 213.  
 Callicia 51.  
 Caltha 147. 205.  
 Camforata 437.  
 Campanula 320. 459.  
 Canapis 386.  
 Canaria 201.  
 Cantalis 286.  
 Capillus Veneris 290.  
 Cardamine 442.  
 Carduus 294. 385. 386. 398.  
 402. 420. 432. 450.  
 Cartafilago 205.  
 Carvi 456.  
 Carvisfolia 451.  
 Caryophyllata 352.  
 Caryophyllus 384. 405. 415.  
 457. 458. *præf.*  
 Cassia 144. 199. 402.  
 Castida 441.  
 Castanea 417.  
 Catananche 449.  
 Caulalis 412. 432.  
 Cava 353.  
 Celastrus 413.  
 Centauroides 358.  
 Centaurium 414. 440. 456.  
 Centummorbia 326.  
 Centunculus 203.  
 Ceralus 138. 384. 448.  
 Cerastia 203.  
 Cerefolium 437.  
 Cerrus 335. 421.  
 Cervicaria 354. *præf.*  
 Chamaecerafus 390.  
 Chamaecistus 412. 416.  
 Chamaedaphne 340.  
 Chamaedaphnoides 384.  
 Chamaedrys 327. 447. 458.  
 Chamaefilix 407.  
 Chamaegonista 419.  
 Chamaeiris 395. 410.  
 Chamaeleagnus 206. 398.  
 Chamaeleon 343. 377. 402.  
 Chamaeleuce 204.  
 Chamaemelum 327. 435. 450.  
 461.  
 Chamaeorchis 461.  
 Chamaepericlymenum 411.  
 Chamaepeuce 334. 433.  
 Chamaepitys 338. 417.  
 Charantia 398.  
 China 331.  
 Chondrilla 356. 377. 397. 402.  
 442. 450. 460.  
 Christophoriana 391.  
 Chrysanthemum 327. 420.  
 450.  
 Chrysolachanum 292.  
 Cicer 342. 355. 406. 460.  
 Cichorea 320. 343.  
 Cichorium 443.  
 Cicutaria 412. 434.  
 Circaea 319.

- Cirsium* 326. 343. 398. 406.  
 420. 450.  
*Clematis* 352.  
*Clinopodium* 252. 385. 417.  
*Cneorum* 340.  
*Cnicus* 420.  
*Coccygia* 202.  
*Colchicum* 413. 414.  
*Colocasia* 331.  
*Colus Iovis* 402.  
*Colutea* 385. 406. 419. 449.  
*Combretum* 203.  
*Condurdum* 203.  
*Confiligo* 201.  
*Consolida* 293. 294. 327. 356.  
 458. *præf.*  
*Conyza* 343. 356. 377. 402.  
 407. 420. 435. 450. 460.  
 461.  
*Coracelia* 51.  
*Coral arbor* 418.  
*Coralloides* 348.  
*Corona folia* 438.  
*Coronopus* 319. 358. 351.  
*præf.*  
*Corruda* 149. 414.  
*Costus* 219. 331.  
*Cotula* 402.  
*Cotyledon* 395. 448.  
*Cracea* 438.  
*Craurophilum* 355.  
*Crepis* 435.  
*Cristanus* 276.
- Critamus* 319.  
*Crithmum* 398.  
*Crocus* 410.  
*Crucialis præf.*  
*Cruciata* 440.  
*Cuculus* 203.  
*Cuminum* 318. 338. 339.  
*Cunila* 150.  
*Cyanoides* 398.  
*Cyanus* 356. 385. 386. 406.  
*Cyclaminos* 203.  
*Cynocrambe* 328.  
*Cynorrhodos* 348.  
*Cynosbatus* 202. 318.  
*Cyperus* 453. *præf.*  
*Cytifus* 138. 146. 150. 342. 419.  
*Dactylobotanon* 354. 355.  
*Daphnoides præf.*  
*Daucoides* 347.  
*Daucus* 326. 351. 354. 434.  
 447. 448.  
*Dens leonis* 397. 460.  
*Dentaria* 342. 421.  
*Diapensia* 314.  
*Dodecatheon* 201.  
*Doronicum* 420. 461.  
*Draba* 342. 418. 456.  
*Dracunculus* 461.  
*Dryopteris* 398.  
*Ebenum* (5) 144. 385.  
*Echinomelocactus* 401.  
*Echinophora* 440.  
*Echinopoda* 385.

- Echioides 440.  
 Echium 354. 384.  
 Elatina 318.  
 Empetrum 319.  
 Enula 276.  
 Epipactis 339.  
 Equisetum 386. 457. 461.  
 Erica 356. 422.  
 Ericoides 355.  
 Erica 328. 406. 434. 449. 459.  
 Erucago 441.  
 Erysimum 459.  
 Esula 318. 401.  
 Eupatorium 320.  
 Euphorbia arbor 403.  
 Euphrasia 313.  
 Febrifugia 220.  
 Fel terrae 183.  
 Ferrum equinum 442.  
 Festuca 454. 455.  
 Filago 466.  
 Filipendula 397.  
 Filius ante Patrem 299.  
 Filix 321. 352. 451. 422. 461.  
 Flammula 282.  
 Flos constantinopolitanus 396.  
 Flos solis 443.  
 Fluvialis 450.  
 Foenugraecum 397.  
 Fragaria 391. 457.  
 Frangula 456.  
 Fraxinella 282.  
 Fructus echinatus 416.  
 Frutex corenarius 416.  
 Fucus 335. 353. 462.  
 Fungus 422.  
 Furcellaria 353.  
 Galeopsis 328. 417. 466.  
 Gallidraga 201.  
 Gallitricum 318.  
 Gallium 437. 440. 450.  
 Garb 381.  
 Garyophyllus 204. 320.  
 Genista 146. 397. 438. *prae f.*  
 Genistella 406. 449. 459. *prae f.*  
 Gentianella 440.  
 Geranium 328. 406. 437. 442.  
 Gethyoides 441.  
 Gilarum 214.  
 Gingidium 326. 377. 404.  
 Gith 220.  
 Glaux 394.  
 Globularia 441.  
 Gnaphalium 343. 421. 461.  
 Gramen 337. 354. 403. 404.  
 407. 411. 433. 437. 447.  
 448. 454. 455. 457. 461.  
 466. *prae f.*  
 Granadilla 376.  
 Grassula 288.  
 Gratiola 466.  
 Gromphaena 206.  
 Halicacabum 431.  
 Halimus 309. *prae f.*  
 Halum 214.  
 Hedarula 403.



- Helichrysum** 322. 343. 420.  
 460.  
**Helleborus** 456.  
**Hemerocallis** 413.  
**Hepatica** 321. 348.  
**Heraclea** *praeef.*  
**Herba solis** 376.  
**Herba turca** 401.  
**Hermodactyli** 244. 294. 319.  
**Hibiscus** 146.  
**Hieracium** 328. 397. 406. 419.  
 435. 438. 442. 443. 450.  
**Hippomarathrum** 456.  
**Holosteum** 339. 400. 411. 433.  
**Horminum** 410. 453.  
**Hyacinthus** 142. 327. 404. 414.  
**Hydropiper** 327. 405.  
**Hyoscyamus** 384.  
**Hyosiris** 205.  
**Hyrundinaria** 313.  
**Hyssopifolia** 448.  
**Hyssopus** 441.  
  
**Iaca** 381.  
**Iacea** 386. 402. 421. 443. 461.  
**Iacobaea** 402. 420. 450. 461.  
**Iecoraria** 321.  
**Impia** 205.  
**Intubus** 146. 356. *praeef.*  
**Iondraba** 442.  
**Konthlaspi** 442.  
**Irio** 342.  
**Ischaemon** 411.  
**Iucca** 370.  
  
**Iuncaria** 411.  
**Iuncus** 400. 437. 454. 457.  
*praeef.*  
**Ixocaulos** 355.  
**Ixopus** 348.  
  
**Kali** 338. 377. *praeef.*  
  
**Labrum Veneris** 294.  
**Lactuca** 356.  
**Lactucalla** 432.  
**Ladanum** 14. 385.  
**Lagopus** 320. 397. 401.  
**Lapathum** 448. 457. *praeef.*  
**Lappa** 318. *praeef.*  
**Laserpitium** 384. 401.  
**Laureola** 294.  
**Laurus alexandrina** 339.  
**Ledum** 340.  
**Lemma** 435.  
**Lens palustris** 344.  
**Lenticula** 462.  
**Leontopodium** 406. 407.  
**Leucanthemum** 420.  
**Leucolum** 385. 401. 418. 432.  
 442. 449. 459.  
**Libanotis** 339. 355. 456.  
**Lichen** 407.  
**Ligisticum** *praeef.*  
**Ligusticum** 339.  
**Ligustrum** 384. 453.  
**Lilac** 337.  
**Lilium** 309. 395. 396.  
**Limeum** 204.  
**Limonium** 319. 401. 457.

- Linaria 320. 354. 397. 418.  
     449. 460.  
 Linocarpos 355.  
 Linum 455.  
 Lolium 327.  
 Lonchitis 344. 356.  
 Lotus 143. 406. 435.  
 Lunaria 406. 422.  
 Luparia 319.  
 Lupus salictarius 206.  
 Lutum 144.  
 Luziolaria herba 203.  
 Lychnanthemum 355.  
 Lychnis 390. 405. 415. 434.  
     456.  
 Lychnite 338.  
 Lycoctonum 396. 405.  
 Lysimachia 437. 457.  
  
 Malundrum 203.  
 Malva 437. 459.  
 Mamoera 422.  
 Mandragora 294. 306.  
 Margaritum 305.  
 Marrubium *præf.*  
 Marum 397. 405.  
 Matrifylva 213. 313.  
 Medica 138. 402.  
 Medium 377.  
 Melampyrum 405.  
 Melanthium 341.  
 Melilotus 432.  
 Melissa 341.  
 Melissophyllum 145. 327.  
  
 Melittias 407.  
 Mella 215.  
 Mentha 449. *præf.*  
 Menthastrum 417.  
 Meum 339.  
 Miliaria 201.  
 Millefolium 403. 421. 450. 461.  
 Mithridatica 350.  
 Mollucca 401.  
 Moly 413. 457.  
 Morgani 377.  
 Morfus diaboli *præf.*  
 Moschatella 348.  
 Muniacus 282.  
 Muscus 321. 422. 431. 462.  
 Myrica 143.  
 Myriophyllum 338. *præf.*  
 Myrobalani 283.  
 Myrrhis 327. 355.  
 Myrtillus *præf.*  
 Myrto-cistus 419.  
 Myrtus 355.  
  
 Napellus 341.  
 Narcissus 319. 339. 413.  
 Nardus 200. 331.  
 Nasturtium 418. 459.  
 Nervalis 213.  
 Nummularia 390. 447. 456.  
 Nyctegretum 203.  
 Nymphaea 344.  
  
 Occhi 205.  
 Ocimastrum 417.  
 Ocimoides 432. 441.

- Ocimum 137. 138.  
 Odocos 214.  
 Odontites 434.  
 Oenanthe 327.  
 Oleaster 349.  
 Olfenichium 348.  
 Onobrychis 397. 435. 459. 460.  
 Ononis 406.  
 Orchis 407. 432. 443.  
 Ornithogalum 414.  
 Ornithopodium 435.  
 Ornus 142.  
 Orobanche 467.  
 Orobus 419.  
 Osmunda 320.  
 Offeritium 308.  
 Oxalis 396.  
 Oxyagrostis 433.  
 Oxya 203.  
 Oxytriphylum 205. 401.  
  
 Paliurus 337.  
 Palma 421. Christi 344.  
 Palmula marina 353.  
 Panax 338. 339. 395. 441. 466.  
 Papas 369.  
 Papaver 353.  
 Paralyfia 305.  
 Parietaria *præf.*  
 Paronychia 433.  
 Parthenium 421.  
 Passerina 404.  
 Pastinaca 440.  
 Pedicularia *præf.*  
  
 Pentaphyllum 314. 334. 346.  
 416. *præf.*  
 Percepius 400.  
 Perfoliata 431. 456.  
 Periclymenum 412.  
 Periploca 395.  
 Persea 338.  
 Persicaria 466.  
 Peruviana 404.  
 Pes leodis 326.  
 Petasites 431.  
 Petilium 204.  
 Petroselinum vitium 318.  
 Petroselinum 339. 434.  
 Phalangium 340.  
 Philanthropos 201.  
 Phu 326. 337. 437.  
 Phyllitis 368. *præf.*  
 Phyllon 422. 434.  
 Phyteuma 446. *præf.*  
 Pilosella 355. 356. 442.  
 Pinaster 421.  
 Piperitis 201.  
 Pisum 419.  
 Plantago 405. *præf.*  
 Pollum 341. 396. 417.  
 Polychrestum 348.  
 Polygala 419.  
 Polygonatum 457.  
 Polygonum 401. 404. 457. 456.  
 Populus 405.  
 Portulaca 315. 431. *præf.*  
 Potamogeton 461.  
 Poterium 391.

- Presillum lignum** 288.  
**Pseudo-Aconitum** 341.  
**Pseudo-Asphodelus** 414.  
**Pseudo-Coffus** 318.  
**Pseudo-Cytisus** 348.  
**Pseudo-Elleborum** 341.  
**Pseudo-Leimodorum** 421.  
**Pseudo-Lysimachium** 395.  
**Pseudo-Narcissus** 413.  
**Pseudo-Stachys** 458.  
**Pseudo-Struthium** 340.  
**Pseudo-Sycomorua** 340.  
**Psyllium** 334.  
**Ptarmica** 343.  
**Pulegium** 391.  
**Pulicaria** 314.  
**Pulmonaria** 328. 438.  
**Pulsatilla** 434. 458.  
**Pyrethrum** 343.  
**Pyrola** 455.  
  
**Quercus marina** 422.  
**Quinquefolium** 319. 385. 458.  
*præf.*  
**Quititana** 297.  
  
**Rabo-pola** 367.  
**Ranunculus** 327. 341. 417.  
*præf.*  
**Raphanus** 459.  
**Rapistrum** 459.  
**Rapum sylvestre** 326.  
**Rapunculus** 353. 447.  
**Rapuntium** 440.  
**Rafamala** 298.  
  
**Rhamnus** 412.  
**Rhodora** 204.  
**Rhus** 402.  
**Rhincus** 282.  
**Robur** 421.  
**Rosa hierochuntica** 432.  
**Rosa laurea** 163.  
**Rubeola** 431. 455.  
**Rubia** 353. 403. 447. 453.  
*præf.*  
**Rumopotinum** 151.  
**Ruta canina** 405.  
  
**Saliunca** 307. 308.  
**Salix** 451.  
**Sambucus** 319. 339.  
**Sanamunda** 415. 457.  
**Sanguinum** 282.  
**Sardoa herba** 145.  
**Satyrrium** 320.  
**Savina** 321.  
**Saxifraga** 328. 341. 352. 396.  
401. 412.  
**Scabiosa** 411. *præf.*  
**Scheha** 377.  
**Sclarea** 436.  
**Scolopendra** 321.  
**Scopa regia** 202.  
**Scorpioides** 397. 435.  
**Securidaca** 342.  
**Sedum** 352. 398. 405. 411.  
415. 440. 441. 457.  
**Selinum** 413. 466.  
**Sempervivum** 340. 441.

- Senecio-Carduus* 443.  
*Seriphium* 320.  
*Serpentaria* 290.  
*Serpentina* 338. 403.  
*Serpyllum* 417.  
*Sesamoides* 415.  
*Seseli* 326. 339. 351.  
*Sferra cavallo* 342.  
*Sideritis* 337. 341. 355. 385.  
     458. *præf.*  
*Sigillum Salomonis* 292. 319.  
*Siler* 290. 318.  
*Siligo* 215.  
*Siliquastrum* 326.  
*Sinapi* 51. 459.  
*Sifer* 149. 202. 326.  
*Sisymbrium* 431.  
*Sium* 318. 326. 385. 395.  
*Smyrniunum* 323. 318. 339.  
*Solanum* 318. 338. 456. 457.  
*Solidago* 320.  
*Solis flos* 340.  
*Solsequia* 220.  
*Sonchus* 435. 460.  
*Spartium* 385.  
*Spartum* 200. 403. 410. 411. 466.  
*Spartus* 328.  
*Speculum Veneris* 466.  
*Sphondylium* 456.  
*Spica trifolia* 385.  
*Spina* appendix 203. *alba*  
     402. 434. *foliifolia* 443.  
*Stachys* 341.  
*Staphylinus* 149.  
*Staphylodendron* 203.  
*Stoebe* 385. 386. 421.  
*Stoechas* 402. 417.  
*Stratiotes* 386. 421.  
*Superba* 319.  
*Sycomoros* 282.  
*Symphytum* 338. 355. 404.  
  
*Tacamahaca* 376.  
*Tacori* 414.  
*Taeda* 206.  
*Tanacetum* 320.  
*Telephium* 415.  
*Tembul* 195.  
*Terebinthus* 402.  
*Testiculus* 343. 407.  
*Tetrahit* 282.  
*Teucrium* 410. 458.  
*Thamecnemum* 348.  
*Thlaspi* 342. 352. 402. 406.  
     418. 434. 435. 459.  
*Thlaspidium* 320.  
*Thora* 287.  
*Thymus* 145.  
*Tibulus* 206.  
*Tiniaria* 213. 214.  
*Tithymalus* 353. 415. 430. 434.  
     441. 458.  
*Trachelium* 352. 440. 447.  
*Tragacantha* 377. 385.  
*Tragium* 377.  
*Tragopogon* 442.  
*Tragorchis* 398.  
*Tragofelinum* 437.

- Tribulus 411. 435.  
 Tridactylites 448.  
 Trifolium 342. 348. 385. 395.  
 406. 432. 460. *præf.*  
 Trinitatis herba 313.  
 Tripolium 202.  
 Tunica 434.  
 Tunicum 298.  
 Turbith 310.  
 Turifera arbor 144.  
 Turis limpidi folium 434.  
 Ulmus atinia 151.  
 Ulpica 149.  
 Ulva 147.  
 Umbellifera alfatia 447.  
 Urceolaris 213.  
 Urtica 314. 396.  
 Uvularia *præf.*  
 Vaccinium 145.  
 Valeriana 453.  
 Valerianella 440.  
 Veelgutta 393.  
 Venti herba 319.  
 Verbasculum 326. 385.  
 Verbascum 341. 397. 401.  
 Verbenaca 328.  
 Verbena 314. *præf.*  
 Versig 282.  
 Vesicaria 319.  
 Vicia 442.  
 Vincetoxicum 466.  
 Viola 146. 397.  
 Virga pastoris 201. 294.  
 Virgaurea 450.  
 Visumarum 214.  
 Vitis idaea 415. 416. 448.  
 nigra 327.  
 Vitrago 213.  
 Vulgigina 220.  
 Vulneraria 318.  
 Warentia 220.  
 Xylon 328.  
 Zizulus 282.  
 Zuber 282.

## INDEX VI.

## AUCTORES.

- Abdollatif 238.  
 Abulfeda 233.  
 Christ. Acosta 381.  
 Actor 224.  
 Albertus Magnus 280.  
 Alexius 63.  
 Alfredus 225. 280.  
 Prosp. Alpinus 382—386.  
 Ebn Alvam 237.  
 Ebn Alvardi 233.  
 Aly Abbas 236.  
 Amerias 133.

- Anacreon 65.  
 Anaxagoras 53.  
 Andreas 134.  
 Androtion 65.  
 Al. Anguillara 333.  
 Antonius Rhizotomus 131.  
 Apollonius Memphites 124.  
 Apuleius 223.  
 Bened. Aretius 349.  
 Aristophilus 64.  
 Aristoteles 55—62.  
 Asclepiades Myrleanus 124.  
 Asclepiodorus 132.  
 Athenaeus 134.  
 Averrhoës 237.  
 Avicenna 236.  
  
 Badigorius 234.  
 Bakui 233.  
 Hermol. Barbarus 304.  
 Iul. Bassus Tylus 133.  
 Casp. Bauhin 451—462.  
 Io. Bauhin 445—451.  
 Ebn Beithar 238.  
 Honor. Bellus 386.  
 Petr. Belonius 377.  
 Ant. Mus. Brasavolus 329.  
 Otho Brunfels 311—315.  
 Hieron. Brunswicensis 296.  
  
 Andr. Caesalpinus 422—430.  
 Franc. Calceolarius 350.  
 Io. Camerarius 430—432.  
 Symphor. Campegius 311.  
  
 Hier. Cardanus 462.  
 Carolus M. 219—222.  
 Cassianus Bassus 216.  
 M. P. Cato 135. 136.  
 Bern. Cienfuegos 359.  
 Clearchus 124.  
 Cleidemus 64.  
 Car. Clusius 407—422.  
 Pand. Collenutius 308.  
 L. I. M. Columella 148—151.  
 Fab. Columna 438—443.  
 Constantinus Africanus 275.  
 Simon de Cordo 285.  
 Eur. Cordus 321.  
 Valer. Cordus 346—349.  
 Cossaeus 234.  
 Io. Costaeus 463.  
 Cratevas Rhizotomus 126. 127.  
 Petr. de Crescentiis 281.  
 Io. Cuba 292.  
  
 Iac. Dalechamp 432—436.  
 Dalion 132.  
 Democritus 53.  
 Diocles Carystius 123.  
 Diodotus 133.  
 Diogenes 65.  
 Dionysius Uticensis 132.  
 Diophanes Bithynus 139.  
 P. Dioscorides 151—195.  
 Remb. Dodonaeus 394—398.  
 Iac. de Bondie 289—291.  
 Cast. Durantes 468.

- Eddrius 233.  
 Empedocles 52. 53.  
 Epicurus 124.  
 Jac. Pet. Esteve 358.  
 Eudemus 63.  
 Eumachus 65.  
 Euthydemus 124.  
  
 Io. Fabricius 349.  
 Abu'l Fadli 236.  
 Io. Fischart 357.  
 Io. Fragoſi 358.  
 Leon. Euchſius 324—328.  
  
 Galenus 206—210.  
 Garcias ab Orto 580.  
 Theod. Gaza 303.  
 Io. Gerárd 466.  
 Contr. Geener 387—393.  
 Luc. Ghinius 332.  
 Barth. Glanville 286.  
 Glaucias Empiricus 133.  
 Melch. Guilandinus 378.  
  
 Abu Hamifa 235.  
 Heraclides Tarentinus 131.  
 Hildegardis 226—228.  
 Hippocrates 35—49.  
 Hippon Phylſicus 65.  
 Hobaiſch 235.  
 Homerus 19—29.  
 Honain 235.  
 Chr. de Honestis 292.  
  
 Sim. Ianuenſis 285.  
 Io. Jarava 345.  
 TOM. I.
- Icelius 131.  
 Ferr. Imperatus 352.  
 Lolauſ Bithynus 131.  
 Iſidorus Hiſpalenſis 214.  
 Io. Iungermann 430.  
 Andr. Lacuna 344.  
 Leo Africanus 234.  
 Nic. Leonicepus 306.  
 Leoptanes 65.  
 Gaufr. Linocierus 376.  
 Io. Hugo Linſchoten 382.  
 Mauh. Lobelius 398—407.  
 Ad. Lonicer 463.  
 Amatus Luſitanus 330.  
  
 Aemil. Macer 225.  
 Io. Manardus 309.  
 Manfredus de Monte Imperiali 298.  
 Io. de Manlius 298.  
 Barth. Maranta 345.  
 Marcellus Empiricus 213.  
 Andr. Marinus 335.  
 Maſerſchawaih 235.  
 Maſſudi 233.  
 Contr. de Megenberg 291.  
 Menefſtor 64.  
 Menoderus 133.  
 Abu Merig 235.  
 Meſue ſen. 234. iun. 235.  
 Micton 65.  
 Mithridates 124.  
 Mneſitheus Cyzicenus 132.  
 Nic. Monardes 375.



- Al. Mundella 330.  
 Nic. Myreplicus 217.  
 Herm. a Neuenaar 323.  
 Nicander Colophonius 127—  
 130.  
 Niceratus 133.  
 Sext. Niger 133.  
 Orpheus 51.  
 Ortolfus de Bavaria 297.  
 Gonz. Ferd. Oviedus 371.  
 Aug. Palla 332.  
 Palladius Rutilius 214.  
 Pamphilus 132.  
 Petr. Pena 399.  
 Laur. Perez 346.  
 Corn. Petri 321.  
 Petronius 131.  
 Phanius Eresius 122.  
 Matth. Platearius sen. 276.  
 iun. 297.  
 Plinius 195—206.  
 Plinius Valerianus 223.  
 Io. Pona 351.  
 Io. Bapt. Porta 464.  
 Pythagoras 51.  
 Leon. Rauwolf 378—380.  
 Rhazeus 235.  
 Io. Rodericus de Castello al-  
 bo 330.  
 Io. Ruellius 323.  
 Abu Saher 234.  
 Iul. Caes. Scaliger 462.  
 Scharak 234.  
 Scribonius Largus 213.  
 Io. Serapion 237.  
 Symeon Serthus 216.  
 Solon Smyrnaeus 124.  
 Car. Stephanus 331.  
 Walafr. Strabus 224.  
 Matth. Sylvaticus 286—288.  
 Iac. Theod. Tabernaemonta-  
 nus 436—438.  
 Thales Milefius 50.  
 Io. Thalins 354—357.  
 Theophrastus Eresius 66—119.  
 Andr. Thevetius 374.  
 Thrafsyas 63.  
 Leon. Thurneifer 357.  
 Io. Tollat v. Vochenberg 297.  
 Hier. Tragus 315—321.  
 Tryphon 132.  
 Wil. Turner 393.  
 Barth. Urbevetanus 332.  
 Marc. Urzedowa 464.  
 Plin. Valerianus 223.  
 Georg. Valla 303.  
 Rob. de Valle 305.  
 M. T. Varro 137. 138.  
 Marc. Vergilius 305.  
 Vincentius Bellovacensis 233.  
 P. Virgilius Maro 139—148.  
 Io. Wigand 353.  
 Ad. Zaluzanius 443.

## SPHALMATA.

## P. L.

223. 12. infer. loco auderunt l. auderunt.  
 306. 4. loco. Helleri l. Halleri.  
 306. 17. — Vineam l. Vincam.  
 307. 8. infer. loco Chamaeleum l. Chamaeleum.  
 308. 11. loco Storza l. Sforza.  
 309. 9. infer. loco Halikon l. Halimon.  
 315. 7. — — Exfragia l. Eufragia.  
 315. 6. — — Kandellam l. Kandellum.  
 316. 2. — — investigerunt l. investigarunt.  
 319. 11. loco botryoides l. botryoides.  
 319. 13. — Triglochia l. Triglochin.  
 320. 4. — Cardamina l. Cardamine.  
 320. 12. — hieracioides l. hieracioides.  
 320. 2. infer. loco balearia l. balearica.  
 321. 7. loco Saccina l. Savina.  
 322. 3. infer. loco Damo l. Dauco.  
 323. 10. — — Novenar l. Nevenagr.  
 324. 8. loco Not. l. vol.  
 325. ult. infer. loco at l. ut.  
 326. 11. loco Songhum l. Sorghum.  
 327. 5. infer. loco Exanthenum l. Eranthemum.  
 329. 1. loco Eccipiat l. Excipiat.  
 337. 14. — Plantas l. Plantarum.  
 341. 17. — Macrubium l. Marrubium.  
 342. 8. — Frio l. Irio.  
 345. Tit. et 6. loco Iaxava l. Iarava.  
 350. 14. locq Olicea l. Oliva.  
 350. 17. — Beraco l. Benaco.  
 352. 3. — Veronica saxatilis l. Veronicæ saxatilis.  
 354. 7. — Hial l. Hiel.  
 357. 3. — Iple l. Ipla.  
 357. 3. infer. loco moischlicher l. menschlicher.  
 361. 12. — — Gabrichis l. Gabriellis.  
 364. 8. loco cult. l. calc.  
 365. 11. — Merno l. Mercas.

## P. L.

366. 9. loco Venator l. Venetus.  
 367. 2. — Sequeira l. Sequeira.  
 367. 10. — Vincenta l. Pimenta.  
 369. 7. infer. loco Venas l. llenas.  
 369. 14. — — ch l. el.  
 374. 7. loco Coram l. Cocam,  
 384. 7. infer. loco Aur l. Acer.  
 401. 6. — — Iris l. Irio.  
 415. 8. — — pumilis l. Pumilio.  
 441. 11. loco Sempervirum l. Sempervivum,  
 443. 12. infer. loco Orchis l. Ophrys  
 443. 12. loco O. l. Orchis.
-

---

AUCTORIS SCRIPTA HUCUSQUE EDITA.

1. Beyträge zur Geschichte des Pulses. Halle 1787. 8.
2. Apologie des Hippokrates und seiner Grundsätze. Leipzig 1789. 1791. Tom. 1. 2.
3. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde. Zweyte Auflage. Halle 1800—1803. Tom. 1—5.
4. Handbuch der Pathologie. Dritte Auflage. Leipzig 1798—1806. Tom. 1—3.
5. Beyträge zur Geschichte der Medicin. Halle 1794. 1796. Tom. 1—3.
6. Handbuch der Semiotik. Halle 1800.
7. Kritische Uebersicht des Zustandes der Arzneykunde in dem letzten Jahrzehend. Halle 1801.
8. Geschichte der Medicin im Auszuge. Halle 1804. Tom. 1.
9. Geschichte der wichtigsten chirurgischen Operationen. Halle 1805.
10. Anleitung zur Kenntniß der Gewächse. Halle 1802—1804. Tom. 1—3.
11. Antiquitatum botanicarum specimen primum. Lipsiae 1798.
12. Der botanische Garten der Universität zu Halle. 1800.
13. Florae halensis tentamen novum. Halae 1806.
14. Gartenzeitung. Halle 1803—1807. Tom. 1—4.
15. Mantissa florae halensis, addita novarum plantarum centuria. Halae 1807.

## INTERPRETATIONES.

1. GALENS Fieberlehre. Breslau 1788. (E graeco idiomate.).
  2. Sendschreiben über den thierischen Magnetismus. Halle 1788. (E suecico.).
  3. BUCHAN's Hausarzneykunde. Altenburg 1791. (Ex anglico.).
  4. PERNOTTI DI CIGLIANO von der Luftseuche. Leipzig 1791. (Ex italico.).
  5. KINSBERGHEN's Beschreibung des Archipelagus. Rostock 1791. (E batavo.).
  6. THÜNBERG's Reise in Africa und Asien. Berlin 1791. (E suecico.).
  7. BERGIUS von Leckereyen. Halle 1792. 1793. Tom. 1. 2. (E suecico.).
  8. JACKSON über die Fieber in Iamaica. Leipzig 1796. (Ex anglico.).
  9. ROSCOP's Leben Lorenz von Medici. Berlin 1797. (Ex anglico.).
  10. SELLII liber de curandis hominum morbis. Berolini 1798. (E germanico.).
  11. BARTHEZ neue Mechanik der willkührlichen Bewegungen der Menschen und Thiere. Halle 1800. (E gallico.).
  12. SWEDIAUR von der Luftseuche. Th. 1. 2. Berlin 1801. (E gallico.).
-













